

Teoria A czy teoria B

Dwie konkurencyjne hipotezy o Twoim problemie. Teoria A: „realnie jestem nudny/-a i ludzie mnie oceniają”. Teoria B: „mam wzorec lękowy i widzę siebie zniekształconym oczom”. Cała terapia to test, która z nich pasuje lepiej do faktów.

CZAS: 30 min wstępnie + 4 tygodnie zbierania dowodów Wracaj raz na tydzień

ŹRÓDŁO: Wells (1997); Salkovskis i wsp. (2007)

JAK UŻYWAĆ

1 · Przeczytaj obie teorie w sekcji 01 — wybierz, którą *w tej chwili* bardziej w sobie wierzysz (sekcja 02). **2** · Przez 4 tygodnie zapisuj w sekcji 03 i 04 fakty z życia, które potwierdzają jedną lub drugą teorię. **3** · Po miesiącu policz dowody — która ma więcej? **4** · Sprawdź, jak prowadzenie życia *zgodnie z teorią B* zmienia codzienne wybory.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pacjenci z lękiem społecznym wierzą w teorię A („coś ze mną nie tak”) jako fakt — nie jako interpretację. Sformułowanie dwóch **konkurencyjnych hipotez** przesunęło rozmowę z „naprawiania siebie” na *obserwowanie faktów*. Po 4–6 tygodniach zbierania dowodów większość pacjentów raportuje, że teoria B pasuje 5–10× lepiej — co osłabia centralne przekonanie o własnej „społecznej wadliwości” (Wells 1997; Clark & Wells 1995).

01 Dwie konkurencyjne teorie

TEORIA A

„problem jest we mnie”

Założenie: realnie jestem nudny/-a, dziwny/-a, niezręczny/-a. Inni ludzie *obiektywnie* mnie nisko oceniają i odrzucają. Lęk, który czuję, jest *uzasadnioną reakcją* na realne zagrożenie społeczne.

Wnioski praktyczne: muszę bardziej się starać, lepiej wyglądać, ćwiczyć kwestie, używać zabezpieczeń. Im więcej kontroli, tym lepiej. Unikanie trudnych sytuacji jest *rozsądne*.

TEORIA B

„problem jest w wzorcu lęku”

Założenie: mam *wyuczony wzorec lękowy* — przesadną wrażliwość na ocenę, zniekształcony obraz siebie, zachowania zabezpieczające. Inni widzą mnie *inaczej* niż ja sobie wyobrażam. Lęk jest *falszywym alarmem*, nie ostrzeżeniem o realnym zagrożeniu.

Wnioski praktyczne: muszę odstawić zabezpieczenia, kierować uwagę na zewnątrz, eksponować się stopniowo. Im mniej kontroli, tym szybciej wzorec się osłabi. Unikanie *utrwała* problem.

02 Twój punkt wyjścia — w którą wierzysz dzisiaj

WIARA W TEORIĘ A

— 0% (wcale) do 100% (całkowicie)

WIARA W TEORIĘ B

— 0% do 100%

Te dwie liczby *nie muszą* sumować się do 100. Możesz wierzyć w obie po 60%, albo w A 80% i w B 20%. Wpisz uczciwie, jak jest dzisiaj. Po 4 tygodniach wrócimy do tego pomiaru.

03 → Dowody za teorią A — przez 4 tygodnie

Wpisuj wydarzenia, które **realnie** potwierdzają „coś ze mną nie tak”. Muszą być *obserwowalne* — co ktoś powiedział, jakie miał zachowanie. Nie domysły, tylko fakty.

DATA	CO SIĘ STAŁO <i>obserwowalne fakty, nie domysły</i>

04 ✓ Dowody za teorią B — przez 4 tygodnie

Wpisuj wydarzenia, które potwierdzają „mam wzorzec lękowy”. Np. *znajoma osoba zaprosiła mnie na kawę — wbrew teorii A; w pracy ktoś pochwalił moją prezentację; nie zauważyłem/-am, jak druga osoba na mnie patrzy*. Najtrudniejsze: zauważyć *brak* negatywnej reakcji, kiedy się jej spodziewałeś/-aś.

DATA	CO SIĘ STAŁO <i>obserwowalne fakty</i>

Klucz: w terapii nie chodzi o „udowodnienie”, że teoria A jest fałszywa — chodzi o to, by *żyć zgodnie z teorią B* i zobaczyć, co się zmieni. Pacjenci, którzy przez 4–6 tygodni systematycznie zbierają dowody, zwykle raportują przesunięcie wiary w teorię B z ~20% do ~70–80% (Wells 1997). To **nie** jest „pozytywne myślenie” — to test eksperymentalny dwóch hipotez na materiale własnego życia.