

Zachowania *zabezpieczające*

Drobne ruchy, które wykonujesz, żeby „się chronić” przed zauważeniem objawów lęku. Wyglądają jak rozwiązanie — są paliwem problemu.

CZAS: 20 min mapowania + 1 tydzień obserwacji Wykonaj raz, wracaj co 2 tygodnie

ŹRÓDŁO: Clark & Wells (1995); Salkovskis (1991)

JAK UŻYWAĆ

1 · Przeczytaj listę 16 typowych zachowań zabezpieczających (sekcja 01). **2** · Zaznacz wszystkie, które rozpoznajesz u siebie. **3** · Przez 7 dni noś tę kartę przy sobie — po każdej sytuacji społecznej dopisz w sekcji 03 te, których użyłeś/-aś. **4** · Wybierz *jedno* — najczęściej używane — i w przyszłym tygodniu spróbuj go nie używać w jednej sytuacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zachowania zabezpieczające są **podwójną pułapką**. Po pierwsze: zwracają Twoją uwagę na siebie (zamiast na rozmówcę), więc *pogarszają* wykonanie sytuacji. Po drugie: nawet jeśli sytuacja kończy się dobrze, mózg przypisuje to zabezpieczeniu („udało się, bo trzymałem/-am kubek mocno”), a nie Tobie. To uniemożliwia korygującą naukę. Bez ich odstawienia **żadna ekspozycja nie zadziała w pełni** (Wells i wsp. 1995; Salkovskis 1991).

01

Lista 16 typowych — zaznacz swoje

CIAŁO

- ☐ trzymam coś (kubek, telefon, długopis), żeby nie drżały ręce
- ☐ ściskam mięśnie, żeby nie było widać pocenia
- ☐ ukrywam dłonie w kieszeniach lub pod stołem
- ☐ siadam tak, żeby zasłonić tułów (stół, torba, kurtka)

TWARZ I WZROK

- ☐ unikam kontaktu wzrokowego
- ☐ uśmiecham się sztywno, żeby ukryć napięcie
- ☐ zasłaniam twarz dłonią, włosami, szalikiem
- ☐ stale „kontroluję wyraz twarzy”

MOWA

- ☐ mówię ciszej, żeby nie zwracać uwagi
- ☐ ćwiczę zdania w głowie przed wypowiedzeniem
- ☐ mówię szybko, żeby „mieć z głowy”
- ☐ powtarzam się — żeby się upewnić, że rozmówca zrozumiał

POZNAWCZE / WEWNĘTRZNE

- ☐ planuję każdą wypowiedź z góry
- ☐ skanuję rozmówcę „czy zauważył lęk?”
- ☐ kontroluję oddech, żeby się uspokoić
- ☐ trzymam w głowie „plan B” wyjścia

To tylko najczęstsze. Twoje może być inne — np. *upewnianie się trzy razy, czy ubranie pasuje, picie alkoholu „dla luzu”, chodzenie wszędzie ze znajomą osobą, siedzenie blisko wyjścia*. Każdy mikroruch, który robisz „żeby się zabezpieczyć”, jest na tej liście — nawet jeśli nie ma go tutaj.

02 → Paradoks — dlaczego to nie działa

1 · POGARSZAJĄ WYKONANIE

Trzymasz kubek mocno → uwaga idzie do ręki, nie do rozmówcy. Ćwiczysz zdania → przegapiasz, co druga osoba mówi. Skanujesz „czy zauważył” → nie reagujesz naturalnie. **Im więcej zabezpieczeń, tym sztywniej wyglądasz** — i tym bardziej myślisz „znów nie wyszło”.

2 · BLOKUJĄ NAUKĘ

Jeśli sytuacja kończy się dobrze, mózg myśli: „udało się, bo użyłem/-am zabezpieczenia”. Bez niego *byłoby źle*. Więc następnym razem stosujesz je znowu. **Lęk nigdy nie spada** — bo nigdy nie dowiadujesz się, że sytuacja byłaby OK i bez nich.

03 Dziennik — 7 dni obserwacji

Po każdej sytuacji społecznej dnia wpisz: jaka sytuacja, jakie zabezpieczenia użyłeś/-aś, ile było lęku (0–10).

DZ.	SYTUACJA	ZABEZPIECZENIA które użyłem/-am	LĘK 0–10
<i>Pn</i>			
<i>Wt</i>			
<i>Śr</i>			
<i>Cz</i>			
<i>Pt</i>			
<i>Sb</i>			
<i>Nd</i>			

04 Plan odstawienia — wybierz jedno

ZABEZPIECZENIE DO ODSTAWIENIA

— najczęściej używane

SYTUACJA TESTOWA

— konkretna, w tym tygodniu

Klucz: nie próbuj odstawić wszystkich naraz — wybierz *jedno*, najczęściej używane. Każde odstawione zabezpieczenie otwiera nowy poziom uczenia się: „okazuje się, że bez tego też było OK”. Po 4–6 tygodniach pracy nad pojedynczymi zabezpieczeniami pacjenci raportują *50% redukcji ogólnego lęku społecznego* (Wells & Papageorgiou 2001).