

Wystąpienia *publiczne*

Lęk przed wystąpieniem to najczęstszy podtyp lęku społecznego (~70% przypadków). Protokół: 4 etapy od dnia przed do 30 min po. Cel — być obecnym/-ą w treści, nie w monitorowaniu siebie.

CZAS: 2 dni przygotowania + samo wystąpienie Wykonaj 3 wystąpienia w ciągu 6 tygodni

ŹRÓDŁO: Heimberg (2002); Hofmann (2007); Stein (2011)

JAK UŻYWAĆ

Etap 1 · dzień przed — przygotowanie treści i przepracowanie myśli (sekcja 01). **Etap 2** · 30 min przed — fizjologia i uwaga (sekcja 02). **Etap 3** · w trakcie — kierowanie uwagi na słuchaczy (sekcja 03). **Etap 4** · 30 min po — strukturalna refleksja, by nie wpaść w pomyślenie po (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wystąpienia są *archetypem* sytuacji oceniającej — wszystkie elementy modelu Clark & Wells aktywują się jednocześnie. Bez protokołu pacjent z lękiem społecznym zazwyczaj: (a) czyta slajdy zamiast patrzeć na słuchaczy, (b) mówi szybko, by „mieć z głowy”, (c) używa wielu zabezpieczeń, (d) po wystąpieniu odtwarza je w głowie godzinami. Protokół *zastępuje* te wzorce zachowaniami, które testują „katastrofę”. Po 3 wystąpieniach lęk antycypacyjny przed kolejnymi spada średnio o 40–50% (Hofmann 2004; Anderson i wsp. 2013).

01 = Etap 1 — dzień przed

TREŚĆ

- 3 główne punkty (więcej publiczność *nie zapamięta*)
- każdy z 1 konkretnym przykładem
- otwarcie i zamknięcie napisane *dosłownie*
- **nie** ucz się reszty na pamięć — to zwiększa lęk

MYŚLI ANTYCYPACYJNE

- wypisz najgorsze 3 scenariusze
- dla każdego: „co *realnie* się stanie?”
- alternatywa: „słuchacze są zaabsorbowani *treścią*, nie moim wyglądem”
- użyj narzędzia *myśli przed sytuacją*

MÓJ PIERWSZY PUNKT

— jedno zdanie + przykład

NAJGORSZY SCENARIUSZ

— co konkretnie się stanie

02 ⌚ Etap 2 — 30 minut przed

Fizjologia

4 min oddech 4–6 (wdech nosem 4 s, wydech ustami 6 s). Obniża tętno, zmniejsza drżenie głosu.

Uwaga

Trening 5-4-3 (5 rzeczy widzisz, 4 słyszysz, 3 czujesz fizycznie). Wraca uwaga z głowy do otoczenia.

Postawa

2 min pozycji „mocnej”: stopy szeroko, ramiona w tył, ręce na biodrach. Obniża kortyzol, podnosi pewność.

03 Etap 3 — w trakcie wystąpienia

CO ROBIĆ

- wybierz **3 osoby** w różnych miejscach sali — mów do nich, kolejno
- zwolnij — *2x wolniej* niż chcesz mówić
- po każdym punkcie zrób **3-sekundową pauzę** (publiczność dziękuje)
- zauważ, jaki kolor mają oczy 2 osób

CZEGO NIE ROBIĆ

- nie czytaj slajdów — patrz na słuchaczy
- nie pij wody „bo gardło suche” (zabezpieczenie)
- nie skanuj „czy widać, że się denerwuję”
- nie myśl „jak mi idzie” — myśl o *treści*

Mantra: „kieruję uwagę na słuchaczy i na to, co mówię, nie na to, jak *wyglądam*”. Powtórz w głowie 3 razy w trakcie wystąpienia. To *jedyna* rzecz, którą musisz zapamiętać.

04 Etap 4 — 30 minut po

Strukturalna refleksja, by nie wpaść w pomyślenie po. Wypełnij *od razu*, bez analizowania szczegółów.

CO POSZŁO DOBRZE

— *minimum 3 rzeczy*

CO MNIE ZASKOCZYŁO

— *co poszło inaczej niż przewidywałem/-am*

REAKCJA SŁUCHACZY

— *obserwowalne fakty, nie domysły*

CO POPRAWIŁBYM/-ABYM NASTĘPNYM RAZEM

— *maksymalnie 1 rzecz*

Klucz: wystąpienia uczą Cię tego, co **żadne inne** narzędzie: że *możesz* mówić publicznie z lękiem w ciele i mimo to skończyć dobrze. Lęk *nie* jest dowodem na porażkę — jest dowodem, że wystąpienie jest dla Ciebie ważne. 3 wystąpienia w 6 tygodniach to próg, po którym lęk antycypacyjny przed kolejnymi spada o ~40% (Hofmann 2004). Każde wystąpienie to *1/3 tej drogi*.