

Współczucie *wobec siebie przy wstydzie*

Wstyd aktywuje układ zagrożenia; współczucie aktywuje układ uspokojenia. To nie „bycie miłym dla siebie” — to zmiana stanu układu nerwowego, którą można wytrenować.

CZAS: 15–20 min · poziom średni · Silny, toksyczny wstyd; samokrytyka

ŹRÓDŁO: Gilbert (2010, 2014); Kirby i in. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Ten arkusz zbiera praktyki z terapii skoncentrowanej na współczuciu (CFT, Gilbert) do pracy ze wstydem i samokrytyką. Należą do nich: współczujące przeformułowanie („jestem człowiekiem z trudnościami, to ludzkie, nie wadliwe”), wyobrażenie współczującej wersji siebie (mądrej, silnej, ciepłej), oddech uspokajający (wdech 4, wydech 6), dłoń na sercu, otwarta postawa oraz list od siebie do siebie. Skala nasilenia wstydu przed i po pokazuje efekt.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Sama praca „w głowie” (przekonywanie się, że „nie jestem zły”) często nie zmienia wstydu, bo zostaje on w ciele — a bywa, że pojawia się nawet wstyd z powodu wstydu. Wstyd uruchamia układ zagrożenia, a współczucie — układ uspokojenia, neurobiologicznie odmienny. U osób z chronicznym wstydem ten drugi bywa słabo rozwinięty (np. z powodu braku wczesnego poczucia bezpieczeństwa), więc trzeba go **ćwiczyć**: powtarzane praktyki budują nową ścieżkę, a wstyd słabnie, gdy pojawia się dostępna alternatywa. To wymaga regularności. Niektórzy odczuwają lęk przed życzliwością wobec siebie — wtedy warto zacząć powoli i z ciekawością. To nie „bycie miłym”, lecz zmiana stanu fizjologicznego.

Nasilenie

wstydu — *spokój* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

przytłaczające

PRZED

01 Cztery praktyki

- **współczujące przeformułowanie** — „jestem człowiekiem z trudnościami, to ludzkie, nie wadliwe”
- **współczująca wersja siebie** — mądra, silna, ciepła; patrzy na Twój wstyd bez potępienia
- **fizjologia** — oddech (wdech 4, wydech 6), dłoń na sercu, otwarta postawa
- **eksperyment** — ujawnij coś jednej osobie i zauważ, że nie odrzuca

02 Głos wstydu → głos współczucia

Zapisz, co mówi Twój wstyd, a obok — co powiedziałyby współczująca, mądra wersja Ciebie tej samej osobie.

WSTYD: ... → WSPÓŁCZUCIE: ...

03 ☉ Oddech i gest uspokojenia

Spróbuj: spokojny oddech (wdech 4 s, wydech 6 s), dłoń na sercu, otwarta postawa. Zauważ, co zmienia się w ciele i w nasileniu wstydu. Zapisz.

CO ZMIENIA SIĘ, GDY AKTYWUJĘ USPOKOJENIE

04 ✨ Krótki list współczucia

Napisz kilka zdań do siebie z perspektywy kogoś, kto Cię kocha i rozumie Twój ból. Czytaj, gdy wstyd narasta.

MÓJ LIST

Nasilenie

wstydu —
PO

spokój 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

przytłaczające

Klucz: wstyd aktywuje układ zagrożenia, współczucie — układ uspokojenia. To nie „bycie miłym dla siebie”, lecz zmiana stanu układu nerwowego. Różnica na skali przed/po to Twoja miara skuteczności.

Jeśli życzliwość wobec siebie budzi opór lub lęk, to częste przy chronicznym wstydzie — warto przejść tę pracę z terapeutą.