

Ambiwalencja *wobec bliskich*

Miłość i wrogość wobec tej samej osoby to normalna cecha dojrzałej psychiki. Patologia zaczyna się, gdy pacjent unika sprzeczności — przez idealizację, dewaluację albo wyparcie.

CZAS: 25 min · poziom zaawansowany Zablockowana żałoba; relacja z „idealnym” rodzicem

ŹRÓDŁO: Klein (1935); Winnicott (1956)

JAK UŻYWAĆ

Pozwalasz pacjentowi czuć **dwie sprzeczne emocje wobec tej samej osoby** — bez konieczności wybrania jednej. „Tak, kochała Pani matkę. Tak, była Pani na nią wściekła. Oba są prawdziwe.” Zauważasz jednowymiarowość (idealizacja albo dewaluacja), delikatnie dołączasz drugi biegun, walidujesz oba i pomagasz je zintegrować w obrazie jednej, realnej osoby.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klein opisała dojrzewanie jako przejście do **pozycji depresyjnej**, w której ten sam obiekt jest jednocześnie dobry i zły — co wymaga tolerowania sprzecznych uczuć. W patologii pacjent unika ambiwalencji przez rozszczepienie, wyparcie wrogości lub projekcję, co blokuje integrację i utrwała objaw. Typowe odkrycie: pacjent, który „tylko kocha” zmarłą matkę, nie może przepracować żałoby, bo nieprzyznane wrogie uczucia są zablockowane. Przyznanie ambiwalencji odblokowuje żałobę.

01



Sześć kroków integracji

- ① **Zauważ jednowymiarowość** — sama idealizacja albo sam gniew
- ② **Eksploruj drugą stronę** — „a kiedy było trudno?”
- ③ **Waliduj oba bieguny** — „to normalne kochać i złościć się”
- ④ **Integruj w jednej osobie** — „matka kochała i raniła”
- ⑤ **Żałoba idealnego rodzica** — opłkanie obrazu, który nie istniał
- ⑥ **Akceptacja realnego** — pełna, dwubiegunowa prawda relacji

02



Dołącz drugi biegun delikatnie

Nie walcz z obrazem — idealizacja chroni przed winą, dewaluacja przed stratą; oba są obronami. „Słyszę, jak bardzo kochała Pani matkę. A były momenty, gdy było trudno — gdy była Pani na nią zła?”

BRAKUJĄCY BIEGUN I JAK GO ZAPROSZĘ

03 ✱ Pomagaj trzymać dwie prawdy

„Zastanawiam się — jak to jest teraz trzymać dwie prawdy jednocześnie?" Integracja ambiwalencji często generuje łzy, smutek, czasem ulgę — to żałoba w końcu przeżywana. Nie przyspieszaj; pacjent może potrzebować tygodni.

REAKCJA PACJENTA NA TRZYMANIE OBU PRAWD

04 ☉ Zastosuj do relacji z Tobą

Ambiwalencja wobec terapeuty jest częścią procesu. „Zauważam, że czasem jest Pani na mnie zła i jednocześnie wdzięczna. To zdrowe — relacja nie musi być idealna, żeby być dobra." Zapisz przejawy ambiwalencji w przeniesieniu.

AMBIWALENCJA W RELACJI TERAPEUTYCZNEJ

Klucz: pacjenci, którzy „tylko kochają" zmarłego rodzica, często mają największy zablokowany gniew. Paradoks: dopuszczenie gniewu umożliwia pełną miłość. Dopóki gniew jest wyparty, miłość też nie jest w pełni obecna — bo pozostaje „cenzurowana".