

# Wtórny stres *traumatyczny*

Stres u osób pomagających, które wciąż stykają się z cierpieniem innych. To nie słabość — to znak, że zdrowy układ emocjonalny reaguje na nadmierną ekspozycję. Profilaktyka jest obowiązkiem, nie luksusem.

**CZAS:** 20 min · poziom średni **OSOBY POMAGAJĄCE:** terapeuci, medycy, opiekunowie, ratownicy

**ŹRÓDŁO:** Figley (1995); McCann & Pearlman (1990)

## JAK UŻYWAĆ

Ten arkusz dotyczy wtórnego stresu traumatycznego (ang. *secondary traumatic stress*) i zmęczenia współczuciem (ang. *compassion fatigue*) — obciążenia, jakie ponoszą osoby zawodowo lub rodzinnie stykające się z cierpieniem innych (terapeuci, lekarze, pielęgniarzy, ratownicy, opiekunowie, studenci psychoterapii). Pomaga rozpoznać wczesne i zaawansowane objawy (zmęczenie po kontakcie utrzymujące się godzinami, sny o podopiecznych, unikanie tematów, cynizm, odrętwienie) oraz wdrożyć profilaktykę: higienę między spotkaniami, rytuał „wyłącznika” po pracy, superwizję, własną terapię, granice i regenerację poza pracą.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Stałe stykanie się z cierpieniem innych aktywuje rezonans empatyczny — bez przepracowania to obciążenie się kumuluje. Objawy bywają mylone ze „słabością”, tymczasem są sygnałem, że **normalny układ emocjonalny reaguje na nienormalną ekspozycję**. Czynniki ryzyka to m.in. wysoka ekspozycja, izolacja zawodowa, brak superwizji, perfekcjonizm i „ratownikowy” wzorzec. Profilaktyka działa najlepiej, gdy jest **aktywna, zanim pojawią się objawy**. Paradoks: najbardziej zagrożone są osoby przekonane, że „radzą sobie same i nie potrzebują superwizji” — a najmniej te, które o to dbają. Regeneracja i granice to zawodowy obowiązek, nie luksus.

### 01 Objawy: wczesne i zaawansowane

- **wczesne** — zmęczenie po kontakcie trwające godzinami, sny o podopiecznych, unikanie pewnych tematów
- **zaawansowane** — cynizm („wszyscy są toksyczni”), odrętwienie, „odłączanie się” używkami, unikanie bliskości w życiu prywatnym

### 02 Higiena pracy

- 5–10 min między spotkaniami na odłączenie (oddech, ruch, notatka, spacer)
- rytuał „wyłącznika” po pracy (zmiana ubrania, prysznic, odłożenie notatnika)
- superwizja regularnie (min. raz w miesiącu) — nie tylko „trudne przypadki”
- ograniczenie udziału podopiecznych z traumą w grafiku; różnicowanie

03



### Moje wczesne sygnały

Które wczesne objawy zauważasz u siebie po kontaktach z cierpieniem innych? Wczesne rozpoznanie chroni przed eskalacją.

MOJE SYGNAŁY

---

---

04



### Mój plan ochrony

Wybierz konkretne kroki: higiena między spotkaniami, rytuał wyłącznika, superwizja, granice, regeneracja poza pracą (hobby niezwiązane z pomaganiem). Zapisz, co wdrożysz.

MOJE KROKI OCHRONNE

---

---

**Klucz:** wtórny stres traumatyczny to nie słabość, lecz znak, że zdrowy układ emocjonalny reaguje na nadmierną ekspozycję. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy mówią „ja sobie radzę”; profilaktyka jest obowiązkiem, nie luksusem.

Jeśli objawy się utrzymują lub nasilają, warto skorzystać z superwizji i własnej terapii.