

# Przetwarzanie i Rozpoznawanie Dźwięku

Klasyfikacja utworów muzycznych ze zbioru gtzan.

29 stycznia 2014

Autor: **Paweł Rychły** inf94362 ISWD pawelrychly@gmail.com  
**Dawid Wiśniewski** inf94387 ISWD wisniewski.dawid@gmail.com

# 1 Metody agregacji danych dotyczących współczynników cepstralnych.

W celu agregacji danych pochodzących z różnych okien zastosowano kilka miar. Były to takie podstawowe miary jak: wartość minimalna, wartość maksymalna, wariancja oraz średnia arytmetyczna. Ich znaczenie jest oczywiste, dlatego w dalszej części zawarto opis trzech mniej popularnych ocen sygnału. Dwie pierwsze metody wykorzystują Dyskretną transformatę Fouriera sygnału, oznaczaną literą  $F$ .

## 1.1 Spectral Flatness Measure

Miara ta opisuje jak bardzo analizowany sygnał zbliżony jest do szumu białego. Jeżeli wartość współczynnika jest duża, oznacza to, że wartość analizowanego sygnału (w tym przypadku wartość współczynnika cepstralnego) nie zmienia się lub, że zmienia się w sposób nieregularny. Mała wartość miary mówi o tym, że zmiany wartości współczynników cepstralnych mogłyby zostać opisane za pomocą kilku sinusoid.

$$sfm = \frac{e^{\overline{\ln(F)}}}{\overline{F}} \quad (1)$$

## 1.2 The most significant frequency

Miara ta zawiera informacje o częstotliwości sinusoidy, która ma największy wpływ na kształt funkcji wykreślanej przez zmianę współczynnika cepstralnego w czasie.

$$f_{max} = \operatorname{argmax}(F) \quad (2)$$

## 1.3 Maksymalna korelacja sygnału z własnym przesunięciem.

Ostatnia zastosowana miara, określa maksymalną korelację sygnału (Kolejnych wartości współczynnika cepstralnego), z własnym przesunięciem.