

1. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Anzahl der verkauften Bücher zu unterschiedlichen Preisen in einer Buchhandlung im Laufe eines Tages:

Buchpreis (in €)	Anzahl der verkauften Bücher
[0; 10)	5
[10; 30)	15
[30; 50)	20
[50; 80)	12
[80; 120)	8

- (a) Berechnen Sie die jeweiligen absoluten und relativen Klassenhäufigkeiten

**Lösung:**


Es gilt:

$I_i$	$n_i$	$h_i$	$H_i$	$h_i/ I_i $
[0; 10)	1	$1/12$	$1/12$	$1/120 \approx 0.0083$
[10; 30)	4	$1/4$	$1/3$	$1/80 = 0.0125$
[30; 50)	7	$1/3$	$2/3$	$1/60 \approx 0.0167$
[50; 80)	5	$1/5$	$13/15$	$1/150 \approx 0.0067$
[80; 120)	5	$2/15$	1	$1/300 \approx 0.0033$

□

- (b) Zeichnen Sie das zugehörige Histogramm.

**Lösung:**



□

(c) Bestimmen Sie

i. das arithmetische Mittel,

**Lösung:**

Es gilt:

$$\bar{x} \approx \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^k n_i \cdot \alpha_i = \sum_{i=1}^k h_i \cdot \alpha_i = \frac{5}{12} + 5 + \frac{40}{3} + 13 + \frac{40}{3} = \frac{541}{12} \approx 45.083$$

□

ii. den Median sowie

**Lösung:**

Offensichtlich ist die Einfallsklasse gegeben mit

$$I_3 = [30; 50) = [a_3; b_3)$$

Es gilt damit:

$$\tilde{x} = a_3 + \frac{1/2 - H_2}{h_3} \cdot (b_3 - a_3) = 30 + \frac{1/2 - 1/3}{1/3} \cdot (50 - 30) = 40$$

□

iii. das obere und untere Quartil.

**Lösung:**

Offensichtlich ist die Einfallsklasse für das untere Quartil gegeben mit

$$I_2 = [10; 30) = [a_2; b_2)$$

und die für das obere Quartil mit

$$I_4 = [50; 80) = [a_4; b_4)$$

Es gilt damit:

$$x_{1/4} = a_2 + \frac{1/4 - H_1}{h_2} \cdot (b_2 - a_2) = 10 + \frac{1/4 - 1/12}{1/4} \cdot (30 - 10) = \frac{70}{3}$$

und

$$x_{3/4} = a_4 + \frac{3/4 - H_3}{h_4} \cdot (b_4 - a_4) = 50 + \frac{3/4 - 2/3}{1/5} \cdot (80 - 50) = \frac{130}{2} = 62.5$$

□