



Wyniki badań obrazowych

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Nazwisko i imię: **Krupa Adam**

PESEL: **07242908992**

Data ur. (płeć): **2007-04-29 (M)**

Adres: **Glebowa 19e**

Miejscowość: **61-017 Poznań-Nowe Miasto**

Gmina/Powiat: **Poznań-Nowe Miasto / Poznań**

Nr wyk. głównego: **2418528**

W szpitalu: od **2024-09-24 09:04**

do **2024-09-27 11:39**

Nr wyk. oddziałowego: **241824**

Na oddziale: od **2024-09-24 09:04**

do **2024-09-27 11:39**

Płatnik: **15**

Dane skierowania:

Data skierowania: **2024-09-27**

Data badania: **2024-09-27 06:57**

Numer księgi pracowni: **466**

Lekarz kierujący: **Wilawer Małgorzata NPWZ 4039843**

Jednostka kierująca: **13-XIII Oddz. Gastroenterologii, I: 000000018582, V: 01, VII: 038, VIII: 4051**

Cel badania: **Proszę o wykonanie badania enterografii z kontrastem u chłopca. W wywiadzie okresowe bóle brzucha od zawsze 1-2x w miesiącu niewybudzające w nocy. Chwilowy, skurczowy ból brzucha. Stolec odaje stolec w skali BBS typ 2-3 raczej codziennie, czasem co 1-2 dzień, bez patologicznych domieszek. W ostatnim tygodniu stolce co 3 dni. Dodatkowo, zgłasza występowanie nawracających luźnych stolców około 1x w miesiącu, z poprawą po zastosowaniu probiotyku. Dieta pełna. Podaje spadek masy ciała, niewielki, ale podaje, że bardzo stresuje się i wówczas ma zmniejszony apetyt. Chłopiec leczony psychiatrycznie z powodu depresji, podejrzenia CHaD. Leki na stałe - kabamazepina 1x100 mg, piracetam 1200 mg Alergie na leki - wysypka zwykle po podaniu leku na oddziale neurochirurgii - w epikryzie informacja, że pojawiała się wysypka zwykle po leczeniu sterydami systemowymi. W badaniu genetycznym w 2022 - Zespół Lynch. Wywiad rodzinny - prababcia z rakiem płuc od strony taty około 70 lat. Po stronie mamy w linii kobiecej nowotwory - rak żołądka, mózgu, trzustki, jajnika, wątroby, rak prostaty**

Płatnik: **Szp.**

Enterografia z kontrastem

Enterografia MR.

Badanie MR jelita cienkiego z doustnym i dożylnym podaniu środka kontrastującego.

Badanie wykonano w sekwencjach HASTE, z saturacją tłuszczu, w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w obrazach T1 zależnych po podaniu środka kontrastowego.

Pętla jelita czczego, dwunastnica zapadnięta.

Badanie wykazało swobodny pasaż doustnego środka kontrastowego przez pętle jelita cienkiego do jelita grubego.

Ileum terminale o niepogrubiałej ścianie bez cech zwężenia. Pozostałe ściany jelita cienkiego niepogrubiałe. Światło jelita na poziomie zastawki Bauhina prawidłowe.

Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie stwierdza się patologicznego wzmocnienia ściany.

Okoliczna tkanka tłuszczowa o prawidłowym sygnale.

Węzły chłonne krezkowe nieliczne, niepowiększone (nie przekraczają 5 mm w osi krótkiej).

Pracownik wykonujący: Kwapiszewska Anna NPWZ brak

Lekarz opisujący: dr med. Strzelczuk-Judka Lidia NPWZ 2507923 specjalizacje specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej