

CH2 直線運動

運動學簡介

討論 1

學校前往宜蘭的幾米公園的路線有以下四種，四張地圖分別是什麼路線？（填代號）

選項：A 無敵海景濱海公路、B 風光明媚九彎十八拐、C 假日必塞雪山隧道、D 做白日夢任意門



⇒ 如果只描述起點和終點的位置移動，我們通常會用 _____ 來表示。

指的是一段帶有方向的 _____ 距離，定義成：_____ 位置－ _____ 位置。如路線 _____。

⇒ 如果想要知道質點移動的軌跡，我們會用 _____ 來表示。如路線_____。

速度與加速度

我們常用物理量 _____ 來表示物體移動的快慢程度。

情境一：百米賽跑時，跑得愈快，秒數愈多/少，速度量值應該會愈大/小。

情境二：通過等寬的馬路，行人的行走速度通常比兒童的行走速度快/慢，速度量值會愈大/小。



【結論】

1. 根據以上討論，速度應該定義成 $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$ / $\frac{\text{時間}}{\text{位移}}$ 比較合理
2. 速度的 SI 單位是 _____ / _____，反方向用 _____ 表示。
3. 如果用「路徑長」來描表示軌跡，則可以用 _____ 來表示運動的快慢，定義為 _____

討論 2

行人紅綠燈的綠燈秒數是以行人步寬推得。通常估計成人每秒可走 1 公尺，兒童則是 0.8 公尺。如果某學區的路寬 12 公尺，則此路段在「上學期間」應至少提供幾秒的行人綠燈秒數？



討論 3

依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，汽機車在路面行駛時，不同的行車速度，需要設置不同秒數的黃燈。規則如下：

行車速限（公里 / 小時）	黃燈秒數
< 50	3
51 ~ 60	4
> 61	5

這樣設計是因為：

行車速度愈高，
需要愈多 / 少時間才能停下來

⇒ 我們常用物理量 _____ 來表示速度變化的大小。

⇒ 馬力愈大的車子，
上升到相同的速度所需的時間愈 長 / 短。加速度量值會愈 大 / 小。



【結論】


1. 根據以上討論，速度應該定義成 $\frac{\text{速度變化}}{\text{時間}} / \frac{\text{時間}}{\text{速度變化}}$ 比較合理
2. 速度的 SI 單位是 / = / ，減速用 表示。

討論 4


阿詠騎著新買的電動機車在限速 50 km/hr 的道路兜風，遇到黃燈時緩緩停下來。假設電動車的煞車系統可以提供 20 m/s^2 的加速度。如果阿詠花了 2 秒將車煞到靜止，則阿詠起初的車速是多少 km/hr？

物體運動圖


1. 下列「位置－時間」圖分別代表物體如何運動？
2. 比較每一張圖裡的平均速度 $\bar{v}$ 和第五秒的瞬時速度 v_5 的大小



A：_____



B：_____ 運動



C：_____ 運動

$$\bar{v} \text{ ____ } v_5 = \text{ ____ } \text{ m/s}$$


$$\bar{v} \text{ ____ } v_5 = \text{ ____ } \text{ m/s}$$

$$\bar{v} \text{ ____ } v_5 \text{ m/s}$$



速度 = $\frac{\text{位移}}{\text{時間}}$ ，就是 x-t 圖的 _____


3. 下列「速度－時間」圖分別代表物體如何運動？



A：_____ 運動

– 加速度：__


– 五秒內的位移：_____ m



B：_____ 運動

– 加速度：_____ m/s^2

– 五秒內的位移：_____ m



C：_____ 運動

– 加速度：_____ m/s^2

– 第五秒的瞬時速度 v_5 ：
_____ m/s

– 五秒內的位移：_____ m



加速度 = $\frac{\text{速度變化}}{\text{時間}}$ ，就是 _____ 圖的斜率

位移 = 速度 $\times$ 時間，也就是 v - t 圖線下的 _____

討論 5（大本p.32-例1）

一物體作直線運動，先以 4 m/s^2 的等加速度從靜止開始運動，接著以 -2 m/s^2 的等加速運動直到停止。若運動的總距離為 150 m ，則此物體運動所需時間為多少秒？

等加速度運動


- 在真實生活情境裡，大多會遇到有 / 沒有加速度的運動。為了簡化分析，科學家習慣把複雜的運動簡化為一段一段的等加速度運動。
- 如果物體只受_____作用，此時的加速度稱為重力加速度（代號：__），地表附近的 g 值約為 _____ m/s^2

【情境一】

(重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

小詠在高樓把青椒以初速 30 m/s 上拋

- 1 秒後，青椒的速度會變成 ____ m/s
- 標示方向的話，重力加速度應該寫為 ____ m/s^2
- 青椒在 ____ 秒後會達到最高點
- 青椒在最高點的速度為 ____
- 5 秒末，青椒的速度是 ____ m/s ，速率是 ____ m/s
- ____ 秒後，青椒會落回原本的高度
- 請畫出青椒每秒的位置。
- 若青椒拋出7秒後落地，則青椒落地前的瞬時速度是 ____ m/s ，速率是 ____ m/s
- 樓高為 ____ 公尺

**【情境二】**

(重力加速度大小 g)


小詠在高樓把青椒以初速 v_0 上拋

(a) t 秒後，青椒的速度會變成：_____

(b) 標示方向的話，重力加速度應該寫為 _____



(c) 青椒在達到最高點所需的時間是：_____

(d) 青椒在最高點的速度為 ____



p.s 最高點又稱為_____點，此時狀態屬於 / 不屬於靜止（靜止：速度_____在 0）

等加速度關係式



1. 末速度 $v =$ 初速 v_0 + 速度變化量 Δt ，寫成：

1. 面積法求位移：


1. 梯形公式中，將分子分母同 $\times a$ ：

討論 6（大本p.46–類4）

將一小球自樓頂鉛直向上拋，若其在樓頂上方 5 公尺處的速率為在樓頂下方 10 公尺處的一半，則小球所能達到之最高點在樓頂上方幾公尺處？（重力加速度為 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）



【延伸】



面積與時間間隔的關係

討論 7 (大本p.49-3)

一滴管管口高出地板 81 公分,且每滴水滴下之時距均相同,第 1 滴水滴到達地板時,第 4 滴水恰好要滴下,則此時第 3 滴水距地板高若干公分?

討論 8

物體從樓高45公尺處以初速為0自由落下,則:(取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

(a) 物體花費 __ 秒落地,平均速度為 ____ m/s


(b) 1.5秒時的瞬時速度為 ____ m/s



等加速度運動中,某時段的平均速度=該「時間 _____」的瞬時速度

討論 9

直線運動定律實驗得一紙帶紀錄如右圖，假定計時器的週期為 $\frac{1}{12}$ 秒，則：



尺（刻度為公分）

(a) 週期 = 每個點之間經過的 _____

(b) 第 4~6 點間的平均速度分別為 _____ cm/s，相當於時間中點 $t = \underline{\hspace{1cm}}$ 的瞬時速度
第 5~7 秒間的平均速度為 _____ cm/s，相當於時間中點 $t = \underline{\hspace{1cm}}$ 的瞬時速度

(c) 物體的加速度大約為多少 cm/s^2 ？

相對運動

1. 觀察者永遠覺得自己是不動的，

例如：月台上的劍士看到**列車向左**行駛時，列車上的魔法師看到月台上的人向 _____ 遠離

2. 分析：當我們在移動的車上，會看見往反向飛的電線桿





分析相對運動的關鍵是：讓觀察者的「位移」、「速度」、「加速度」都歸零

討論 10 (大本p.58–類1)

在一直線的高速公路上,有 A、B 兩車在同一車道上以等速度行駛。A 車的速度為 80 km/hr ，B 車落在 A 車之後 5 km 處，正以 110 km/hr 的速度追趕 A 車。試求 B 車經過 ____ 分鐘可追上 A 車。


討論 11 (大本p.59–類2)

在 $t = 0$ 的時候，從高 75 公尺 的大樓陽臺邊自由落下一石子，同時有一球自樓底正下方以初速 25 m/s 鉛直上拋，當 $t = \underline{\hspace{1cm}}$ 時，兩物會相遇。

延伸閱讀



[打點計時器實驗](#)



[羽毛鉛球同時落地](#)

重點回顧 & 悄悄話專區