
Teoría de la integral y de la medida
Hoja n^o 1 (Introducción)

1. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ monótona y acotada. Probar que f es integrable Riemann.
2. Probar que si las funciones $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ son integrables Riemann y forman una sucesión uniformemente convergente a cierta función f , entonces f es integrable Riemann y se tiene $\int_a^b f = \lim_n \int_a^b f_n$. Dar ejemplos de cómo, si el límite NO es uniforme, *puede* que no exista la integral $\int_a^b f$, o que no coincida con el $\lim_n \int_a^b f_n$.
3. Probar las desigualdades:
 - i) $A \subset B \implies m^*(A) \leq m^*(B)$
 - ii) $m^*\left(\bigcup_{k \geq 1} A_k\right) \leq \sum_{k \geq 1} m^*(A_k)$
4. Probar que todo conjunto numerable tiene medida exterior de Lebesgue nula. Encontrar un conjunto denso en $[0, 1]$ de medida nula.
5. Probar que la unión numerable de conjuntos de medida exterior de Lebesgue nula tiene medida nula.
6. Probar que si $A \subset [0, 1]$ cumple $m^*(A) = 1$, entonces A es denso en $[0, 1]$.
7. Demostrar que dado un intervalo I cualquiera de \mathbf{R} se tiene $m^*(I) = \text{long}(I)$. *Indicación:* probar primero que si $\{I_k\}_{k=1}^n$ es un recubrimiento finito de I por intervalos se tiene que $\sum_{k=1}^n \text{long}(I_k) \geq \text{long}(I)$. A continuación usar un argumento de “compacidad”.
8.
 - a) Demostrar que si $m^*(A) = 0$ entonces $m^*(A \cup B) = m^*(B)$, $\forall B \subset \mathbf{R}$.
 - b) Lebesgue definió la clase de subconjuntos medibles de $[0, 1]$ como la de aquellos $A \subset [0, 1]$ tales que $m^*(A) + m^*(\mathcal{C}A) = 1$, (donde $\mathcal{C}A = [0, 1] \setminus A$). Demostrar que si $m^*(A) = 0$ entonces A es medible.
9. Probar que el conjunto D de números en $[0, 1]$ tal que su desarrollo decimal no contienen el 5 es un conjunto de medida (exterior de Lebesgue) cero (i.e., $m^*(D) = 0$).
10. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ acotada. Definimos $\mathcal{O}_f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left\{ \sup_{|x-y| \leq \delta} f - \inf_{|x-y| \leq \delta} f \right\}$. ⁽¹⁾
 - a) Probar que f es continua en x si y solo si $\mathcal{O}_f(x) = 0$.
 - b) (*) Demostrar el Teorema de Lebesgue: f es integrable en el sentido de Riemann si y solo si $\forall k = 1, 2, \dots$, el conjunto $E_k = \{x \in [a, b] : \mathcal{O}_f(x) \geq 1/k\}$ tiene medida nula.

¹ $\mathcal{O}_f(x)$ denota la oscilación de f en x .