

# Hoja 8: Determinantes

1. Calcular los siguientes determinantes:

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 1 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 6 & 2 & 7 & -3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & -3 & 4 \\ -3 & 2 & -1 & 0 & 6 \\ 3 & 1 & 6 & -4 & 8 \end{vmatrix}.$$

2. Sabiendo que 58786, 30628, 12831, 80743 y 16016 son divisibles por 13, demostrar que

$$\begin{vmatrix} 5 & 8 & 7 & 8 & 6 \\ 3 & 0 & 6 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & 8 & 3 & 1 \\ 8 & 0 & 7 & 4 & 3 \\ 1 & 6 & 0 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

es también divisible por 13.

3. Sea  $A$  la matriz definida por  $a_{ij} = |i - j|$ . Calcular  $|A|$ .

(Sugerencia: Empezar restando a cada columna la anterior. Sol:  $(-1)^{n+1}(n-1)2^{n-2}$ )

4. Calcular

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 3 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 2 & 4 & 4 & \dots & n-1 & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n & n \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n+1 \end{vmatrix}$$

(Sugerencia: sumar primero todas las columnas. Sol:  $\frac{n(n+1)+2}{2}$ )

5. (**Determinante de Vandermonde**). Dados  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ , demuestra la igualdad:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i < j} (x_j - x_i).$$

(Sugerencia: Razonar por inducción. Empieza restando a cada columna la anterior multiplicada por  $x_1$ )

6. Un polinomio de grado  $n \in \mathbb{N}$  con coeficientes reales es una expresión de la forma

$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ , con  $a_j \in \mathbb{R}, j = 0, 1, \dots, n$  y  $a_n \neq 0$ .

a) Demostrar que  $n + 1$  valores distintos de la variable  $x$  determinan de manera única un polinomio de grado  $n$ . (Sugerencia: Usar el determinante de Vandermonde.)

b) Demostrar que si un polinomio de grado  $n$  tiene  $n + 1$  soluciones reales distintas ha de ser el polinomio nulo.

7. Resolver los siguientes sistemas utilizando la regla de Cramer:

$$(a) \begin{cases} 3x + 2y + 4z = 1 \\ 2x - y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 1 \end{cases} \quad y \quad (b) \begin{cases} 3x + 2y + 4z + t = 1 \\ 2x - y + z - 3t = 6 \\ x + 2y + 3z - t = 1. \end{cases}$$

8. Sea  $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{Z})$  una matriz cuadrada con entradas enteras. Demostrar que existe  $B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{Z})$  tal que  $AB = BA = I_n$  si y sólo si  $\det A = \pm 1$ .

9. Sean  $n \geq 3$  y  $A$  matriz  $n \times n$ .

a) Demostrar que si  $\text{rango}(A) = n - 1$  entonces la **matriz de adjuntos**  $\text{adj}(A)$  tiene  $\text{rango} = 1$ .

b) Demostrar que si  $\text{rango}(A) \leq n - 2$  entonces  $\text{adj}(A) = 0_{n \times n}$ .

10. Una matriz cuadrada  $A$  se dice *simétrica* si  $A = A^t$  y se dice *antisimétrica* si  $A = -A^t$ .

a) Demostrar que toda matriz cuadrada se puede escribir como una suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

b) Demostrar que si  $A$  es antisimétrica y de orden impar,  $|A| = 0$ .

c) ¿Es cierto el resultado de la parte b) si  $A$  es de orden par?

11. Sea  $A \in \mathbb{M}_{r \times n}(\mathbb{K})$  una matriz con  $0 < r < n$ . Demostrar que  $\det(A^t A) = 0$ .

12. Sea  $n = 0, 1, 2, \dots$

a) Deducir una fórmula para calcular  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$  y demostrarla por inducción.

b) Deducir una fórmula para calcular  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n$  y demostrarla por inducción.

13. Hallar los valores de  $m$  para los que el sistema

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + my - z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

posee soluciones no triviales.

14. Utilizar determinantes para hallar la inversa de las siguientes matrices:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

15. Hallar las soluciones de los siguientes sistemas usando determinantes:

$$(a) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -x + 3y = 0 \\ 2x + 6y + 3z = 3 \end{cases} \quad y \quad (b) \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 8x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 7x_4 + 2x_5 = 0 \\ x_1 + 11x_2 - 12x_3 + 34x_4 - 5x_5 = 0 \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 16x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$