## Cálculo II.

1º DE GRADO EN MATEMÁTICAS Y DOBLE GRADO INFORMÁTICA-MATEMÁTICAS. Curso 2019-20. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

## Hoja 2

## Límites y continuidad de funciones de varias variables

1.- Dibujar las curvas de nivel y las gráficas de las siguientes funciones  $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ .

(a) 
$$f(x,y) = x + y - 2$$
 (b)  $f(x,y) = x^2 + 4y^2$ 

(b) 
$$f(x,y) = x^2 + 4y^2$$

(c) 
$$f(x,y) = -x^2 y^2$$

$$(d) f(x,y) = \frac{y}{1+x^2}$$

(e) 
$$f(x,y) = \max\{|x|, |y|\}$$

(d) 
$$f(x,y) = \frac{y}{1+x^2}$$
 (e)  $f(x,y) = \max\{|x|,|y|\}$  (f)  $f(x,y) = \cos^2(x^2+y^2)$ 

2.- Dibujar las superficies de nivel de las siguientes funciones  $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ .

(a) 
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2$$
.

(b) 
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$$
.

(c) 
$$f(x, y, z) = \exp(x^2 + y^2 + z^2)$$
.

(d) 
$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z$$
.

3.- Para cada una de las funciones dadas, se pide determinar su dominio (es decir, el conjunto de puntos  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$  donde está definida).

(a) 
$$f(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

(b) 
$$f(x,y) = \frac{\cos(x^2 + y)}{x^2 - y}$$

(a) 
$$f(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$
. (b)  $f(x,y) = \frac{\cos(x^2 + y)}{x^2 - y}$ . (c)  $f(x,y) = \frac{\log(x - y)}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$ .

4.- Halla razonadamente los siguientes límites

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^2 \sin y^2 + y^2 e^{-|x|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5\,x^2 \mathrm{sen}\,y^2 + y^2 e^{-|x|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}\,, \qquad \lim_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \mathrm{cos}\,\frac{4xy}{5x^2 + 3y^2}\,, \qquad \lim_{(x,y)\to\infty} \frac{\mathrm{m\'ax}\{|x|,|y|\}}{\sqrt{x^4 + y^4}}\,.$$

$$\lim_{(x,y)\to\infty} \frac{\max\{|x|,|y|\}}{\sqrt{x^4 + y^4}}$$

5.- ¿Cuál de los siguientes límites existe?

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4xy}{5x^2+3y^2},$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4xy}{5x^2+3y^2}\,, \qquad \qquad \lim_{(x,y)\to(0,0)} y\cos\frac{4xy}{5x^2+3y^2}\,.$$

6.- Sea

$$f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$$

definida para los  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$  tales que  $x+y \neq 0$ . Demostrar que

$$\lim_{x \to 0} \left( \lim_{x \to 0} f(x, y) \right) = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \left( \lim_{y\to 0} f(x,y) \right) = 1 \qquad \text{y} \qquad \lim_{y\to 0} \left( \lim_{x\to 0} f(x,y) \right) = -1.$$

¿Existe el límite de f(x,y) cuando  $(x,y) \to (0,0)$ ?

7.- Sea f(x,y) definida mediante

$$f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2y^2 + (x-y)^2}$$

en los  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$  tales que  $x^2y^2 + (x-y)^2 \neq 0$ . Demostrar que

$$\lim_{x \to 0} \left( \lim_{y \to 0} f(x, y) \right) = \lim_{y \to 0} \left( \lim_{x \to 0} f(x, y) \right) = 0$$

1

y que no existe el  $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ .

8.- Demostrar que la función

$$f(x,y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x} + x \sin \frac{1}{y}, & \text{si } x, y \neq 0 \\ 0, & \text{en el caso contrario} \end{cases}$$

tiene límite cuando (x, y) tiende a (0, 0) y que, sin embargo, no existen los límites iterados

$$\lim_{x \to 0} \left( \lim_{y \to 0} f(x, y) \right) \qquad \text{y} \qquad \lim_{y \to 0} \left( \lim_{x \to 0} f(x, y) \right).$$

9.- En cada una de las funciones que siguen, se pide determinar los conjuntos de puntos  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  donde están definidas y donde son continuas.

(a) 
$$f(x,y) = \tan \frac{x^2}{y}$$
. (b)  $f(x,y) = \arctan \frac{y}{x}$ . (c)  $f(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ .

10.- Se considera la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy - y}{(x-1)^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (1,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (1,0) \end{cases}$$

¿Es f continua en (1,0)?

11.- ¿Se pueden hacer continuas las funciones

$$f(x,y) = \frac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, \qquad g(x,y) = \frac{7xy}{2x^2 + 5y^2}, \qquad h(x,y) = \frac{1}{\log\sqrt{x^2 + y^2}}$$

definiéndolas de forma adecuada en (0,0)?

12.- Para cada  $(x,y) \neq (0,0)$  se define

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

Hallar el límite de f(x,y) cuando  $(x,y) \to (0,0)$  a lo largo de la rectas  $y = \lambda x$ . ¿Es posible definir f(0,0) de modo que f sea continua en (0,0)?

13.- Sea

Demostrar que  $f(x,y) \longrightarrow 0$  a lo largo de cualquier recta que pase por el origen. Hallar una curva que pase por el origen a lo largo de la cual (salvo en el origen) f(x,y) tiene el valor constante 1. ¿Es f continua en el origen?

- 14.- Demuéstrese que  $\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)^{x^2y^2} = 1$ . (Sugerencia. Obsérvese que  $0 \le 2|xy| \le x^2+y^2$ .)
- 15.- Utilizando razonamientos con funciones continuas, demuestra que los siguientes conjuntos son cerrados:

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 5x^2 + 6y^2 = 30\},$$
  

$$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le 1 + \sin^2(x+y)\}.$$

Demuestra también que los siguientes son abiertos:

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^6 + 2y^2 + z^4 < 7\},$$
  

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 1, \exp(x^2 + y^2 - 5) < e\}.$$

2