Quercus coccifera L.

Coscoja, maraña, matarrubia, carrasca, chaparra, chaparro

MEMORIA

Variación taxonómica y genética

Perteneciente a la familia de las Fagáceas, la coscoja es un arbusto de hasta 2 m, raramente arbolillo de hasta 6 m o más. Corteza cenicienta y lisa. Renuevos con tomento estrellado, ralo, tempranamente caduco. Yemas 1-2 mm, ovoideo-globosos, glabrescentes. Hojas de oblongas a elípticas u obovadas, dentado espinosas, raramente enteras, las que son más frecuentes en las plantas arborescentes; las adultas, brillantes, verde-oscuras por el haz y verde-amarillentas por el envés, glabras o glabrescentes, raramente pubescentes, por el envés, en la base; nervios secundarios poco visibles; con o sin nervios sinuales; pecíolo glabrescente. Amentos masculinos (1)2-5 cm, de raquis glabrescente; perianto de lóbulos ovado-agudos, ciliados; anteras mucronadas, glabras pero papilosas, algo más cortas que los filamentos. Estilos lineares, libres, divergentes desde la base, con estigmas reflejos. Aquenio de maduración bienal o anual; de color castaño cuando maduro; pedúnculo fructífero 4-12 mm, rígido, glabro; cúpula 10-20x12-25 mm, con escamas ovado-lanceoladas, más o menos imbricadas, las inferiores aplicadas, las medias y superiores a menudo prolongadas en punta rígida y punzante, patentes o reflejas.

Distribución y autoecología

Es una de las especies más características de la región Mediterránea. Takhtajan (1986) la incluye en su trabajo sobre las regiones florísticas como elemento fundamental de las provincias ibéricas y mediterráneas.

Otros autores la consideran como uno de los principales elementos del bosque termófilo infrailicino. Según Font i Quer (1956), a una posición por debajo de la encina, en cuanto a nivel o grado de requerimientos hídricos.

Las primeras referencias paleobotánicas que se tienen acerca de la coscoja se sitúan en un ancestro muy localizado en sedimentos del Oligoceno inferior en el sur de Francia. No es, sin



embargo, hasta el Mioceno medio cuando se encuentran, en Hungría, fósiles con sus caracteres típicos. En el Pleistoceno y en el Holoceno se hacen patentes sus representaciones en la cuenca mediterránea, particularmente hacia el final el neolítico (en yacimientos franceses).

Actualmente, el área de distribución de *Quercus coccifera* se circunscribe al perímetro mediterráneo. Siendo más frecuente en la parte occidental de la cuenca mediterránea. Su presencia en la Península Ibérica es notable, con representación en la mayoría de las regiones españolas y con manifestaciones también en el centro y sur de Portugal. Falta en Galicia, Asturias, Cantabria, y gran parte de la comunidad castellano-leonesa. Es rara en las provincias de Álava y Guipúzcoa y abundante en el sur, sureste, Levante y centro de la Meseta sur.

Según Flora Ibérica, se presenta en la provincias geográficas andaluzas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Málaga. Es decir se encuentra presente dentro de todas las provincias andaluzas.

De forma genérica habita sobre terrenos secos y pedregosos, calizos o con menor frecuencia silíceos, donde constituye matorrales densos e in-

trincados, que en muchos casos representan formaciones secundarias resultantes de la degradación de encinares. El rango altitudinal definido para esta especie es desde el nivel del mar hasta los 1000 (1100 m) aproximadamente.

Variación climática

Especie que presenta un espectro de requerimientos ambientales bastante amplio, por lo que es posible encontrarla en ambientes diferentes. Prefiere climas cálidos o templado-cálidos, admitiendo localmente los fríos, donde busca las situaciones de exposición en solana.

En los climas semiáridos también se presenta, incluso en zonas de montaña cuando el clima es árido.

Puede ascender en las montañas hasta los 1500 m como es el caso de La Sagra (Huéscar, Granada), aunque como agrupación vegetal no suele sobrepasar los 1000-1100 m.

Desde un punto de vista bioclimático, la coscoja se presenta en los piso bioclimáticos termo y mesomediterráneo.

En cuanto a las precipitaciones, su ambiente más favorable se sitúa entre los 400 y 800 mm anuales, aunque se presenta de lugares donde se recogen en torno a los 200 mm con es el caso de Cabo de Gata (Al), y en aquellos donde precipita más de 1000 mm, como es caso de Grazalema.

La gran capacidad que presenta la coscoja para soportar situaciones de estrés producidas por variaciones ambientales de distinto tipo le otorgan un carácter privilegiado en la competición frente a otras especie leñosas. Larcher (1977) estudió la variación estacional del crecimiento de su cámbium. La coscoja tiene la capacidad de detener rápidamente su crecimiento en grosor en dos periodos estacionales: por influencia de la sequía estival y por disminución de la temperatura en invierno. El crecimiento se reanuda inmediatamente si se anulan las condiciones que han provocado su interrupción. Encinas y quejigos mantienen esta facultad en el periodo estival; en invierno, sin embargo detienen con anterioridad su crecimiento.

Según la clasificación fitoclimática de Allué la coscoja habita preferentemente en lugares de clima Mediterráneo genuino, aunque también habita en el Mediterráneo subsahariano. De forma puntual se presenta en el sureste andaluz, donde las precipitaciones son menores de 200 mm anuales, es decir en el fitoclima Subsahariano submediterráneo, así como en clima Nemoromediterráneo genuino donde las precipitaciones son superiores a 750 mm anuales.

Variación edáfica

Respecto al sustrato donde se presenta, la coscoja se muestra indiferente a la naturaleza del mismo, aunque predomina sobre sustratos pedregosos. Sobre suelos calizos o básicos es capaz de situarse donde otras especies arbustivas responden mal ante la poca potencia de suelo. Se presenta por tanto en sustratos de naturaleza básica como ácida. Los suelos que coloniza son también variados, desde los litosoles hasta los cambisoles cálcicos, cambisoles eútricos, vertisoles, xerosoles, etc.

Vegetación

La coscoja forma parte de gran cantidad de comunidades vegetales como son los encinares térmicos y mesófilos, los alcornocales, los pinares de *Pinus pinaster*, *Pinus pinea*, *Pinus halepensis*, así como comunidades llamadas coscojares donde la especie dominante es la coscoja.

Se acompaña por tanto de especies vegetales termófilas como el *Pistacia lentiscus*, *Chamaerops humilis*, *Ceratonia siliqua*, *Olea europea* var. *sylvestris*, *Rhamnus alaternus*, *Rhamnus lycioides*, *Phillyrea latifolia*, *Osyris quadripartita*, etc.

En el área más árida donde se presenta formando parte de cortejos xerotérmicos constituidos por ella misma, la *Periploca laevigata*, *Maytenus senegalensis*, *Whitania frutescens*, etc.

En el ambiente del alcornocal, la coscoja está presenta como compañera, participando de forma destacada en las etapas regresivas. Estos alcornocales constituyen formaciones intervenidas y modificadas por el tratamiento silvícola dirigido a la explotación de corcho. El suelo es ocupado por la coscoja, pudiendo llegar a convertirse en el elemento principal de la comunidad. En estas ocasiones casi siempre se acompaña por especies termófilas y que denotan el carácter ácido del sustrato como son el *Cistus ladanifer*, *Cistus crispus*, *Erica australis*, *Erica scoparia*, *Lavandula stoechas*, *Chamaespartium tridentantum*, etc.

Series de vegetación

Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de *Quercus rotundifolia* o encina (**Pyro**

bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum).

Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de *Quercus rotundifolia* o encina (**Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum**).

Serie termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmeda silicícola de *Quercus rotundifolia* o encina (**Myrto-Querceto rotundifoliae sigmetum**).

Serie termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda vertícola de *Olea sylvestris* o acebuche (**Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum**).

Serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de *Quercus coccifera* o coscoja (**Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum**).

Serie termo-mesomediterránea cálida, murciano-almeriense semiárido-seco inferior de la coscoja o *Quercus coccifera* (**Bupleuro gibraltarii-Pistacieto lentisci S.**).

Serie termo-mesomediterránea bermejense subhúmeda-húmeda serpentinícola del pino resinero o *Pinus pinaster* (**Pino pinastri-Quercetum cocciferae S.**).

Descripción

Tras el análisis territorial efectuado, y teniendo en cuenta los requerimientos ambientales de la coscoja, se define una sola procedencia que engloba todos los terrenos térmicos por debajo de los 1100 m de altitud, de distintas naturaleza, ácidos y básicos, sobre suelos también variados, desde cambisoles a litosoles, vertisoles y xerosoles, etc.

El hecho de definir una sola procedencia se pone de manifiestos por la continuidad demostrada entre las masas de dicha especies. Desde Sierra Morena, formando parte en los encinares con piruétano y alcornocales, desciende hacia la Depresión del Guadalquivir, siendo su presencia escasa pero representativa en los setos y restos de vegetación que quedan aún, acercándonos hacia el litoral onubense y gaditano, donde encontramos coscoja en el ambiente del pinar de piñonero y alcornocal. Cuando nos situamos en las llamadas tierras de bujeo, nos encontramos con esta especie formando parte de distintas formaciones vegetales y en concreto con acebuchares, llegando a las areniscas oligocenas del complejo aljíbico y encontrando a la coscoja como especie acompañante de alcornocales, quejigares y demás formaciones vegetales de carácter de degradación como son los madroñales y jarales. Continuando por el territorio tanto hacia el norte como el este se introduce en los encinares termófilos, pinares de pino resinero y carrasco. Se avanza hacia el este y por las sierras costeras, se presenta la coscoja llegando hasta la provincia de Almería y a los terrenos más áridos de Andalucía, como son Sierra del Cabo de Gata. A través de los pasillos tanto de Fiñana, Chirivel y Almanzora penetra la coscoja y se localiza en todas las partes bajas de las sierras de Filabres, María, Baza, Orce, así como sierras menores, llegando hasta las partes bajas de Cazorla, Segura llegando a ponerse en contacto con las coscojas de Sierra Morena.

Regiones de uso

