


Komplekse tall



Divisjonstriks: $\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}}$


$$r e^{i\theta} \cdot s e^{i\varphi} = r s e^{i\theta + i\varphi} = r s e^{i(\theta + \varphi)}$$

n-te røtter $z = r e^{i\theta}$ der $\theta \in [0, 2\pi)$

$$w_0 = (r e^{i\theta})^{1/n} = r^{1/n} (e^{i\theta})^{1/n} = r^{1/n} e^{i(\theta/n)}$$

$$w_+ = e^{i(2\pi/n)}$$

$$w_1 = w_+ w_0 \text{ osv.}$$



Algebraens fundamentalteorem

$$P(z) = c_n z^n + \dots + c_1 z + c_0$$

har kompleks faktorisering

$$P(z) = c_n (z - r_1) \dots (z - r_n)$$

Reell faktorisering for reelle polynomer $P(z)$ finnes ved å gange sammen faktorer som tilsvarende konjugerte røtter.

eks. $(z - i)(z + i)(z - 1) = (z^2 + 1)(z - 1)$

$$= z^3 - z^2 + z - 1 = P(z)$$

Røtter for $P(z)$: $z = i$, $z = -i$, $z = 1$

Komp. faktorisering: $P(z) = (z - i)(z + i)(z - 1)$

Reell — — — : $P(z) = (z^2 + 1)(z - 1)$

Følger a_1, a_2, a_3, \dots

Følgen voksende og oppad begrenset \Rightarrow Konv.

-- avtakende " nedad -- \Rightarrow Konv.

Fra kompl.
hetsprins.
sup U og
inf U
fins hvis
begrenset U


Grensedefinisjon og triks for å finne hva følger
konvergerer mot: Analogt med

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \quad \text{for funksjoner } f.$$


Kontinuitet (kap. 5)

f kont. i a : For hver $\varepsilon > 0$ fins $\delta > 0$ slik at

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon \quad \text{hvis } |x - a| < \delta$$



Skjæringssetningen :



Ekstremalverdisetningen;

f kont på $[a, b]$

$\Rightarrow f$ har et maks og et minimum

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ kont} \\ f(a) < 0 \\ f(b) > 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{fins} \\ x \in (a, b) \\ \text{med} \\ f(x) = 0 \end{array}$$

Def. av $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$: $\varepsilon - \delta$

Derivasjon (kap 6 og 7)

$$f'(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

eks. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{for } x \neq 0 \\ 1 & \text{for } x = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0) \quad \text{dvs.} \\ f \text{ kont. i } x = 0.$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin h}{h} - 1}{h} \\ = \text{etc. (l'Hop ?)}$$


- Derivasjonsregler (Viktig !)

Middelverdi teoremet

f kont på $[a, b]$ og deriverbar på (a, b)

\Rightarrow Fins $c \in (a, b)$ slik at

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$



L'Hopitals regel

$\left[\frac{0}{0}\right]$ og $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$: Kan derivere teller og nevner


Trikkereformen : $[\infty \cdot 0]$, $[\infty - \infty]$

$[0^0]$, $[1^\infty]$ og $[\infty^0]$

eks. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} \stackrel{[\infty^0]}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{\ln x} \right)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}}$

osv.

- Koblede hastigheter



$$x^2 + y^2 = 5^2$$

$$2x \cdot x'(t) + 2y \cdot y'(t) = 0$$

$$x = x(t)$$

$$y = y(t)$$

- Asymptoter, inkl. skrå : $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ osv.

- Anvendelser av funksjonsdrøfting

(eks: Oljeledning



- Omvendte funksjoner, arcusfunksjonene

Eks. $\arctan x$

Integrasjon (kap. 8+)

- Øvresummer, nedresummer, Riemannsummer
- Fundamentalteoremet :

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$$

↑ kont.

- Volumer: $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ om y-aksen
 $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ om x-aksen
 (+ buelengde.)

- Integrasjonsteknikker


- Substitusjon $\int x e^{x^2} dx$ $u = x^2$

- Delvis integrasjon $\int x e^x dx$
 (varianter, f.eks. I-metoden)

- Delbrøksoppspalting, inkl. "kvadrat-teknikken"

Uegentlige integraler

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b f(x) dx$$



p-integraler



$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{konv. hvis } p > 1 \\ \text{div. hvis } p \leq 1 \end{array} \right.$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{konv. hvis } p < 1 \\ \text{div. hvis } p \geq 1 \end{array} \right.$


Grensesammenlikningstesten

Sammenlikningstesten

$\left. \begin{array}{l} \text{Grensesammenlikningstesten} \\ \text{Sammenlikningstesten} \end{array} \right\} \text{ brukes til å avgjøre} \\ \text{konv/div. av uegentlige} \\ \text{integraler.}$

Kap 1 FLVA : Vektorer og matriser

- Skalarprodukt og vinkel mellom n -tupler (inkl. komplekse)
- Vektorprodukt : $\vec{a} \times \vec{b}$
- Determinanter generelt
- $|\vec{a} \times \vec{b}|$ er arealet av rektanglet utspent av \vec{a} og \vec{b}



- $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ er volumet av parallellepipedet utspent av \vec{a} , \vec{b} og \vec{c} .

- I planet : Arealet av parallelogrammet utspent av (a_1, a_2) og (b_1, b_2) er absoluttverdien av

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

- Multiplikasjon av matriser: "Kryss"
- Inverse av matriser $M \cdot M^{-1} = I$
- Overgangsmatriser, ref. studenteksempel forelesning.

Kap 2 FLVA: Funksjoner av flere variable

Partielle deriverte $\frac{\partial f}{\partial x}$ osv.

Gradienten ∇f

Retningsderivert: $f'(\vec{a}; \vec{r}) = \nabla f(\vec{a}) \cdot \vec{r}$
 \uparrow
 f deriverbar

Vektorvaluerte funksjoner: $\vec{F}(x, y) = (xy, 2y)$

- Jacobimatrisen til \vec{F}

Brukes til en lineærtilnærming til \vec{F}
 gitt at \vec{F} er deriverbar.