

Matematika

\doteq	<code>\doteq</code>	Přibližně
\neq	<code>\neq</code>	Nerovná se
\geq	<code>\ge</code>	Větší nebo rovno
\leq	<code>\le</code>	Menší nebo rovno
\sum	<code>\sum</code>	Suma
\rightarrow	<code>\to</code>	Do
\pm	<code>\pm</code>	Plus mínus
$\sqrt{2}$	<code>\sqrt{2}</code>	Odmocnina
$\sqrt[3]{2}$	<code>\sqrt[3]{2}</code>	N-tá odmocnina
\lim	<code>\lim_{}{}</code>	Limita x jdoucí k n.

Množiny

\cup	<code>\cup</code>	Sjednoceno
\cap	<code>\cap</code>	Průnik
\in	<code>\in</code>	Náleží
\emptyset	<code>\emptyset</code>	Prázdná množina

Logika

\wedge	<code>\wedge</code>	Konjunkce (a současně)
\vee	<code>\vee</code>	Disjunkce (nebo)
\Rightarrow	<code>\Rightarrow</code>	Implikace (jestliže, pak)
\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>	Ekvivalence (právě tehdy, když)
\neg	<code>\neg</code>	Negace
\forall	<code>\forall</code>	Pro každé
\exists	<code>\exists</code>	Existuje

Zkratky

<code>\newcommand{\mbf}[1]{\mathbf{#1}}</code>
<code>\newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim}</code>
<code>\newcommand{\hr}{\hrule}</code>
<code>\newcommand{\hl}{\hline}</code>

Odkazy

- Matematický korespondenční seminář MUNI
- Wikipedia - Matematický symbol
- Art of problem solving
- ČVUT Stručný popis
- VŠB Matematické prostředí
- CSTug symbols
- mff.lokiware
- Detexify²

A	B	A ∧ B	A ∨ B	A ⇒ B	A ⇔ B
1	1	0	1	1	1 − xx
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1

Diferenciální počet

- $(konst.)' = 0$
- $(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$
- $(a^x)' = a^x \cdot \ln(a)$
- $\log_a(x)' = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- $\sin(x)' = \cos(x)$
- $\cos(x)' = -\sin(x)$
- $\tan(x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cot(x)' = \frac{1}{\sin^2 x}$
- $(x)' = 1$
- $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$
- $(u \cdot v)' = u' \cdot v + v \cdot u'$
- $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)}$
- $\arcsin(x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arccos(x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arctan(x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $\operatorname{arccot}(x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
- $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}}$
- $(\log x)' = \frac{1}{x \cdot \ln 10}$
- $(\frac{u}{v})' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$
- $(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$

Goniometrické funkce

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	• $\sin(x \pm 2k\pi) = \sin x$	• $\sin(-x) = -\sin x$	• $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	• $\cos(x \pm 2k\pi) = \cos x$	• $\cos(-x) = \cos x$	• $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	• $\tan(x \pm k\pi) = \tan x$	• $\tan(-x) = -\tan x$	• $\tan x \cdot \cot x = 1$
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	*	• $\cot(x \pm k\pi) = \cot x$	• $\cot(-x) = -\cot x$	• $\sin^2 x \cdot \cos^2 x = 1$
$\cot x$	*	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0			