## Oblast IV – pitanja iz pružanja prve pomoći

RB	PITANJE	PONUĐENI ODGOVORI
1	Definicija krvarenja je:	<ul> <li>a) <u>isticanje krvi iz krvnih sudova</u></li> <li>b) zgrušavanje krvi u krvnom sudu</li> <li>c) isticanje krvi iz pluća</li> </ul>
2	Kod arterijskog krvarenja imamo:	<ul> <li>a) krv istice lagano i prelijeva se preko ruba rane</li> <li>b) <u>krv je svijetlocrvene boje i istice u mlazevima</u></li> <li>c) krv je tamno crvene boje</li> </ul>
3	Prvu pomoć na licu mjesta pruža	<ul> <li>a) Doktor</li> <li>b) <u>Osoba ili osobe koje se zateknu na licu mjesta</u></li> <li>c) Zdravstveni radnici</li> </ul>
4	Kod osobe koja je jako iskrvarila imamo:	<ul> <li>a) jako povišen krvni pritisak</li> <li>b) jako usporen puls</li> <li>c) <u>ubrzano i nepravilno disanje</u></li> </ul>
5	Život unesrećenog najviše ugrožava:	<ul> <li>a) Prestanak disanja, besvjesno stanje i jako krvarenje</li> <li>b) Prelom kičmenog stuba</li> <li>c) Udarac u glavu tupim predmetom</li> </ul>
6	Prelom je:	<ul> <li>a) odvajanje ruke ili noge od tijela</li> <li>b) uvrtanje ruke oko svoje osovine</li> <li>c) <u>prekid cjelovitosti kosti</u></li> </ul>
7	Imobilizacija je:	<ul> <li>a) <u>stavljanje povrijeđenog dijela tijela u stanje mirovanja</u></li> <li>b) stavljanje povrijeđenog na bok</li> <li>c) stavljanje povrijeđenog na stomak i hitan transport</li> </ul>
8	Osnovno pravilo pri imobilizaciji je:	<ul> <li>a) <u>da se imobilišu dva susjedna zgloba</u></li> <li>b) da se imobilišu tri susjedna zgloba</li> <li>c) da se imobiliše samo jedan zglob</li> </ul>
9	Otvoreni prelom se karakteriše:	<ul> <li>a) kosti su samo napukle i nema deformiteta</li> <li>b) prelom dvije kosti i unutrašnje krvarenje</li> <li>c) kada je kost ili dio kosti probili kožu</li> </ul>
10	Oživljavanje ili reanimacija je niz mjera i postupaka koje poduzimamo da bismo osobu koja ne diše i kod koje srce ne radi:	a) pustili da umre <b>b)</b> <u>vratili u normalno stanje – život</u> c) ubrzali isticanje krvi
11	Kod reanimacije odnos disanja i masaže srca je:	<ul> <li>a) 5 uduvavanja i 5 masaža srca tj odnos 1:1</li> <li>b) 2 uduvavanja i 15 masaža srca tj odnos 2:15</li> <li>c) <u>2 uduvavanja i 30 masaža srca tj odnos 2:30</u></li> </ul>
12	Čovjek normalno diše:	<ul> <li>a) 14-16 puta na sat</li> <li>b) 12-20 puta u jednoj minuti</li> <li>c) 12 do 20 puta na dan</li> </ul>
13	Kod udara električne struje prvo:	<ul> <li>a) povrijeđenog zakopati u zemlju da bi zemlja izvukla struju</li> <li>b) <u>ukloniti izvor struje ili isključiti osigurač</u></li> <li>c) odmah započeti sa oživljavanjem ili reanimacijom</li> </ul>
14	Kod hemijske povrede oka ne smijemo raditi:	<ul> <li>a) Isprati oko sa cistom tekucom vodom</li> <li>b) <u>zavijati oko ili prebaciti sterilnu gazu</u></li> <li>c) isprati oko i hitno transportovati do bolnice</li> </ul>
15	Kod mehaničke povrede oka smijemo raditi:	<ul> <li>a) <u>izvaditi strano tijelo iz oka</u></li> <li>b) zaviti oba oka i transportovati do bolnice</li> </ul>

		c) ispirati oko sa razblaženim alkoholom
1.0	Pod opekotinama I stepena	a) zahvačena koža, potkžno masno tkivo i mišic
16	podrazumijeva se:	<ul> <li>b) <u>crvenilo kože i jaka bolnost</u></li> <li>c) zahvačeni dublji slojevi tkiva i kosti</li> </ul>
		a) <u>18% zahvaćenosti tijela-prednja strana grudnog koša i trbuha</u>
17	Kod opekotina pravilo 9	b) 9% genitalije
	podrazumijeva:	c) 18% jedna ruka
		a) ubrzavanje refleksa
18	Alkohol izaziva:	b) povečanje koncentracije i moć pamćenja
		c) pospanost i jako usporavanje refleksa
19	Šta je AED?	<ul> <li>a) <u>Automatski eksterni defabrilator</u></li> <li>b) Automatski ekstremni defabrilator</li> </ul>
13		c) Automatski eksterni derabiliatol
	1111	a) <u>U položaju u kojem se našao u trenutku nesreće</u>
20	U kom položaju se povrijeđeni iznosi iz automobila?	b) U ležećem položaju
	IZHOSHIZ automobila!	c) Isključivo u polusjedećem položaju
	U kom položaju se transportuje	a) U sjedećem položaju sa prethodno izvršenom imobilizacijom
21	osoba sa povredom natkoljenice?	b) Nije bitan položaj bitna je imobilizacija
	•	c) <u>U ležećem položaju sa prethodno izvršenom imobilizacijom</u>
22	Karakteristike venskog krvarenja	<ul> <li>a) <u>krv je tamno-crvene boje i ravnomijerno curi preko ivice rane</u></li> <li>b) izlazi u mlazevima i tamno-crne je boje</li> </ul>
22	su:	c) veoma teško se zaustavlja
	Kod sumnje na povredu	a) poluležeći sa glavom spuštenom naniže
23	unutrašnjih organa i unutrašnjeg	b) <u>položaj autotransfuzije</u>
23	krvarenja, osobu postavljamo u	c) polusjedeći položaj
	položaj:	
2.4	Osobe koje su jako iskrvarile	a) crvene u licu, raspoložene za šalu, povišen krvni pritisak
24	prepoznajemo prema sljedećim simptomima:	b) usporen puls, povišen krvni pritisak, hodaju i ne mogu da se smire c) <u>nizak pritisak, ubrzan puls, blijede, orošene hladnim znojem</u>
	Digitalna kompresija-pritisak	a) mjerenja pulsa
25	prstima je metoda koja se koristi	b) <u>zaustavljanja krvarenja</u>
	kod:	c) kod određivanja mjesta preloma
		a) Pritiskom na čelo
26	Gubitak svijesti se provjerava:	b) <u>Dozivanjem i hvatanjem za remena i laganim protresanjem bez</u>
		pomicanja s) Postavljanjem glave pored usta
		c) Postavljanjem glave pored usta a) Tetovaža
27	Šta je "mačije oko"	b) <u>Mačije oko je jedan od sigurnih znakova smrti</u>
		c) Mačka na putu
		a) da spriječi naknadno povređivanje krvnih sudova i nerava
28	Uloga imobilizacije je:	b) da spriječi povrijeđenog da igra fudbal, košarku, rukomet
		c) da pojača bol kod povrijeđenog
20	Priručna sredstva za imobilizaciju	a) kramerova šina, šancova kragna, vazdušne udlage
29	su:	b) lopatasta nosila, vazdušni dušek c) <u>daska, štap, vrata, lopata</u>
		a) bočni ili koma položaj
30	Kod povrede kostiju karlice	b) <u>položaj na leđima na čvrstoj podlozi</u>
33	povrijeđenog postaljamo:	c) sjedeći položaj
		a) 60-80 otkucaja u jednom satu
31	Broj otkucaja srca kod normalne,	b) 60-80 otkucaja u jednoj sekundi
	zdrave osobe je:	c) <u>60-80 otkucaja u jednoj minuti</u>
27	Kod novrede kičme treba:	a) povrijeđenog postaviti u sjedeći položaj i transportovati ga prvir
32	Nou poviede kicine treba.	prevoznim sredstvom koje naiđe
32	Kod povrede kičme treba:	

		b) povrijeđenog postaviti na leđa i transportovati ga adekvatnim vozilom
		zajedno sa sredstvom za imobilizaciju
		c) <u>povrijeđenog ostavljamo na mjestu nesreće i odlazimo do prve</u>
		<u>ambulante po kola i doktora</u>
	U kom položaju se transportuje	a) U polusjedećem položaju
33	osoba u besvjesnom stanju?	b) U ležećem položaju
		c) <u>U bočnom položaju (koma položaj)</u>
	Koji je najsigurniji način da se	a) Vađenjem stranog tijela iz disajnih puteva
34	obezbjedi prohodnost disajnih	b) Zabacivanjem glave unazad
	puteva?	c) Povrijeđenu osobu postaviti u polusjedeći položaj
		a) Zaštititi unesrećenog od groma,
35	Kod udara groma treba:	b) zakopati unesrećenog da zemlju da izvuče elektricitet
		c) <u>pozvati hitnu medicinsku pomoć</u>
	Kod trovanja izduvnim gasovima	a) <u>otvoriti vrata i prozore, unesrećenog izvući na svjež vazduh</u>
36	postupak je sledeći:	b) puzeći doći do unesrećenog i odmah započeti oživljavanje
	,	c) obavijestiti vatrogasce i hitnu pomoć i čekati dok oni ne stignu
	Kod hemijske povrede oka prva	a) <u>oko ispirati sa čistom vodom i hitno transportovati do bolnice</u>
37	pomoć se sastoji u:	b) oči zaviti zavojem i hitno transportovati adekvatnim vozilom
		c) ispsrati oči razblaženim alkoholom, zaviti i transportovati
0.0	On all atting two faculties	a) zahvataju samo površni sloj kože i izazivaju bolnost
38	Opekotine trećeg stepena:	b) zahvataju kosti i stvaraju ugljenisanost
		c) jaka bolnost sa sukrvičavim sadržajem
20	Daniel IIV.	a) što pojačava reflekse i koncentraciju
39	Droga utiče na vozača tako:	b) <u>što usporava reflekse i izaziva pospanost</u>
		c) drogirani vozač se strogo pridržava znakova
		a) Bljedilo usana
40	Znaci prestanka disanja su:	b) <u>Unesrećeni je bez svijesti ne može se čuti niti osjetiti izdahnuti zrak, a</u>
		grudni koš se ne diže c) Modre ruke i noge
		a) Prestanak disanja
41	Sigurni znaci smrti su:	b) Plave usne
7.1	Sigurii zhaci siinti sa.	c) <u>Mrtvačke pjege, mačije oko, hlađenje i kočenje</u>
		a) Primjenom poveske
42	Jako krvarenje iz rane-amputacija	b) Postavljanjem kompresivnog zavoja
	zaustavlja se:	c) Podizanjem ruke u zrak
		a) <u>kada hoćemo zaustaviti krvarenje</u>
43	Kompresivni zavoj se	b) za imobilizaciju preloma
	upotrebljava:	c) kod težih oblika opekotina
		a) Duvan iz cigarete
44	Na svaku ranu prvo stavljamo:	b) So
	,	c) <u>Sterilnu gazu</u>
	Dei ann Yonin ann an '	a) Zaustaviti krvarenje
45	Pri pružanju prve pomoći	b) Napraviti imobilizaciju
	unesrećenom prvo treba:	c) Dati vode da pije
		a) <u>122</u>
46	Broj policije je:	b) 135
		c) 125
	Kod sumnje na povredu vratne	a) <u>Šancove kragne</u>
47	kičme prvu pomoć pružamo	b) Daščica oko glave
	postavljanjem:	c) Zavoja oko vrata
		a) Zabacivanjem glave unazad
48	Krvarenje iz nosa zaustavljamo:	b) <u>Stiskanjem krila nosa između palca i kažiprsta i potiskivanjem brade</u>
		<u>na grudi</u>

		c) Stavljanjem mokre krpe na glavu
	Koliko vremena je potrebno da se	a) 5 sekundi
49	utvrdi da li osoba diše?	b) <u>10 sekundi</u>
		c) 30 sekundi
		a) <u>Parkirati vozilo na sigurno mjesto uz upotrebu svjetlosne signalicije,</u>
	Pri nailasku na mjesto nesreće	<u>isključiti motor, postaviti znakove sigurnosti, pozvati hitnu pomoć l</u>
50	treba:	pristupiti pružanju prve pomoći
		b) Hitno pozvati vatrogasce
		<ul> <li>c) Uključiti signalizaciju na anutomobilu i čekati da naiđe drugo vozilo</li> <li>a) Obavjest o marki automobile</li> </ul>
		<ul> <li>a) Obavjest o marki automobile</li> <li>b) <u>Mjesto nesreće, o kakvoj se nesreći radi, broj povrijeđenih,ime</u></li> </ul>
51	Šta sadrži poziv policiji:	prezime I telefon pozivaoca
		c) Lični podaci pozivaoca
	5 I V	a) To je moralna obaveza
<b>5</b> 2	Da li je pružanje prve pomoći u	b) Ne postoji obaveza
52	saobraćaju, za vozača moralna ili zakonska obaveza?	c) <u>Pružanje prve pomoći u saobraćaju za zakonska obaveza za svakog</u>
	Zakoliska obaveza :	<u>vozača</u>
	Prva pomoć kod povrede glave i	a) <u>Pokušati da se osoba nikako ne pomjera</u>
53	vrata je:	b) Pomjeriti osobu i odvesti je u hitnu pomoć
	viata je.	c) Postaviti je u sjedeći položaj
		a) Kada automobil izvuku na sigurno mjesto
54	Kada je moguće izvlačenje	b) Nije moguće
	utopljenika iz automobila:	c) <u>Izvlačenje je moguće, ako prethodno otvorimo prozor da bi voda</u>
		napunila automobil
	Pod sunčanicom	a) Otok moždanih ovojnica nastao kao poslijedica dugotrajnog izlaganja
55	podrazumjevamo:	lobanje sunčevim zracima  h) Pospanost i posviestisu postalu uslijed izlaganja sunčevim zracima
		<ul><li>b) Pospanost i nesvjesticu nastalu uslijed izlaganja sunčevim zracima</li><li>c) Smanjen dotok krvi u mozak nastao uslijed izlaganja sunčevim zracima</li></ul>
		a) Bol u trbuhu koji je nesnosan
		b) Povreda unutrašnjih organa trbuha sa krvarenjem i upalom trbušne
56	Opasnosti kod povrede trbuha su:	maramice
		c) Povraćanje i gubitak svijesti
		a) ubrzati vožnju
57	Ukoliko osjetite umor dok vozite	b) osvježiti se vrelom kafom ili hladnim pivom
57	potrebno je:	c) <u>smanjiti brzinu kretanja vozila, otvoriti prozore, na prvom pogodnom</u>
		<u>mjestu stati i napraviti pauzu, prošetati i osvježiti se</u>
	Telefonski broj službe hitne	a) 122
58	pomoći je:	b) 123
		c) <u>124</u>
	Koji gas se oslobađa pri	a) Duhanski dim
59	sagorjevanju benzina, a koji u	b) Natrijum hlorid
	zatvorenom prostoru može izazvati smrt:	c) <u>Ugljen monoksid</u>
	1202 Vati 31111 t.	a) <u>Predmet koji je napravio ranu i nalazi se u rani ne smijemo nikako</u>
		dirati
60	Da li se vadi strano tijelo iz rane:	b) Da
		c) Obilježimo flomasterom strano tijelo
		a) Otvoreni i zatvoreni
61	Prelomi kostiju mogu biti:	b) <u>Otvoreni, zatvoreni i kombinovani</u>
	, ,	c) Linijski i ugaoni
		a) <u>Nagnječenja mekih tkiva</u>
62	Kontuzije su:	b) Povrede glave
		c) Strana tijela u disajnim putevima

63	Sredstva za pružanje prve pomoći mogu biti:	a) Standardna  b) <u>Standardna i improvizovana</u> c) Improvizovana
64	U kom položaju se transportuje osoba koja krvari iz usta?	<ul> <li>a) U ležećem položaju sa glavom nagnutom naprijed</li> <li>b) <u>U sjedećem položaju sa glavom nagnutom naprijed, šakama postavljenim na obraze i laktovima postavljenim na koljenima</u></li> <li>c) U ležećem položaju sa glavom nagnutom naprijed, šakama postavljenim na obraze i laktovima postavljenim na koljenima</li> </ul>
65	Kada se koristi Esmarhova poveska?	<ul> <li>a) Kod povrede glave</li> <li>b) Kod transporta povrijeđenih</li> <li>c) <u>Kod amputiranih i smrskanih ekstremiteta</u></li> </ul>
66	Simptomi i znaci krvarenja mogu biti	<ul> <li>a) Lokalni i opšti</li> <li>b) Lokalni</li> <li>c) Opšti</li> </ul>
67	Kod svakog krvarenja prvo:	<ul> <li>a) Napravimo digitalnu kompresiju</li> <li>b) Uzimamo anamnezu</li> <li>c) Izmjerimo krvni pritisak</li> </ul>
68	Koliko osoba vrši prenošenje povrijeđenog sa povredom kičmenog stuba?	<ul> <li>a) Na vrši se prenošenje</li> <li>b) <u>Kod povrede kičmenog stuba prenošenje vrši 4-5 osoba</u></li> <li>c) Prenošenje vrši 5-10 osoba</li> </ul>
69	Trijaža je:	<ul> <li>a) <u>Određivanje povrede prema redovima hitnosti</u></li> <li>b) Efikasno zbrinjavanje povreda</li> <li>c) Učenje prve pomoći</li> </ul>
70	Unesrećenog koji ima znake iskrvavljenja stavljamo u:	<ul> <li>a) Bočni položaj</li> <li>b) Ležeći na leđa</li> <li>c) Položaj autotransfuzije (ležeći na leđima sa podignutim nogama i rukama)</li> </ul>
71	Kako se zbrinjavaju povrede nastale niskom temperaturom (smrzotine)	<ul> <li>a) Povrijeđenog unijeti u toplu prostoriju i davati tople napitke</li> <li>b) Povrijeđenog držati van prostorija i pozvati hitnu pomoć</li> <li>c) Skinuti mu odjeću</li> </ul>
72	Povrijeđeni koji je imao epileptički napad stavljamo u:	a) Polusjedeći b) Poluležeći c) <u>Bočni položaj</u>
73	Unesrećenog koji ima astma napad treba pitati ima li:	a) <u>Sprej-pumpicu-inhalator</u> b) Nitroglicerin c) Leksaurin
74	Simptomi srčanog udara su:	<ul> <li>a) <u>Bol u prsima koja se širi u ruku, otežano disanje, orošeno čelo, bijele i suhe usne, u nekim slučajevima unesrećeni priča nepovezane stvari</u></li> <li>b) Bol u stomaku i krvarenje iz uha</li> <li>c) Ubrzano lupanje srca</li> </ul>
75	Koliko ima vrsta prve pomoći, koja se pruža na licu mjesta	<ul> <li>a) U vidu samopomoći, uzajamne pomoći i pomoći stručnog lica</li> <li>b) 7 vrsta prve pomoći</li> <li>c) Na licu mjesta se ne pruža prva pomoć</li> </ul>
76	Najveća opasnost kod preloma kičme je:	a) Infekcija b) Krvarenje c) <i>Povreda kičmene moždine</i>
77	Hipoglikemija je:	<ul> <li>a) <u>Nizak nivo šećera u krvi</u></li> <li>b) Visok nivo šećera u krvi</li> <li>c) Visok nivo hormona u krvi</li> </ul>
78	Kada dođemo na mjesto nesreće važno je:	<ul> <li>a) Zaštiti sebe i ostale</li> <li>b) Pomoći unesrećenom bez obzira na sve</li> <li>c) Pobjeći što prije</li> </ul>
79	Simptomi preloma vratnog dijela	a) <u>Nepokretnost gornjih i donjih ekstremiteta, otečenost na tom dijelu</u>

	kičme su:	b) Zubobolja
		c) Krvarenje a) Unesrećeni je nenormalno pospan, lako se budi dozivanjem ili laganim
90	Sonor nodrazumiova	protresanjem ali ubrzo nakon buđenja opet zaspi
80	Sopor podrazumjeva:	b) <u>Unesrećeni se može probuditi samo na jače i ponavljane draži</u>
		c) Najteži poremećaj svijesti
04	Dwg was 4 iau	a) Pomoć koja se pruža u kolima hitne pomoći
81	Prva pomoć je:	b) Pomoć koju pružaju zdravstveni radnici c) Pomoć koja se ukazuje na mjestu nesreće
	·	a) Prestanak disanja, besvjesno stanje i jako krvarenje
82	Život unesrećenog najviše	b) Udarac u glavu tupim predmetom
	ugrožava	c) Opekotine
	Kod besvjesnog stanja (unesrećeni	a) Moguća oduzetost ruku i nogu
83	je bez svijesti i diše), opasnosti su:	b) <u>Gušenje jezikom, povraćenim sadržajem</u>
		c) Gubitak velike količine krvi
84	Prvi zavoj je:	<ul> <li>a) Zavoj na kojem se nalazi znak Crvenog krsta</li> <li>b) Zavoj na kojem se nalazi jedno ili dva sterilna jastučeta od gaze</li> </ul>
5-1	Zavoj je:	c) Zavoj sa utkanim rubom
	Za provjeru funkcije disanja	a) <u>Gledaj-Slušaj-Osjeti disanje</u>
85	primjenjuje se tehnika	b) Gledaj- Slušaj-Opipaj puls
	prinigenjaje se termika	c) Gledaj-Slušaj-Dozovi
0.0	Koji je broj telefona vatrogasne	a) <u>123</u>
86	službe	b) 155 c) 192
		a) Trajna
87	Krvarenja mogu biti:	b) <u>Vanjska i unutrašnja</u>
		c) Povremena i privremena
	Do čega može dovesti	a) Kvara na motoru automobile
88	pregrijavanje kabine automobile:	b) Isparavanja
		c) <u>Toplotnog udara</u> a) <u>Svaki prekid kontinuiteta kože</u>
89	Rana je:	b) Modrilo po koži
		c) Gnojne promjene na koži
		a) Jod
90	Šta se stavlja na otvorenu ranu	b) Alkohol
		c) <u>Sterilnu gazu</u>
91	Opekotina je:	a) Alergija na suncu b) Povreda nastala djelovanjem toplote
91	Орекоппа је.	c) Upala kože zbog mehaničke sile
		a) Od tkanine
92	Od čega možemo napraviti Kompresivni zavoj:	b) <u>Od sterilne gaze, zavoja</u>
	Kompresivin zavoj.	c) Nemožemo napraviti kompresivnu gazu
0.5	×4	a) Kada je nešto uprljano
93	Šta označava pojam sterilno:	b) Kada je nešto vlažno c) <i>Bez prisustva mikroorganizama</i>
		a) Slikanje foto aparatom
94	Šta obuhvata procejna stanja	b) Crtanje skice nesreće
	unesrećenog	c) <u>I Orijentacioni pregled i II detaljan pregled</u>
	Unesrećenog sa povredom	a) <u>Polusjedeći položaj</u>
95	grudnog koša postavljamo u:	b) Poluklečeći položaj
		c) Ležeći položaj
96	Koliko se udubinu pritišće grudna	a) Spoljna masaža srca se ne izvodi
	kost pri izvođenja spoljne masaže	b) Dovoljno za oživljavanje

	srca:	c) <u>Pri izvođenju spoljne masaže srca, grudna kost se pritišće u dubinu 3-5 cm</u>
97	Kako se izvodi spoljna masaža srca, sa koliko dlanova:	<ul> <li>a) Spoljašnja masaža srca se izvodi pritiskom dlanova obje ruke na sredinu grudnog koša</li> <li>b) Jednim dlanom</li> <li>c) Kružnim pokretima</li> </ul>
98	Kod sunčanice i toplotnog udara prva pomoć se pruža:	<ul> <li>a) Stavljanjem glave u hladnu vodu</li> <li>b) <u>Unesrećenog što prije prenijeti u hladan i prozračan prostor,</u> <u>raskomotiti ga i rashladiti</u></li> <li>c) Staviti ga u bočni položaj</li> </ul>
99	Po trijaži prvi red hitnosti je:	<ul> <li>a) <u>Stanja praćena gušenjem</u></li> <li>b) Sva krvarenja bez opštih znakova iskrvarenja</li> <li>c) Manje opekotine</li> </ul>
100	Uzroci poremećaja svijesti mogu biti?	a) Direktni uzroci b) Indirektni uzroci c) <b>Direktni i indirektni</b>