Rachunek prawdopodobieństwa (AI)

Piotr Dyszewski

2026-06-08

Spis treści

Słowo wstępne 3

Sylabus 4
Dane dotyczące przedmiotu . . . 4
Skrócony plan wykładu . . . 4
Szczegółowy plan wykładu . . . 5
Efekty kształcenia . . . 5
Sposób weryfikacji efektów kształcenia . . . 5
Metody i kryteria oceniania . . . 6
Warunkiem zaliczenia przedmiotu . . . 6
Kryteria ocen: . . . 6

I Notatki 7

1 Wstęp 8

2 Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa 9
2.1 Problem Monty'ego Halla . . . 9
2.2 Odrobina historii . . . 10
2.3 Opis doświadczenia losowego . . . 13
2.4 Miara probabilistyczna . . . 15
2.5 Problem Monty'ego Halla raz jeszcze . . . 17

3 Prawdopodobieństwo klasyczne 19
3.1 Model klasyczny . . . 19
3.2 Zliczanie wyników . . . 20
3.3 Reguła dodawania . . . 21
3.4 Reguła mnożenia . . . 23
3.5 Wariacje . . . 24
3.6 Kombinacje . . . 26
3.7 Partia pokera . . . 28
3.8 Problem urodzin . . . 29
3.9 Zasada właczeń i wyłączeń . . . 30

4 Prawdopodobieństwo warunkowe **35**
4.1 Podstawowe definicje 35
4.2 Wzór na prawdopodobieństwo całkowite 37
4.3 Wzór Bayesa 39

References **42**

II Listy zadań **43**

Lista 1. Przestrzenie zdarzeń elementarnych **44**

Lista 2. Prawdopodobieństwo klasyczne **47**

Słowo wstępne

Notatki te powstają na potrzeby kursu o tym samym tytule, zaplanowanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2026/2027 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Notatki mają charakter roboczy i (jak wszystko we wstępnych fazach rozwoju) mogą zawierać błędy. Będę wdzięczny za zgłoszenie każdej usterki znalezionej w tekście.

Notatki są przygotowywane w Quarto, otwartym systemie do tworzenia publikacji naukowych i technicznych. Więcej informacji o Quarto można znaleźć na stronie https://quarto.org/.

Sylabus

Dane dotyczące przedmiotu

- **Nazwa przedmiotu:** Rachunek Prawdopodobieństwa (AI)
- **Jednostka oferująca przedmiot:** Instytut Matematyczny
- **Założenia:**
- **Strona www:**
- **Forma zajęć:** wykład + ćwiczenia + laboratorium
- **Punkty ECTS:** 8
- **Sprawdziany pisemne:** 26.11.2026 i 28.01.2027

Skrócony plan wykładu

W trakcie wykładu poruszymy następujące zagadnienia:

- **A) Przestrzeń probabilistyczna**: aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń;
- **B) elementy losowe**: zmienne losowe, wektory losowe, niezależne zmienne losowe;
- **C) rozkłady prawdopodobieństwa**: rozkłady zmiennych losowych, dystrybuanty, rozkłady dyskretne i absolutnie ciągłe;
- **D) parametry rozkładów**: wartość oczekiwana, wariancja, kowariancja;
- **E) twierdzenia graniczne**: prawo wielkich liczb, centralne twierdzenie graniczne.

Podstawowa literatura do wykładu:

- Mitzenmacher, M, Upfal E. (2017) Probability and Computing, Cambridge University Press
- Isaac, R. (2000). The Pleasures of Probability. Springer.
- Blitzstein, J. K, Hwang, J, (2019) Introduction to Probability, Taylor & Francis
- Grimmett, G, Stirzaker, D. (2001) Probability and Random Processes, Oxford University Press

Szczegółowy plan wykładu

Wstępny plan tematów poruszanych na poszczególnych wykładach:

1. Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa (7.10.2026)
2. Prawdopodobieństwo klasyczne i prawdopodobieństwo warunkowe (14.10.2026)
3. Niezależność zdarzeń, zmienne losowe dyskretne i ich rozkłady
4. Wektory losowe, niezależność zmiennych losowych
5. Parametry rozkładów
6. Rozkłady warunkowe, warunkowa wartość oczekiwana i niezależność warunkowa.
7. Regresja liniowa
8. Nierówności związane z momentami, nierówności koncentracyjne
9. słabe prawo wielkich liczb
10. Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a
11. Zmienne losowe o ciągłych rozkładach
12. Centralne twierdzenie graniczne
13. Wielowymiarowy rozkład normalny
14. Łańcuchy Markowa
15. Zbieżność do rozkładu stacjonarnego, MCMC

Efekty kształcenia

Po wykładzie student:

1. Wymienia i definiuje podstawowe obiekty teorii prawdopodobieństwa (**A**, **B**, **C**, **D**);
2. Podaje związki między podstawowymi obiektami teorii prawdopodobieństwa (**A**, **B**, **C**, **D**);
3. Wykorzystuje narzędzia teorii prawdopodobieństwa do opisu zmiennych losowych w terminach ich rozkładu i ich parametrów (**B**, **C**, **D**);
4. Formułuje twierdzenia graniczne (**D**);
5. Stosuje twierdzenia graniczne do analizy ciągów zmiennych losowych (**B**, **E**);

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Na zaliczenie składać się będą:

- Aktywność na ćwiczeniach;
- Kartkówki na każdych ćwiczeniach;
- Dwa kolokwia;

Metody i kryteria oceniania

Zaliczenie ćwiczeń na sprawdzianów pisemnych. Aktywności w czasie zajęć podnosi ocenę z ćwiczeń o 1 lub 0.5. Ocena z egzaminu wystawiona jest na podstawie egzaminu pisemnego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu

- Uzyskanie 50% punktów za zadania stanowiące bieżącą weryfikację efektów kształcenia;
- Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu stanowiącego końcową weryfikację efektów kształcenia.

Kryteria ocen:

- **(dst)** student realizuje punkty 1-3 efektów kształcenia
- **(db)** student realizuje punkty 1-4 efektów kształcenia
- **(bdb)** student realizuje punkty 1-5 efektów kształcenia

Wrocław, październik 2026 Piotr Dyszewski

Część I

Notatki

1 Wstęp

Sztuczna inteligencja i analiza danych opierają się na bardzo prostej zasadzie: na podstawie ograniczonej liczby przykładów (danych treningowych) chcemy wyciągać wnioski o zjawiskach, których nie widzimy w całości. Dane treningowe zawierają szum, błędy pomiarowe, przypadkowe odchylenia, braki oraz zależności, których często nie potrafimy bezpośrednio zaobserwować. Dlatego analiza danych nie jest jedynie rachunkiem na tabelach liczb. Jest próbą rozumowania w warunkach niepewności. Rachunek prawdopodobieństwa dostarcza języka, w którym tę niepewność można precyzyjnie opisać.

Mimo że poniższe notatki stanowią materiał do standardowego kursu z teorii prawdopodobieństwa postaramy się dobrze umotywować główny kierunek wykładu. Zaczniemy od przykładu pokazującego że losowe zaburzenia nie są problemem, a narzędziem, które można wykorzystać na swoją korzyść.

2 Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa

Zanim przejdziemy do badania zjawisk losowych wprowadzimy podstawowy język teorii prawdopodobieństwa. Zaczniemy jednak od przykładu obrazującego potrzebę jego wprowadzenia.

2.1 Problem Monty'ego Halla

W latach sześćdziesiątych w stanach zjednoczonych zaczęto nadawać *Let's Make a Deal*. W teleturnieju wybrani widzowie ze studia zawierają umowy z prowadzącym. Uczestnik otrzymuje nagrodę i decyduje, czy ją zatrzymać, czy wymienić na inną, której zawartość pozostaje ukryta do momentu podjęcia decyzji.

Dopiero po odsłonięciu nagrody okazuje się, czy wymiana była korzystna, czy też uczestnik trafił na bezwartościową, żartobliwą nagrodę zwaną „zonkiem".



Rysunek 2.1: jedną z „zonkowych" nagród w wersji programu stacji CBS była żywa lama

Rozważmy następujący problem. To dla ciebie decydujący moment. Prowadzący teleturniej stawia cię przed trojgiem zamkniętych drzwi. Za jednymi z nich kryje się samochód twoich marzeń — nowy, lśniący. Za każdymi z pozostałych dwojga drzwi stoi natomiast sympatyczna, choć niezbyt lśniąca i nieco cuchnąca koza.

Masz wybrać drzwi i wygrać to, co się za nimi znajduje. Wskazujesz jedne z nich i ogłaszasz swój wybór. Wtedy prowadzący otwiera jedne z pozostałych dwojga drzwi i pokazuje kozę. Następnie pyta, czy chcesz zmienić wybór i wskazać nieotwarte drzwi, których początkowo nie wybrałeś.

Czy zmiana decyzji jest dla ciebie korzystna — zakładając oczywiście, że zależy ci na samochodzie, a nie na kozie?

Jakie jest dokładnie prawdopodobieństwo wygrania samochodu przy każdej z tych strategii? Ta popularna zagadka wywołała spore zamieszanie, gdy w 1991 roku ukazała się w prasie John (1991). Wielu czytelników, w tym także matematycy, podało błędną odpowiedź. Najczęściej twierdzono, że zmiana drzwi nie ma znaczenia, ponieważ samochód z jednakowym prawdopodobieństwem znajduje się za każdymi z dwojga nieotwartych drzwi.

Dlaczego ten problem jest tak podchwytliwy i jak należy o nim myśleć? Posłuży nam on jako wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Po przeczytaniu tego rozdziału łatwiej będzie poprawnie analizować zarówno problem samochodu i kóz, jak i wiele innych podobnych zagadnień. Zaczniemy od krótkiego omówienia teorii prawdopodobieństwa, jej znaczenia i historii.

2.2 Odrobina historii

Rachunek prawdopodobieństwa można określić jako matematyczną teorię niepewności. Jego intuicyjne podstawy są bardzo stare: już człowiek obserwujący niebo, by przewidzieć pogodę, posługiwał się prymitywnym rozumowaniem probabilistycznym. Na przykład widząc ciemne chmury, uznawał deszcz za bardziej prawdopodobny i zabierał parasol.

Takie intuicyjne szacowanie różni się jednak od formalnej teorii matematycznej. Za początek nowoczesnego rachunku prawdopodobieństwa często uznaje się XVII-wieczną korespondencję Blaise'a Pascala i Pierre'a de Fermata, dotyczącą problemów związanych z grami hazardowymi.



Rysunek 2.2: Blaise Pascal (19 czerwca 1623 – 19 sierpnia 1662) był francuskim matematykiem, fizykiem, wynalazcą, filozofem i pisarzem katolickim.



Rysunek 2.3: Pierre de Fermat (1601–1665) był francuskim prawnikiem, matematykiem amatorem i fizykiem matematycznym. Od 1631 roku pełnił funkcję radcy parlamentu, czyli ówczesnego sądu, w Tuluzie.

Kasyno jest naturalnym laboratorium prawdopodobieństwa: rozsądny gracz musi umieć oceniać ryzyko, a więc prędzej czy później sam staje się matematykiem albo korzysta z jego pomocy.

Z tych dość rozrywkowych początków wyrosła teoria stosowana dziś we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, a także na rynkach finansowych. Szczególnego znaczenia nabrała ona w XX wieku wraz z rozwojem fizyki kwantowej.

2.3 Opis doświadczenia losowego

Za każdym razem kiedy rzucamy kością czy losujemy kartę z talii wykonujemy pewnien eksperyment losowy. W pierwszej części wykładu zajmiemy się badaniem tego typu eksperymantów. Zaczniemy od sposobu matematycznej reprezentacji wyniku naszego losowania. Każdy możliwy wynik eksperymentu nazywać będziemy zdarzeniem elementarnym. Przykładowo dla rzutu kością sześcienną zdarzeniem elementarnym będzie liczba wyrzuconych oczek, czyli dowolna z liczb 1,2, … 6. Zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych oznaczać będziemy przez Ω i będziemy nazywać *przestrzenią zdarzeń elementarnych*. **Zakładać będziemy, że Ω jest zbiorem co najwyżej przeliczalnym**, czyli skończonym bądź nieskończonym o przeliczalnej liczbie elementów. Wówczas elementy Ω można wpisać w następujący sposób

$$\Omega = \{\omega_k \,:\, k \in \mathbb{N}\}, \qquad \mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$$

jeżeli Ω jest nieskończona oraz

$$\Omega = \{\omega_k \,:\, k \leq N\}, \qquad N \in \mathbb{N}$$

jeśli Ω jest skończona. Wybór przestrzeni Ω zależy zawsze od rodzaju eksperymentu losowego, który chcemy opisać. Na tym etapie przestrzeń zdarzeń elementarnych jest zbiorem wszystkich możliwych wyników naszego eksperymentu i nie mówi jeszcze nic o prawdopodobieństwach tych wyników.

Przykład 2.1. Powiedzmy, że nasz eksperyment losowy polega na rzucie parą kości sześciennych. Wynikiem naszego eksperymentu jest para elementów zbioru
$D = \{1, 2, ..., 6\}$. Istotne jest aby rozróżnić wyniki otrzymane na obu kościach, wszak kości nie muszą być symetryczne. Zbiorem zdarzeń elementarnych jest

$$\Omega = D^2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), ..., (6,6)\}.$$

W tym przypadku przestrzeń zdarzeń elementarnych jest skończona i składa się z $|\Omega| = 36$ elementów.

Przykład 2.2. Tym razem rzucamy monetą do momentu otrzymania orła. Przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω składa się ze skończonych ciągów $\{O, R\}$ kończących się znakiem O i jednego nieskończonego ciągu R. Dokładniej

$$\Omega = \{RRRR...\} \cup \{O, RO, RRO, RRRO, ...\}.$$

Tutaj niekończony ciąg $RRR...$ opisuje scenariusz, w którym nigdy nie wyrzucimy orła.

W większości eksperymentów losowych nie interesują nas poszczególne jego wyniki, lecz pewien ich wspólny aspekt. Dla przykładu w rzucie kością sześcienną istotna dla nas może być tylko parzystość uzyskanego wyniku. Innymi słowy bardziej od poszczególnych zdarzeń elementarnych interesować nas będę ich zbiory.

Definicja 2.1. Niech Ω będzie co najwyżej przeliczalną przestrzenią zdarzeń elementarnych. *Zdarzeniem* nazywać będziemy dowolny podzbiór $A \subseteq \Omega$.

Duch wprowadzanego formalizmu wymaga od nas ścisłego definiowania zdarzeń. Należy pamiętać jednak, że formalizm nie jest celem samym w sobie. Często będziemy pozwalać sobie na definiowanie zdarzeń w sposób opisowy o ile nie będzie prowadziło to do nieścisłości.

Przykład 2.3. Wróćmy do rzutu parą kości, gdzie przestrzenią zdarzeń elementarnych jest $\Omega = D^2$. Wówczas zdarzeniem jest

$$\begin{aligned} A =& \{\text{suma oczek na obu kościach jest równa } 7\} \\ =& \{(1,6),(2,5),\dots,(6,1)\} \subseteq \Omega = D^2. \end{aligned}$$

Natomiast zbiór

$$\{(1,1),(2,2),\dots,(6,6)\}$$

jest zdarzeniem {wypadł dublet}.

Wprowadzone przez nas Definicja 2.1 zdarzenia jest niezwykle pojemna. W skutek czego jeżeli A i B są zdarzeniami, to $A \cup B$ oraz $A \cap B$ też są zdarzeniami. Pierwsze polega na tym, że zachodzi A lub B, natomiast drugie polega na tym, że jednocześnie zachodzą A i B.

Przykład 2.4. Powiedzmy, że losujemy jedną liczbę ze zbioru $\Omega = \{1,2,\dots,10\}$. Niech A będzie zdarzeniem, że wylosowana liczba jest podzielna przez 2 a B zdarzeniem, że wylosowana liczba jest podzielna przez 3. Wówczas

$$A = \{2,4,6,8\}$$

oraz

$$B = \{3,6,9\}.$$

Wtedy $A \cup B$ jest zdarzeniem, że wylosowana liczba jest podzielna przez 2 lub jest podzielna przez 3, czyli

$$A \cup B = \{2,3,4,6,8,9\}.$$

Natomiast $A \cap B$ to zdarzenie, że wylosowana liczba jest podzielna przez 6,

$$A \cap B = \{6\}.$$

Przykład 2.5. Rzucamy trzykrotnie monetą. Wtedy $\Omega = \{OOO, OOR, ORO, \dots\}$. Niech A będzie zdarzeniem, że w pierwszym rzucie wypadł orzeł. Mamy

$$A = \{OOO, OOR, ORO, ORR\}.$$

Niech B będzie zdarzeniem, że w trzech rzutach otrzymaliśmy parzystą liczbę orłów,

$$B = \{RRR, OOR, ORO, ROO\}.$$

Wtedy $A \cap B$ jest zdarzeniem, że w pierwszym rzucie otrzymaliśmy orła i łączna liczba orłów jest parzysta,

$$A \cap B = \{OOR, ORO\}.$$

Dodatkowo, jeżeli A jest zdarzeniem, to jest nie również **zdarzenie przeciwne do zdarzenia** A, zadane wzorem

$$A' = \Omega \ A.$$

Zdarzenie A' polega na tym, że nie zachodzi zdarzenie A. Jest jeszcze jedna relacja teoriomnogościowa, z której będziemy korzystać. Powiemy, że **zdarzenie** B **pociąga zdarzenie** A, jeżeli $B \subseteq A$.

Przykład 2.6. Powiedzmy, że rzucamy tylko jedną kością. Wówczas $\Omega = D = \{1, 2 \dots, 6\}$. Niech

$$A = \{\text{wypadła liczba parzysta}\} = \{2, 4, 6\}.$$

Zdarzenie przeciwne do zdarzenia A to

$$A' = \{\text{wypadła liczba nieparzysta}\} = \{1, 3, 5\}.$$

Z kolei zdarzenie

$$B = \{\text{wypadła szóstka}\} = \{6\}$$

pociąga zdarzenie A, czyli $B \subseteq A$.

2.4 Miara probabilistyczna

Jesteśmy przyzwyczajeni do intuicyjnego mylenia o prawdopodobieństwie. Dla przykładu w eksperymencie polegającym na rzucie dwoma monetami od razu napiszemy, że

$$\mathbb{P}\left[\text{pierwszej kości wypadnie 3 a na drugiej 5}\right] = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

W pewnym sensie o liczbie $\mathbb{P}[A]$ myślimy jak o prawdopodobieństwie zdarzenia A opierając się na słownym opisie darzenia A. Zauważmy, że $\mathbb{P}$ staje się funkcją, która jako argumenty przyjmuje podzbiory Ω. Formalnie

$$\mathbb{P}\colon 2^{\Omega} \to [0, 1],$$

gdzie 2^{Ω} jest zbiorem potęgowym Ω, czyli zbiorem wszystkich podzbiorów Ω. Dokładniej

$$2^{\Omega} = \{B \ : \ B \subseteq \Omega\}.$$

Przykład 2.7. Załóżmy, że rzucamy monetą. Wówczas $\Omega = \{O, R\}$ oraz

$$2^{\Omega} = \{\emptyset, \{O\}, \{R\}, \{O, R\}\}.$$

Zauważmy, że jeżeli Ω ma n elementów, to 2^{Ω} ma 2^n elementów.

W wielu przypadkach wygodnie jest myśleć o zdarzeniu A jak o podzbiorze Ω a o liczbie $\mathbb{P}[A]$ jak o masie zbioru A. Przyjęta przez nas definicja będzie odzwierciedlała ten sposób myślenia.

Definicja 2.2. Niech Ω będzie co najwyżej przeliczalną przestrzenią zdarzeń elementarnych. *Funkcją prawdopodobieństwa* nazywamy odwzorowanie $p\colon \Omega \to [0, 1]$ takie, że

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1. \tag{2.1}$$

Miarą probabilistyczną nazywamy odwzorowanie $\mathbb{P}\colon 2^{\Omega} \to [0, 1]$ zadane wzorem

$$\mathbb{P}[A] = \sum_{\omega \in A} p(\omega),$$

dla zdarzenia A.

W tym momencie warto zwrócić uwagę na notację pojawiającą się w Równanie 2.1 . Jeżeli Ω jest skończoną przestrzenią i $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ dla pewnego naturalnego N, to

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = \sum_{k=1}^{N} p(\omega_k).$$

Jeżeli natomiast Ω jest nieskończona i $\Omega = \{\omega_k \,:\, k \in \mathbb{N}\}$, to

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = \sum_{k=1}^{\infty} p(\omega_k).$$

Przykład 2.8. Rzucamy jedną kostką. Wówczas $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$. Jeżeli kostka jest dobrze wyważona to otrzymanie każdej liczby oczek jest jednakowo prawdopodobne. Dokładniej

$$p(1) = p(2) = \dots = p(6) = 1/6$$

jest odpowiadającą funkcją prawdopodobieństwa. Istotnie

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = p(1) + p(2) + \dots + p(6) = 1.$$

Przykładowo

$$\mathbb{P}[\text{ wypadła liczba parzysta }] = p(2) + p(4) + p(6) = 1/2.$$

Przykład 2.9. Załóżmy teraz, że rzucamy kostką, na której ktoś domalował piątą kropkę na ścianie pokazującej 4. W dalszym ciągu możemy przyjąć $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$. Tym razem jednak funkcja prawdopodobieństwa to

$$p(1) = p(2) = p(3) = p(6) = 1/6$$

oraz

$$p(4) = 0, \quad p(5) = 2/6.$$

W tym wypadku

$$\mathbb{P}[\text{ wypadła liczba parzysta }] = p(2) + p(4) + p(6) = 1/3.$$

Przykład 2.10. Rzucamy parą kości sześciennych. Przyjmujemy

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,5), (6,6)\}.$$

oraz

$$p((1,1)) = \dots = p((6,6)) = 1/36.$$

Innymi słowy każdy wynik jest jednakowo prawdopodobny. Rozważmy

$$\begin{aligned} A &= \{\text{ na pierwszej kości wypadła piątka}\} \\ &= \{(5,1), (5,2), \dots, (5,6)\}. \end{aligned}$$

Wtedy

$$\mathbb{P}[A] = 1/6.$$

Przykład 2.11. Rzucamy kostką aż do momentu otrzymania pierwszego orła. Wówczas $\Omega = \{R\}^{\mathbb{N}} \cup \bigcup_{k=0}^{\infty} \{R\}^k \times \{O\}$, jak w Przykład 2.2. Funkcją prawdopodobieństwa jest $p(O) = \frac{1}{2}$, $p(OR) = \frac{1}{4}$ oraz ogólnie $p(\omega_k) = 2^{-k}$, gdzie ω_k składa się z $k-1$ reszek i orła, oraz $p(\omega_\infty) = 0$, gdzie ω_∞ składa się z samych reszek. Rzeczywiście, wystarczy sprawdzić

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = p(\omega_\infty) + \sum_{k=1}^{\infty} p(\omega_k) = 0 + 1.$$

2.5 Problem Monty'ego Halla raz jeszcze

Stosując poznany przez nas formalizm chcemy rozstrzygnąć problem wylosowania samochodu. Zaczniemy od konstrukcji odpowiedniej przestrzeni probabilistycznej. Możemy przyjąć, że nagroda znajduje się za bramką z numerem 1. Natomiast bramki 2 oraz 3 zawierają zonka. Naszymi zdarzeniami elementarnymi będą pary liczb (n, k), gdzie n to numer bramki wybranej przez uczestnika, a k to numer bramki, którą odsłania prowadzący. Zauważmy, że jeżeli

początkowo wybierzemy bramkę za którą jest zonk, to prowadzący nie może odsłonić bramki z samochodem. Mamy zatem

$$\Omega = \{(1,2),(1,3),(2,3),(3,2)\}.$$

Jakie prawdopodobieństwo należy przypisać każdemu możliwemu zdarzeniu? Uczestnik nie ma żadnych przesłanek w której bramce jest nagroda, więc każdą z nich wybierze z takim samym prawdopodobieństwem. Mamy

$$\{\text{Uczestnik wybrał bramkę 1}\} = \{(1,2),(1,3)\}$$
$$\{\text{Uczestnik wybrał bramkę 2}\} = \{(2,3)\}$$
$$\{\text{Uczestnik wybrał bramkę 3}\} = \{(3,2)\}$$

Skoro wszystkie zdarzenia mają to samo prawdopodobieństwo, to

$$p((2,3)) = p(3,2) = p((1,2)) + p((1,3)) = 1/3.$$

W przypadku, gdy gracz wybiera bramkę 1, która kryje samochód, prowadzący musi wybrać jedną z bramek do odkrycia. Jak się zaraz okaże nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób to robi. Możemy przyjąć $p((1,2)) = a$ i $p((1,3)) = b$ dla dowolnej pary liczb a, b takich, że $a + b = 1/3$.

Zauważmy, że wybór konkretnej strategii nie wpływa na nasz opis tego zdarzenia losowego. Niech teraz A oznacza zdarzenie, że uczestnik, który zawsze zmienia bramkę wygra samochód. Mamy

$$A = \{(2,3),(3,2)\}.$$

Wówczas

$$\mathbb{P}[A] = p((2,3)) + p((3,2)) = 2/3..$$

Niech teraz B oznacza zdarzenie, że uczestnik, który nigdy nie zmienia bramki wygra samochód. Wtedy

$$\mathbb{P}[B] = a + b = 1/3.$$

3 Prawdopodobieństwo klasyczne

Przedyskutujemy klasyczny model prawdopodobieństwa, w którym każdy możliwy wynik naszego eksperymentu jest jednakowo prawdopodobny. Dzieje się tak kiedy rzucamy symetryczną monetą lub symetryczną kostką.

3.1 Model klasyczny

Na potrzeby tego rozdziału zakładać będziemy, że rozważana przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω jest skończona. Liczbę elementów zbioru A będziemy oznaczać przez $|A|$. Spotyka się też oznaczenie $\#A$. Dla liczby naturalnej n będziemy pisać

$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}.$$

Jeżeli wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne, to rozważana funkcja prawdopodobieństwa ma postać

$$p(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$$

dla każdego $\omega \in \Omega$. Stąd dla każdego zdarzenia $A \subseteq \Omega$ mamy

$$\mathbb{P}[A] = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Licznik jest liczbą wyników sprzyjających zdarzeniu A, a mianownik liczbą wszystkich możliwych wyników. Jest to dokładnie definicja prawdopodobieństwa spotykana w szkole średniej.

Przykład 3.1. Rzucamy dwukrotnie symetryczną monetą. Wówczas każdy wynik jest jednakowo prawdopodobny. Przestrzenią wszystkich zdarzeń jest

$$\Omega = \{OO, OR, RO, RR\},$$

gdzie O oznacza orła, a R — reszkę. Każdy z czterech ciągów ma prawdopodobieństwo $1/4$.

Zdarzeniu „wypadł dokładnie jeden orzeł" odpowiada zbiór $\{OR, RO\}$, zatem jego prawdopodobieństwo wynosi $2/4 = 1/2$.

Możemy też zapisać wynik doświadczenia jako liczbę orłów. Otrzymamy wtedy trzy możliwości: 0, 1 i 2. **Nie są one jednak jednakowo prawdopodobne**:

# orłów	ciągi	$\mathbb{P}$
0	RR	$1/4$
1	OR, RO	$1/2$
2	OO	$1/4$

Nie ma nic złego w opisywaniu doświadczenia za pomocą liczby orłów. Błędem byłoby dopiero przypisanie każdej z tych trzech wartości prawdopodobieństwa $1/3$.

! Słowo „losowo” nie wystarcza

Zanim użyjesz modelu prawdopodobieństwa klasycznego, odpowiedz na dwa pytania:

1. Co jest zdarzeniem elementarnym?
2. Dlaczego wszystkie takie wyniki mają tę samą szansę?

To, że potrafimy wypisać kilka możliwości, nie oznacza jeszcze, że są jednakowo prawdopodobne.

Przykład 3.2. Rzucamy dwiema uczciwymi kostkami. Wynik zapisujemy jako parę (i, j), gdzie i jest wynikiem pierwszej kostki, a j — drugiej. Wtedy

$$\Omega = [6]^2, \qquad |\Omega| = 36.$$

Suma 7 pojawia się dla sześciu par:

$$(1,6),\ (2,5),\ (3,4),\ (4,3),\ (5,2),\ (6,1).$$

Jej prawdopodobieństwo wynosi więc $6/36 = 1/6$. Suma 2 odpowiada tylko parze $(1,1)$, zatem ma prawdopodobieństwo $1/36$. Możliwe sumy oczek również nie tworzą modelu klasycznego z jednakowymi wagami.

3.2 Zliczanie wyników

Przy analizie większych modeli często wypisywanie wszystkich elementów zbioru może okazać się zbyt uciążliwe. Okazuje się, że przy obliczaniu odpowiednich prawdopodobieństw nie jest to konieczne. Kluczowe jest wyznaczenie liczebności $|A|$ interesującego nas zdarzenia A. W tym celu bardzo pomocne są podstawowe schematy kombinatoryczne.

Przykład 3.3. Aby poznać liczebność zbioru nie musimy wypisywać wszystkich jego elementów.

(a) Ile liczb całkowitych w zbiorze $[100]$ jest podzielnych przez 3? Takich liczb jest $\lfloor 100/3 \rfloor = 33$.

(b) Ile elementów $[100]$ nie jest podzielnych przez 3? To proste: $100 - 33 = 67$.

(c) Ile elementów A jest podzielnych przez 3 lub przez 5, lub przez obie te liczby? Przez 3 podzielne są 33 elementy, a przez 5 podzielnych jest $\lfloor 100/5 \rfloor = 20$. Dodając te liczby, otrzymalibyśmy 53, czyli zbyt wiele: wielokrotności 15 zostałyby policzone dwukrotnie. Poprawna odpowiedź to

$$\left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{15} \right\rfloor = 47.$$

3.3 Reguła dodawania

Jeżeli obiekty, które chcemy policzyć, dzielą się na dwie **rozłączne** grupy $A, B \subseteq \Omega$, to

$$|A \cup B| = |A| + |B|. \tag{3.1}$$

Reguła ta mówi, że sumę rozłącznych zbiorów zliczamy, zliczając każdy zbiór osobno i dodając wyniki.

Przykład 3.4. Ze zbioru liczb $\Omega = [30]$ losujemy jedną liczbę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie ona podzielna przez 5 lub przez 7? Niech A będzie zdarzeniem, że wylosowana liczba jest podzielna przez 5. Wtedy

$$A = \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}, \quad |A| = 6.$$

Dla zdarzenia B, że wylosowana liczba jest podzielna przez 7,

$$B = \{7, 14, 21\}, \quad |B| = 3.$$

Skoro $A \cap B = \emptyset$, $|A \cup B| = 9$ a co za tym idzie

$$\mathbb{P}[A \cup B] = 3/10.$$

Przykład 3.5. Rzucamy symetryczną kością dwudziestościenną. Wówczas przestrzenią zdarzeń elementarnych jest

$$\Omega = [20].$$

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest nieparzysta lub dzieli się przez 4? Dla liczby p oznaczmy zdarzenie

$$D_p = \{n \in [20] \mid n \text{ dzieli się przez } p\} \subseteq \Omega.$$

Szukamy $\mathbb{P}[N \cup D_4]$, gdzie $N = \{1, 3, \ldots, 19\}$. Zauważmy, że zdarzenia N i D_4 są rozłączne. Mamy $\mathbb{P}[N] = 1/2$ i $\mathbb{P}[D_4] = 1/4$. Stąd

$$\mathbb{P}[N \cup D_4] = \mathbb{P}[N] + \mathbb{P}[D_4] = \frac{3}{4}.$$

Podobnie jest dla rozłącznych zbiorów A_1, $A_2, \ldots, A_m$, $m \in \mathbb{N}$, o liczebnościach $n_1, \ldots, n_m$, to łącznie jest ich

$$\left| \bigcup_{j=1}^{m} A_j \right| = n_1 + \cdots + n_m. \tag{3.2}$$

Warunek rozłączności zapobiega wielokrotnemu zliczaniu tego samego obiektu.

Przykład 3.6. Ile liczb dwucyfrowych jest nieparzystych? Można policzyć parzyste i odjąć wynik od wszystkich liczb. Można również zastosować uogólnioną regułę Równanie 3.2. Niech S_k oznacza zbiór liczb dwucyfrowych o cyfrze jedności k. Wówczas szukamy

$$\begin{aligned} &|S_1 \cup S_3 \cup S_5 \cup S_7 \cup S_9| \\ &= |S_1| + |S_3| + |S_5| + |S_7| + |S_9|. \end{aligned}$$

Każdy z tych zbiorów ma 9 elementów [dlaczego?], więc odpowiedź brzmi $5 \cdot 9 = 45$.

Dla dowolnych skończonych zbiorów A i B mamy

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|. \tag{3.3}$$

Reguła Równanie 3.3 uwzględnia możliwość dwukrotnego policzenia części wspólnej $A \cap B$. Można ją wyprowadzić z Równanie 3.1: zbiory A oraz $B \setminus A$ są rozłączne, podobnie jak $B \setminus A$ oraz $A \cap B$. Zatem

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B \setminus A|, \\ |B| &= |B \setminus A| + |A \cap B|. \end{aligned}$$

Stąd

$$\begin{aligned} |A \cup B| + |A \cap B| &= |A| + |B \setminus A| + |A \cap B| \\ &= |A| + |B|, \end{aligned}$$

co daje Równanie 3.3 . W terminach prawdopodobieństwa klasycznego zapisuje się to jako

$$\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] - \mathbb{P}[A \cap B].$$

Przykład 3.7. Losujemy jedną z liczb $1, 2, \ldots 1000$ w taki sposób, że wylosowanie każdej z nich jest jednakowo prawdopodobne. Wówczas przestrzenią zdarzeń elementarnych jest

$$\Omega = \{1, 2, \ldots, 1000\}.$$

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba dzieli się przez 3 lub 5? Dla liczby p oznaczmy zdarzenie

$$D_p = \{n \in \Omega \mid n \text{ dzieli się przez } p\}.$$

Szukamy $\mathbb{P}[D_3 \cup D_5]$. Zauważmy, że

$$D_3 = \{3m \mid 1 \leq m \leq 333\},$$

więc $\mathbb{P}[D_3] = \frac{333}{1000}$. Podobnie $\mathbb{P}[D_5] = \frac{200}{1000} = \frac{1}{5}$. Skoro $D_3 \cap D_5 = D_{15}$, to $\mathbb{P}[D_3 \cap D_5] = \frac{66}{1000} = \frac{33}{500}$. Ostatecznie

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[D_3 \cup D_5] &= \mathbb{P}[D_3] + \mathbb{P}[D_5] - \mathbb{P}[D_3 \cap D_5] \\ &= \frac{467}{1000}.\end{aligned}$$

Dla trzech zbiorów A, B, C mamy

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| =& |A| + |B| + |C| \\ &- |A \cap B| - |B \cap C| \\ &+ |A \cap B \cap C|.\end{aligned}$$

Jest to przykład ogólnego schematu który przedyskutujemy na koniec tego rozdziału.

3.4 Reguła mnożenia

Dla skończonych zbiorów $S_1, \ldots, S_k$,

$$|S_1 \times \ldots \times S_k| = \prod_{j=1}^{k} |S_j|.$$

Jeżeli wszystkie S_i są tym samym zbiorem S, otrzymujemy $|S^k| = |S|^k$.

Będziemy często korzystać z reguły mnożenia, lecz niemal nigdy z formalnego zapisu sugerowanego w jej sformułowaniu. Chcemy przede wszystkim zachęcić do myślenia o problemach jako o procesach wieloetapowych. Pierwszy element możemy wybrać na $|S_1|$ sposobów. Dla każdego takiego wyboru drugi możemy zrobić na $|S_2|$ sposobów itd. Wyobrażenie sobie takiego procesu często pomaga znaleźć rozwiązanie.

Przykład 3.8. Liczba dróg od s do f na rysunku 2(a) wynosi $3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 = 12$: pierwszą krawędź wybieramy na 3 sposoby, drugą i trzecią na 2 sposoby. Po wyborze pierwszych trzech krawędzi czwarta jest już wymuszona.

Podobne obliczenie zlicza drogi od s do f na rysunku 2(b). Można również zauważyć, że istnieje 12 dróg od s do v i 12 od v do f, więc wszystkich dróg jest $12 \cdot 12 = 144$.

Przykład 3.9. Niech S i T będą zbiorami skończonymi. Niech

$$S^T = \{f \,:\, f\colon T \to S\}.$$

Znajdziemy $|S^T|$ liczbę różnych funkcji $f\colon T \to S$. Będzie wygodnie przyjąć, że

$$S = \{s_1, s_2, \ldots, s_n\}, \quad T = \{t_1, \ldots, t_m\},$$

gdzie $|S| = n$ and $|T| = m$. Dowolną funkcję $f\colon T \to S$ można utożsamić jednoznacznie z

$$(f(t_1), f(t_2), \ldots, f(t_m)).$$

Jest to element S^m. Zatem z reguły iloczynu

$$\left|S^T\right| = |S^m| = n^m.$$

3.5 Wariacje

Definicja 3.1. k-wyrazową wariancją z powtórzeniami zbioru A nazywamy dowolną funkcję $f\colon [k] \to A$.

Innymi słowy k-wyrazowa wariacja z powtórzeniami to po prostu ciąg długości k o wyrazach z A. Zauważmy, że zbiorem wszystkich k-wyrazowych wariancji z powtórzeniami zbioru A jest

$$A^k = A^{[k]} = \{f \mid f\colon [k] \to A\}.$$

Wniosek 3.1. *Jeżeli $|A| = n$, to dla każdego naturalnego k jest*

$$\left|A^{[k]}\right| = n^k$$

różnych wariacji z powtórzeniami zbioru A.

Przykład 3.10. W dziesięciopiętrowym budynku windą jedzie siedem osób. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wszystkie wysiądą na ostatnim piętrze? Jakie jest prawdopodobieństwo, że wszystkie wysiądą na tym samym piętrze? Zauważmy, że każdy scenariusz możemy zakodować w funkcji $f\colon [7] \to [10]$. Tutaj j-tej osobie przyporządkowujemy jedno z dziesięciu pięter, na którym wysiada. W skutek czego wszystkich możliwości jest $|[10]^7| = 10^7$. Zdarzenie, że wszyscy wysiądą na ostatnim piętrze, to

$$\{(10, 10, \ldots, 10)\}.$$

Wobec czego jego prawdopodobieństwo wynosi 10^{-7}. Drugie zdarzenie, że wszyscy wysiądą na tym samym piętrze to

$$\bigcup_{k=1}^{10} A_k,$$

gdzie A_k to zdarzenie, że wszyscy wysiądą na $k$tym piętrze. Dla $k = 10$ sprawdziliśmy już, że $\mathbb{P}[A_{10}] = 10^{-7}$. Nietrudno się przekonać, że dla dowolnego $k \leq 10$, $\mathbb{P}[A_k] = 10^{-7}$. Skoro zdarzenia A_k są rozłączne, to nasze drugie zdarzenie ma prawdopodobieństwo

$$\sum_{k=1}^{10} \mathbb{P}[A_k] = 10^{-6}.$$

Definicja 3.2. k-wyrazową wariancją bez powtórzeń zbioru A nazywamy dowolną różnowartościową funkcję $f\colon [k] \to A$. Zbiór wszystkich takich funkcji oznaczamy przez

$$A^{\underline{k}} = \{f\colon [k] \to A \mid f \text{ jest 1-1}\}.$$

Dla naturalnych k, n przyjmujemy

$$n^{\underline{k}} = n(n-1)\cdots(n-k+1).$$

Jeżeli A ma n elementów, to pierwszy wyraz wariacji możemy wybrać na n sposobów, drugi na $n-1$ sposobów, trzeci na $n-2$ sposobów itd. Mamy więc

$$|A^{\underline{k}}| = n(n-1)\cdots(n-k+1) = n^{\underline{k}}.$$

Wzór ten można całkowicie formalnie wyprowadzić z reguły mnożenia poprzez znalezienie bijekcji (jakiej?) między zbiorem $A^{\underline{k}}$ a zbiorem

$$[n] \times [n-1] \times \cdots \times [n-k+1].$$

Przykład 3.11. W dziesięciopiętrowym budynku windą jedzie siedem osób. Na ile sposobów mogą one wysiąść z windy, jeżeli każda osoba wysiada na innym piętrze? Zauważmy, że każdy scenariusz możemy zakodować w równowartościowej funkcji $f\colon [7] \to [10]$, gdzie j-tej osobie przyporządkowujemy jedno z dziesięciu pięter, na którym wysiada. W skutek czego wszystkich możliwości jest $|[10]^{\underline{7}}| = 10^{\underline{7}}$.

Przykład 3.12.

(a) Dla alfabetu $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ liczba słów długości 5 wynosi $7^5 = 16\,807$, czyli $|\Sigma^5| = 16\,807$. Liczba słów bez powtarzających się liter to $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 2520$: pierwszą literę wybieramy na 7 sposobów, drugą na 6 itd.

(b) Dla $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ liczba słów długości 2 bez powtórzeń wynosi $4 \cdot 3 = 12$. Można przedstawić te słowa za pomocą drzewa, jak na rysunku poniżej. Każda droga od początku odpowiada jednemu słowu bez powtórzeń; na przykład droga przez b do bc odpowiada słowu bc. Podobne, lecz znacznie większe drzewo można wyobrazić sobie dla obliczenia z (a), a także dla dowolnej sytuacji, w której stosujemy regułę mnożenia.

Definicja 3.3. Permutacją zbioru A nazywamy dowolną bijekcję $\sigma\colon A \to A$. Zbiór wszystkich permutacji oznaczamy przez

$$A! = \{\sigma\colon A \to A \mid \sigma \text{ jest 1-1 i na}\}$$

Zauważmy, że permutacja zbioru o $|A| = n$ elementach to n elementów wariacja zbioru A. Wobec czego

$$|A!| = n^{\underline{n}} = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1 = n!$$

Przykład 3.13.

(a) Liczba uporządkowań talii 52 kart to $52! \approx 8{,}07 \cdot 10^{67}$.

(b) Policzmy sposoby wybrania pięciu kart **ze zwracaniem**. Zliczamy uporządkowane piątki kart. Ze zwracaniem oznacza, że przed następnym losowaniem karta wraca do talii. Wyniki odpowiadają wzajemnie jednoznacznie elementom D^5, gdzie D jest zbiorem 52 kart. Reguła mnożenia daje $|D|^5 = 52^5$ możliwości.

(c) Przy wyborze **bez zwracania** wylosowana karta nie wraca do talii. Nie wszystkie piątki z D^5 są dopuszczalne: wykluczamy powtórzenia kart. Nadal stosujemy regułę mnożenia, otrzymując $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 = 52^{\underline{5}}$ możliwości.

3.6 Kombinacje

Gdy kolejność jest istotna używamy wariacji. Często jednak kolejność nie ma znaczenia, a wtedy zamiast ciągów trzeba liczyć nieuporządkowane zbiory.

Definicja 3.4. k-wyrazową kombinacją bez powtórzeń zbioru A nazywamy dowolny k-elementowy zbiór $B \subseteq A$. Zbiór wszystkich kombinacji bez powtórzeń oznaczamy przez

$$\binom{A}{k} = \{B \subseteq A \mid |B| = k\}.$$

Wiemy już, że zbiór n elementów ma 2^n podzbiorów. Dla $0 \leq r \leq n$ niech $\binom{n}{r}$ oznacza liczbę jego podzbiorów r-elementowych. Jest to **współczynnik dwumianowy**, czytany „n po r”, zwany także liczbą kombinacji r elementów spośród n. Oczywiście

$$\left|\binom{A}{k}\right| = \binom{|A|}{k}.$$

Przykład 3.14. Policzmy ciągi zer i jedynek długości 72 zawierające dokładnie 17 jedynek. Każdy taki ciąg wyznaczamy, wybierając 17 pozycji dla jedynek spośród 72 możliwych. Liczba ciągów wynosi więc $\binom{72}{17}$. Ogólnie, liczba ciągów długości n zawierających r jedynek to $\binom{n}{r}$. Aby zakończyć przykład, potrzebujemy wartości $\binom{72}{17}$.

Twierdzenie 3.1. *Dla $0 \leq r \leq n$ zachodzi*

$$\binom{n}{r} = \frac{n^{\underline{r}}}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}.$$

Wybór r-elementowej wariacji zbioru n-elementowego można przeprowadzić w dwóch krokach: wybieramy podzbiór r-elementowy na $\binom{n}{r}$ sposobów, następnie porządkujemy go na $r!$ sposobów. Formalnie oznacza to, że istnieje bijekcja

$$A^{\underline{r}} \to \binom{A}{r} \times [r]!$$

Reguła mnożenia daje

$$n^{\underline{r}} = \binom{n}{r} r!$$

Przykład 3.15. Rozważmy graf bez pętli, kompletny w tym sensie, że każdą parę różnych wierzchołków łączy dokładnie jedna krawędź. Ile ma krawędzi, jeśli ma $n \geq 2$ wierzchołków? Każda krawędź wyznacza dwuelementowy podzbiór zbioru wierzchołków V i odwrotnie. Zbiory te są w bijekcji, zatem liczba krawędzi wynosi

$$\binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)!2!} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Twierdzenie 3.2. *Dla dowolnych rzeczywistych x_0 i x_1 oraz naturalnego n,*

$$(x_1 + x_0)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x_1^k x_0^{n-k}.$$

Poprzez wymnożenie wszystkich nawiasów

$$(x_0 + x_1)^n = \sum_{\epsilon \in \{0,1\}^n} x_{\epsilon(1)} \cdots x_{\epsilon(n)}$$

tutaj $\epsilon = (\epsilon(1), \epsilon(2), \ldots, \epsilon(n))$ koduje który z x_0 i x_1 został wybrany do produktu. Dokładniej $\epsilon(j) = 1$ oznacza, że z j-tego nawiasu zostało wybrane x_1 i $\epsilon(j) = 0$ oznacza, że zostało wybrane x_0. Mamy

$$\sum_{\epsilon \in \{0,1\}^n} x_{\epsilon(1)} \cdots x_{\epsilon(n)} = \sum_{k=0}^{n} |E_k| x_1^k x_0^{n-k},$$

gdzie, E_k to zbiór tych ϵ, które wybierają dokładnie k razy x_1 w trakcie wymnażania. Dokładniej

$$E_k = \{\epsilon \,:\, \epsilon(1) + ... + \epsilon(n) = k\}.$$

Pozostaje zauważyć, że

$$|E_k| = \binom{n}{k}.$$

3.7 Partia pokera

Dobrym sposobem ilustrowania tych technik jest zliczanie układów pokerowych. Talia składa się z czterech kolorów: trefli, kar, kierów i pików. Każdy kolor obejmuje 13 wartości: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. A oznacza asa, J waleta, Q damę, a K króla. Każda wartość występuje cztery razy, po jednej karcie każdego koloru.

Ręka pokerowa jest zbiorem pięciu kart z talii 52 kart. Kolejność wyboru nie ma znaczenia. Strit składa się z pięciu kolejnych wartości, na przykład 8, 9, 10, J, Q. As może być na początku A, 2, 3, 4, 5 albo na końcu 10, J, Q, K, A. Klasyfikujemy ręce w następujące parami rozłączne grupy, wymienione od najmniej do najbardziej prawdopodobnych:

Układ	Opis
Poker królewski	10, J, Q, K, A w jednym kolorze.
Poker	Strit w jednym kolorze, który nie jest pokerem królewskim.
Kareta	Cztery karty tej samej wartości, na przykład cztery trójki i dziewiątka.
Ful	Trzy karty jednej wartości i dwie innej, na przykład trzy walety i dwie ósemki.
Kolor	Pięć kart jednego koloru, bez pokera i pokera królewskiego.
Strit	Strit, który nie jest pokerem ani pokerem królewskim.
Trójka	Trzy karty jednej wartości oraz dwie karty dwóch innych wartości.
Dwie pary	Dwie karty jednej wartości, dwie drugiej i piąta karta trzeciej wartości.
Jedna para	Dwie karty jednej wartości, jeśli ręka nie należy do żadnej wcześniejszej grupy; na przykład dwa króle, walet, dziewiątka i szóstka.
Brak układu	Żaden z powyższych układów.

Przykład 3.16.

(a) Wszystkich rąk pokerowych jest

$$\binom{52}{5} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$
$$= 52 \cdot 17 \cdot 10 \cdot 49 \cdot 6 = 2\,598\,960.$$

(b) Ile jest fulów? Nazwijmy rękę z trzema waletami i dwiema ósemkami fulem typu $(J, 8)$. Kolejność ma znaczenie: typ $(8, J)$ oznacza trzy ósemki i dwa walety. Typy (J, J) i $(8, 8)$ są niemożliwe. Typy fulów odpowiadają więc 2-permutacjom 13 wartości kart: jest ich $13 \cdot 12$. Dla typu $(J, 8)$ trzy walety wybieramy na $\binom{4}{3} = 4$ sposoby, a dwie ósemki na $\binom{4}{2} = 6$ sposobów. Mamy $4 \cdot 6 = 24$ ręce tego typu. Rozumowanie działa dla każdego typu, więc wszystkich fulów jest $13 \cdot 12 \cdot 24 = 3744$.

(c) Ile rąk zawiera dwie pary? Typ $\{Q, 4\}$ oznacza dwie damy, dwie czwórki i kartę trzeciej wartości. Zapis zbiorowy podkreśla, że $\{Q, 4\} = \{4, Q\}$ i nie chcemy liczyć ręki dwukrotnie. Istnieje $\binom{13}{2}$ typów. Dla każdego z nich obie pary wybieramy na $\binom{4}{2}$ sposobów każdą, a piątą kartę na $52 - 8 = 44$ sposoby. Otrzymujemy

$$\binom{13}{2}\binom{4}{2}\binom{4}{2} \cdot 44 = 123\,552.$$

(d) Ile rąk jest stritami? Najpierw liczymy także pokery i pokery królewskie. Typ strita określa jego najwyższa wartość. Może nią być 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K lub A, więc typów jest 10. Dla każdego typu mamy cztery możliwości dla każdej z pięciu kart: razem 4^5. Otrzymujemy $10 \cdot 4^5 = 10\,240$ stritów. Odejmując 4 pokery królewskie i 36 pozostałych pokerów, dostajemy 10 200 zwykłych stritów.

3.8 Problem urodzin

Ile osób powinno znaleźć się w grupie, aby prawdopodobieństwo wspólnych urodzin przynajmniej dwóch z nich przekroczyło 1/2?

Przyjmijmy uproszczony model: rok ma 365 dni, każda konfiguracja urodzin jest jednakowo prawdopodobna. Pomijamy więc lata przestępne i sezonowe różnice w częstości urodzeń.

Dla grupy k osób przestrzenią wyników jest

$$\Omega = [365]^k.$$

Niech C_k oznacza zdarzenie, że co najmniej dwie osoby mają urodziny tego samego dnia. Bezpośrednie zliczanie wyników sprzyjających C_k jest niewygodne: wspólną datę może mieć jedna para, kilka par, trzy osoby, a nawet cała grupa.

Znacznie łatwiej policzyć zdarzenie przeciwne. Dla $1 \leq k \leq 365$ wszystkie daty są różne z prawdopodobieństwem

$$\mathbb{P}(C_k^c) = \frac{365^{\underline{k}}}{365^k} = \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{365}\right).$$

Korzystając z nierówności $1 + x \leq e^x$ mamy

$$\mathbb{P}[C_k^c] \leq e^{-\frac{1}{365}} e^{-\frac{2}{365}} \cdots e^{-\frac{k-1}{365}} = e^{-\frac{k(k-1)}{730}}$$

Na to aby $\mathbb{P}[C_k^c] \leq 1/2$ wystarcza by $k(k-1) \geq 730 \log(2) \approx 505,997$, czyli $k \leq 23$.

Dla $k \geq 366$ mamy $\mathbb{P}(C_k) = 1$, ponieważ różne daty dla wszystkich osób są wtedy niemożliwe.

Liczba osób k	Prawdopodobieństwo wspólnych urodzin
10	0,1169
20	0,4114
22	0,4757
23	0,5073
30	0,7063
40	0,8912
50	0,9704

Prawdopodobieństwo rośnie wraz z liczbą osób. Porównanie wyników dla 22 i 23 osób pokazuje więc, że **najmniejsza szukana liczba to** 23.

Skąd tak niewielka liczba? Nie pytamy, czy ktoś ma urodziny w jednym z góry ustalonym dniu. Porównujemy wszystkie pary osób. W grupie 23 osób jest aż

$$\binom{23}{2} = 253$$

pary. Jest więc wiele możliwości pojawienia się zgodności. Samej liczby par nie wolno jednak po prostu podzielić przez 365: zdarzenia zgodności poszczególnych par nie są rozłączne.

3.9 Zasada właczeń i wyłączeń

Zliczanie elementów części wspólnej zbiorów, gdzie kluczowym spójnikiem jest „i", często jest łatwe. Natomiast bezpośrednie zliczanie elementów sumy zbiorów często sprawia trudność. Zasada włączeń i wyłączeń wyraża liczność sumy przez liczności odpowiednich części wspólnych.

Zasada włączeń i wyłączeń

Aby obliczyć liczność $A_1 \cup \cdots \cup A_n$, oblicz liczności wszystkich możliwych części wspólnych zbiorów z $\{A_1, \ldots, A_n\}$. Dodaj wyniki dla części wspólnych nieparzystej liczby zbiorów, a odejmij wyniki dla części wspólnych parzystej liczby zbiorów.

Dla przykładu, dla dwóch zdarzeń A, B mamy znany nam już wzór

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Dla trzech zdarzeń A, B, C,

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &- |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &+ |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

„Włączamy", czyli dodajemy, liczności poszczególnych zbiorów; „wyłączamy", czyli odejmujemy, części wspólne każdej pary; następnie dodajemy części wspólne każdej trójki itd.

Przykład 3.17.

(a) Policzmy liczby w $S = \{1, 2, \ldots, 2000\}$ podzielne przez 9 lub 11. Dla dodatniego k niech $D_k = \{n \in S : k \mid n\}$. Szukamy $|D_9 \cup D_{11}|$. Ponieważ $|D_k| = \lfloor 2000/k \rfloor$, mamy $|D_9| = 222$, $|D_{11}| = 181$ i $|D_9 \cap D_{11}| = |D_{99}| = 20$. Zatem $|D_9 \cup D_{11}| = 222 + 181 - 20 = 383$.

(b) Przy podzielności przez 9, 11 lub 13 trudniejsze są tylko rachunki. Ponadto $|D_{13}| = 153$, $|D_9 \cap D_{13}| = |D_{117}| = 17$, $|D_{11} \cap D_{13}| = |D_{143}| = 13$, $|D_9 \cap D_{11} \cap D_{13}| = |D_{1287}| = 1$. Stąd

$$\begin{aligned} &|D_9 \cup D_{11} \cup D_{13}| \\ &= 222 + 181 + 153 - 20 - 17 - 13 + 1 \\ &= 507. \end{aligned}$$

(c) Policzmy jeszcze liczby podzielne przez 9, 11, 13 lub 15. Trzeba uważać: na przykład $D_9 \cap D_{15} = D_{45}$, a nie D_{135}, ponieważ podzielność przez 9 i 15 jest równoważna podzielności

przez $\operatorname{lcm}(9,15) = 45$. Otrzymujemy

$$\begin{aligned}
&|D_{15}| = 133,\\
&|D_9 \cap D_{15}| = |D_{45}| = 44,\\
&|D_{11} \cap D_{15}| = |D_{165}| = 12,\\
&|D_{13} \cap D_{15}| = |D_{195}| = 10,\\
&|D_9 \cap D_{11} \cap D_{15}| = |D_{495}| = 4,\\
&|D_9 \cap D_{13} \cap D_{15}| = |D_{585}| = 3,\\
&|D_{11} \cap D_{13} \cap D_{15}| = |D_{2145}| = 0,\\
&|D_9 \cap D_{11} \cap D_{13} \cap D_{15}| = |D_{6435}| = 0.
\end{aligned}$$

Zasada włączeń i wyłączeń daje

$$\begin{aligned}
&|D_9 \cup D_{11} \cup D_{13} \cup D_{15}|\\
&= 222 + 181 + 153 + 133\\
&- (20 + 17 + 44 + 13 + 12 + 10)\\
&+ (1 + 4 + 3 + 0) - 0 = 581.
\end{aligned}$$

Zasada przydaje się także do zliczania części wspólnej zbiorów, których dopełnienia są łatwiejsze do opisania.

Przykład 3.18. Losujemy liczbę z $T = \{1000, 1001, \ldots, 9999\}$. Szukamy prawdopodobieństwa, że jej zapis zawiera co najmniej jedno 0, co najmniej jedną 1 i co najmniej jedną 2. Przykładami są 1072 i 2101. Łatwiej policzyć liczby, które nie zawierają określonych cyfr. Dla $k = 0, 1, 2$ niech

$$A_k = \{n \in T : \text{ zapis } n \text{ nie zawiera cyfry } k\}.$$

Wtedy poszukiwany zbiór to $A_0^c \cap A_1^c \cap A_2^c = (A_0 \cup A_1 \cup A_2)^c$, zgodnie z prawem de Morgana. Reguła mnożenia daje $|A_1| = 8 \cdot 9^3$: pierwsza cyfra nie może być zerem ani jedynką, a pozostałe nie mogą być jedynkami. Podobnie

$$\begin{aligned}
|A_0| &= 9^4 = 6561,\\
|A_1| &= |A_2| &&= 8 \cdot 9^3 = 5832,\\
|A_0 \cap A_1| &= |A_0 \cap A_2| = 8^4 = 4096,\\
|A_1 \cap A_2| &= 7 \cdot 8^3 = 3584,\\
|A_0 \cap A_1 \cap A_2| &= 7^4 = 2401.
\end{aligned}$$

Stąd

$$\begin{aligned}
|A_0 \cup A_1 \cup A_2| =& 6561 + 5832 + 5832\\
&- (4096 + 4096 + 3584)\\
&+ 2401 = 8850.
\end{aligned}$$

Zdarzenie przeciwne ma $9000 - 8850 = 150$ elementów, a jego prawdopodobieństwo wynosi $150/9000 = 1/60$.

Przykład 3.19. Ustawiamy cyfry $1, 2, \ldots, 9$ w losowej kolejności. Jakie jest prawdopodobieństwo, że żadna nie pozostanie na naturalnym miejscu, czyli 1 na pierwszym, 2 na drugim itd.? Łatwiej policzyć zdarzenie przeciwne. Niech A_k będzie zbiorem permutacji, w których na pozycji k stoi cyfra k.

Każdy A_i ma 8! elementów: ustalamy jedną cyfrę i dowolnie porządkujemy pozostałe. Każde $A_i \cap A_j$, dla $i < j$, ma 7! elementów; każda część wspólna trzech takich zbiorów ma 6! itd. Jest 9 zbiorów A_i, $\binom{9}{2}$ par, $\binom{9}{3}$ trójek itd. Zatem

$$\begin{aligned}&|A_1 \cup \cdots \cup A_9| \\ &= 9 \cdot 8! - \binom{9}{2} 7! + \binom{9}{3} 6! - \binom{9}{4} 5! \\ &+ \ldots + \binom{9}{9} 0!\end{aligned}$$

Ostatni składnik $\binom{9}{9}0! = 1$ zlicza permutację identycznościową, w której żadna cyfra się nie przesunęła. Ponieważ $\binom{9}{m}(9-m)! = 9!/m!$, dostajemy

$$\begin{aligned}&|A_1 \cup \cdots \cup A_9| \\ &= 9! \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots - \frac{1}{8!} + \frac{1}{9!} \right).\end{aligned}$$

Wszystkich permutacji jest 9!, więc prawdopodobieństwo co najmniej jednej cyfry na swoim miejscu to

$$1 - 1/2! + 1/3! - \cdots - 1/8! + 1/9!.$$

Prawdopodobieństwo, że żadna nie jest na swoim miejscu, wynosi

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{8!} - \frac{1}{9!} \\ &= 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{8!} - \frac{1}{9!}.\end{aligned}$$

To początek szeregu dla e^{-1}, gdzie $e \approx 2{,}71828$. Odpowiedź wynosi zatem około $1/e \approx 0{,}368$.

Twierdzenie 3.3. *Dla dowolnych skończonych podzbiorów $A_1, \ldots, A_n \subseteq \Omega$,*

$$\begin{aligned}|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| &= \sum_{k=1}^{m} |A_k| \\ - \sum_{k,j=1, k<j}^{n} |A_k \cap A_j| &+ \ldots (-1)^{n-1} |A_1 \cap \ldots A_n|\end{aligned}$$

Twierdzenie o dwumianie daje wzór:

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} \\ &= 1 - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots + (-1)^m. \end{aligned}$$

Dla nieparzystego m łatwo dostrzec, że składniki $\binom{m}{k}$ i $\binom{m}{m-k}$ mają przeciwne znaki i się redukują. Dla parzystego m nie jest to tak oczywiste bez twierdzenia.

Wzór ten daje dowód zasady włączeń i wyłączeń. Rozważmy element należący do dokładnie m zbiorów, powiedzmy $A_1, \ldots, A_m$. W sumie liczności zbiorów zliczamy go m razy, następnie odejmujemy po jednym razie dla każdej pary, dodajemy dla każdej trójki itd. Jego łączny wkład wynosi

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots + (-1)^{m+1} \binom{m}{m} = 1.$$

Każdy element sumy został więc policzony dokładnie raz.

4 Prawdopodobieństwo warunkowe

Rozważmy przykład z finansów. W chwili 0 kupujemy europejską opcję kupna, czyli kontrakt dający prawo zakupu akcji w ustalonej chwili 1 po określonej cenie wykonania K. Interesuje nas przyszła cena akcji S_1, ponieważ wypłata z opcji wynosi $\max(S_1 - K, 0)$.

Załóżmy, że w chwili 0,8 chcemy sprzedać ten kontrakt. Dysponujemy wtedy informacją o cenie akcji na przedziale $[0, 0{,}8]$. Pytamy, jak ta informacja zmienia naszą ocenę możliwych cen w chwili 1.

Przeszłość i przyszłość można traktować jako dwie części doświadczenia losowego. Jak wiedza o pierwszej wpływa na prawdopodobieństwa wyników drugiej? Pierwszym krokiem do takich zastosowań jest zrozumienie prawdopodobieństwa warunkowego. Warunkowanie całej historii procesu wymaga bardziej zaawansowanego języka; tutaj zaczniemy od warunkowania zdarzeniem o dodatnim prawdopodobieństwie.

4.1 Podstawowe definicje

Przykład 4.1. Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami sześciennymi. Przestrzeń wyników ma postać

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}^2.$$

Każdej z 36 par przypisujemy prawdopodobieństwo $1/36$. Zdarzenie „suma oczek wynosi 6" to

$$A = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\},$$

więc $\mathbb{P}[A] = 5/36$.

Załóżmy teraz, że wiemy, iż na pierwszej kostce wypadło jedno oczko. Informacja ta oznacza zdarzenie

$$B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)\}.$$

Po uwzględnieniu tej informacji pozostaje sześć jednakowo prawdopodobnych wyników. Tylko $(1,5)$ należy do A, zatem nowe prawdopodobieństwo wynosi $1/6$. Możemy je wyrazić za pomocą pierwotnej miary:

$$\begin{aligned}\frac{|A\cap B|}{|B|} &= \frac{|A\cap B|/|\Omega|}{|B|/|\Omega|}\\ &= \frac{\mathbb{P}[A\cap B]}{\mathbb{P}[B]} = \frac{1/36}{6/36} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Ta konstrukcja pojawia się tak często, że ma własną nazwę.

Definicja 4.1. Niech $(\Omega,\mathbb{P})$ będzie dyskretną przestrzenią probabilistyczną, a $B\subseteq\Omega$ zdarzeniem takim, że $\mathbb{P}[B]>0$. **Prawdopodobieństwem warunkowym** zdarzenia A pod warunkiem zajścia B nazywamy

$$\mathbb{P}[A\mid B] = \frac{\mathbb{P}[A\cap B]}{\mathbb{P}[B]}.$$

Przy ustalonym B funkcja $\mathbb{P}_B[A]=\mathbb{P}[A\mid B]$ jest miarą probabilistyczną na Ω. Istotnie, jeżeli przez p oznaczymy funkcję prawdopodobieństwa stowarzyszoną z wyjściową miarą probabilistyczną $\mathbb{P}$, czyli $p(\omega)=\mathbb{P}[\{\omega\}]$ dla której

$$\mathbb{P}[A]=\sum_{\omega\in A} p(\omega)$$

Wówczas dla

$$p_B(\omega)=\begin{cases}\frac{p(\omega)}{\mathbb{P}[B]} & \omega\in B\\ 0 & \omega\notin B\end{cases}$$

mamy

$$\mathbb{P}_B[A]=\sum_{\omega\in A} p_B(\omega).$$

W szczególności

$$\mathbb{P}_B[\Omega]=1,\qquad \mathbb{P}_B[B]=1,$$

a dla parami rozłącznych $A_1,A_2,\ldots,A_N$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_B\left[\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right] &= \frac{\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}[A_n\cap B]}{\mathbb{P}[B]}\\ &= \sum_{n=1}^{N}\mathbb{P}_B[A_n].\end{aligned}$$

Warunkowanie pozwala uwzględnić dodatkową informację. Na przykład model ryzyka może korzystać z wieku, historii zdarzeń lub charakterystyki badanego obiektu.

Przykład 4.2. Rozważamy rodzinę z dwojgiem dzieci. Przyjmujemy uproszczony model: chłopiec i dziewczynka są jednakowo prawdopodobni. Pierwsza współrzędna oznacza **starsze** dziecko, druga młodsze; c oznacza chłopca, d dziewczynkę. Wówczas

$$\Omega = \{(c,c),(c,d),(d,c),(d,d)\}.$$

Jakie jest prawdopodobieństwo dwóch chłopców? (a) Jeśli wiemy, że starsze dziecko jest chłopcem, warunkujemy zdarzeniem $B = \{(c,c),(c,d)\}$. Otrzymujemy

$$\mathbb{P}[\{(c,c)\} \mid B] = \frac{1}{2}.$$

(b) Jeśli wiemy, że **co najmniej jedno dziecko jest chłopcem**, warunkujemy zdarzeniem $D = \{(c,c),(c,d),(d,c)\}$, więc

$$\mathbb{P}[\{(c,c)\} \mid D] = \frac{1}{3}.$$

(c) Informacja „co najmniej jedno dziecko ma na imię Franek" nie jest tym samym co informacja z (b). Załóżmy dodatkowo, że każdy chłopiec ma to imię z prawdopodobieństwem $f > 0$, że dziewczynki go nie mają i że nadawanie imion jest niezależne między dziećmi oraz od płci drugiego dziecka. Niech F oznacza co najmniej jednego Franka. W rozszerzonym modelu

$$\mathbb{P}[F \mid (c,c)] = 1 - (1-f)^2 = 2f - f^2,$$

natomiast $\mathbb{P}[F \mid (c,d)] = \mathbb{P}[F \mid (d,c)] = f$ i $\mathbb{P}[F \mid (d,d)] = 0$. Zatem

$$\mathbb{P}[(c,c) \mid F] = \frac{(2f-f^2)/4}{(2f-f^2+f+f)/4} = \frac{2-f}{4-f}.$$

Dla małego f wynik jest bliski $1/2$, a dla $f = 1$ wynosi $1/3$. Wynik zależy również od sposobu uzyskania informacji: poznanie imienia konkretnego dziecka jest innym zdarzeniem niż stwierdzenie, że co najmniej jedno nosi dane imię.

4.2 Wzór na prawdopodobieństwo całkowite

Definicja prawdopodobieństwa warunkowego daje **regułę mnożenia**:

$$\mathbb{P}[A \cap B] = \mathbb{P}[B]\mathbb{P}[A \mid B].$$

Zdarzenia $A \cap B$ i $A \cap B^c$ są rozłączne. Jeśli $0 < \mathbb{P}[B] < 1$, to

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[A] &= \mathbb{P}[A \cap B] + \mathbb{P}[A \cap B^c] \\ &= \mathbb{P}[A \mid B]\mathbb{P}[B] + \mathbb{P}[A \mid B^c]\mathbb{P}[B^c].\end{aligned}$$

Wzór szczególnie ułatwia rachunki w doświadczeniach wieloetapowych. Uogólnijmy go na więcej zdarzeń.

Definicja 4.2. Rodzinę zdarzeń $\{B_k\}_{k\in I}$, skończoną lub przeliczalną, nazywamy **rozbiciem** przestrzeni Ω, jeżeli

$$\Omega = \bigcup_{k\in I} B_k, \qquad B_i \cap B_j = \emptyset \quad (i \neq j).$$

Twierdzenie 4.1 (Wzór na prawdopodobieństwo całkowite)**.** *Jeżeli $\{B_k\}_{k\in I}$ jest skończonym lub przeliczalnym rozbiciem Ω i $\mathbb{P}[B_k] > 0$ dla każdego $k \in I$, to dla dowolnego $A \subseteq \Omega$,*

$$\mathbb{P}[A] = \sum_{k\in I} \mathbb{P}[A \mid B_k]\mathbb{P}[B_k].$$

Dowód. Korzystając z rozbicia, addytywności i definicji prawdopodobieństwa warunkowego, otrzymujemy

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[A] &= \mathbb{P}\left[A \cap \bigcup_{k\in I} B_k\right] \\ &= \mathbb{P}\left[\bigcup_{k\in I}(A \cap B_k)\right] \\ &= \sum_{k\in I} \mathbb{P}[A \cap B_k] = \sum_{k\in I} \mathbb{P}[A \mid B_k]\mathbb{P}[B_k].\end{aligned}$$

□

Przykład 4.3. W loterii fantowej prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego wynosi p, przegrywającego q, a losu „graj dalej" r, gdzie $p + q + r = 1$ i $r < 1$. Los „graj dalej" wraca do urny i pozwala na kolejne losowanie, w tych samych warunkach. Jakie jest prawdopodobieństwo ostatecznej wygranej?

Niech A, B, C oznaczają rodzaje losu w pierwszym losowaniu, a W ostateczną wygraną. Po losie „graj dalej" wracamy do sytuacji początkowej. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite daje

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[W] &= \mathbb{P}[W \mid A]p + \mathbb{P}[W \mid B]q + \mathbb{P}[W \mid C]r \\ &= p + r\mathbb{P}[W].\end{aligned}$$

Stąd

$$\mathbb{P}[W] = \frac{p}{1-r} = \frac{p}{p+q}.$$

Jeśli któryś z rodzajów losu ma prawdopodobieństwo zero, pomijamy go w rozbiciu. Warunek $r < 1$ jest istotny: dla $r = 1$ gra trwa bez końca i wygrana ma prawdopodobieństwo zero.

4.3 Wzór Bayesa

Przykład 4.4. Rozważmy hipotetyczny model testu wykrywającego chorobę. Jedna osoba na 1000 jest chora. U chorych test daje wynik dodatni z prawdopodobieństwem 99%, a u zdrowych wynik ujemny z prawdopodobieństwem 95%. Jakie jest prawdopodobieństwo dodatniego wyniku u losowej osoby?

Oznaczmy:

- C: osoba jest chora;
- $Z = C^c$: osoba jest zdrowa;
- T: wynik testu jest dodatni.

Mamy $\mathbb{P}[T \mid Z] = 0{,}05$, więc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[T] &= \mathbb{P}[T \mid Z]\mathbb{P}[Z] + \mathbb{P}[T \mid C]\mathbb{P}[C] \\ &= \frac{5}{100}\frac{999}{1000} + \frac{99}{100}\frac{1}{1000} \\ &= \frac{5094}{100000} = 0{,}05094.\end{aligned}$$

Naturalne jest teraz inne pytanie: jeśli wynik był dodatni, jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba rzeczywiście jest chora? Pytamy o stan badanego obiektu po poznaniu wyniku obserwacji. Odpowiedź daje wzór Bayesa.

Twierdzenie 4.2 (Wzór Bayesa)**.** *Niech $\{B_k\}_{k\in I}$ będzie skończonym lub przeliczalnym rozbiciem Ω z $\mathbb{P}(B_k) > 0$. Jeżeli $\mathbb{P}[A] > 0$, to dla każdego $k \in I$*

$$\mathbb{P}[B_k \mid A] = \frac{\mathbb{P}[A \mid B_k]\mathbb{P}[B_k]}{\sum_{i\in I}\mathbb{P}[A \mid B_i]\mathbb{P}[B_i]}.$$

Dowód. Z definicji warunkowania i wzoru na prawdopodobieństwo całkowite:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[B_k \mid A] &= \frac{\mathbb{P}[A \cap B_k]}{\mathbb{P}[A]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[A \mid B_k]\mathbb{P}[B_k]}{\sum_{i\in I}\mathbb{P}[A \mid B_i]\mathbb{P}[B_i]}.\end{aligned}$$

□

Dwa kierunki rachunku

Wzór na prawdopodobieństwo całkowite łączy prawdopodobieństwa wyniku w różnych przypadkach. Wzór Bayesa pozwala obliczyć prawdopodobieństwa tych przypadków po poznaniu wyniku.

Przykład 4.5. Mamy 100 monet: 99 symetrycznych i jedną z orłem po obu stronach. Wybieramy monetę losowo i rzucamy nią dziesięć razy. Wszystkie wyniki to orły. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybraliśmy monetę z dwoma orłami?

Niech B_1 oznacza monetę symetryczną, B_2 monetę z dwoma orłami, a A dziesięć orłów. Zakładamy niezależność rzutów przy ustalonej monecie. Wtedy

$$\mathbb{P}[A \mid B_1] = 2^{-10}, \qquad \mathbb{P}[A \mid B_2] = 1.$$

Ze wzoru Bayesa

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}[B_2 \mid A] \\
&= \frac{\mathbb{P}[A \mid B_2]\mathbb{P}[B_2]}{\mathbb{P}[A \mid B_1]\mathbb{P}[B_1] + \mathbb{P}[A \mid B_2]\mathbb{P}[B_2]} \\
&= \frac{1 \cdot \frac{1}{100}}{\frac{1}{2^{10}}\frac{99}{100} + 1 \cdot \frac{1}{100}} = \frac{1024}{1123} \approx 0{,}912.
\end{aligned}$$

Przed obserwacją prawdopodobieństwo wynosiło 1%. Dziesięć orłów zwiększa je do około 91,2%.

Przykład 4.6. Wróćmy do testu z Przykład 4.4. U losowo wybranej osoby wynik jest dodatni. Jakie jest prawdopodobieństwo choroby?

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}[C \mid T] &= \frac{\mathbb{P}[T \mid C]\mathbb{P}[C]}{\mathbb{P}[T \mid Z]\mathbb{P}[Z] + \mathbb{P}[T \mid C]\mathbb{P}[C]} \\
&= \frac{\frac{99}{100}\frac{1}{1000}}{\frac{5}{100}\frac{999}{1000} + \frac{99}{100}\frac{1}{1000}} = \frac{99}{5094} \\
&\approx 0{,}01943.
\end{aligned}$$

Otrzymujemy około 1,94%. To nie jest czułość testu $\mathbb{P}(T \mid C) = 99\%$: odwrócenie warunku zmienia pytanie.

Spójrzmy na oczekiwane liczby w populacji 100 000 osób. Około 100 jest chorych, a 99 900 zdrowych. Wśród chorych oczekujemy 99 wyników dodatnich, a wśród zdrowych 4995. Łącznie daje to 5094 wyniki dodatnie.

Stan osoby	Wynik dodatni	Wynik ujemny	Razem
Chora	99	1	100
Zdrowa	4995	94 905	99 900
Razem	5094	94 906	100 000

Warto odróżniać wysoką czułość testu od prawdopodobieństwa choroby po dodatnim wyniku. Znaczenie ma także częstość choroby w badanej populacji.

References

John, Tierney. 1991. „Behind Monty Hall's doors: puzzle, debate and answer". *The New York Times* 21. https://www.nytimes.com/1991/07/21/us/behind-monty-hall-s-doors-puzzle-debate-and-answer.html.

Część II

Listy zadań

Lista 1. Przestrzenie zdarzeń elementarnych

Zadania na ćwiczenia 8.10.2026

1. Rzucamy kością sześcienną, a następnie dwukrotnie monetą.

   a) Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω, która zachowuje informację o wyniku każdego rzutu. Ile ma ona elementów?
   b) Zapisz jako podzbiory Ω następujące zdarzenia:
      - A: na kości wypadła szóstka, a na monecie co najmniej jeden orzeł;
      - B: na kości wypadła liczba parzysta, a w drugim rzucie monetą orzeł;
      - C: na kości wypadła liczba mniejsza niż 5, a na monecie co najmniej jeden orzeł.
   c) Przyjmij, że wszystkie wyniki elementarne są jednakowo prawdopodobne. Oblicz $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[B]$ i $\mathbb{P}[C]$.

2. Za jednymi z czworga drzwi znajduje się samochód, a za pozostałymi kozy. Uczestnik wybiera jedne drzwi z jednakowym prawdopodobieństwem. Prowadzący zna położenie samochodu i otwiera jedne z niewybranych drzwi, za którymi jest koza. Jeśli ma kilka możliwości, wybiera spośród nich z jednakowym prawdopodobieństwem. Zawsze proponuje zmianę wyboru.

   a) Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej, jeśli uczestnik pozostaje przy swoim wyborze?
   b) Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej, jeśli uczestnik zmienia wybór na jedne z dwojga pozostałych zamkniętych drzwi, wybierając między nimi z jednakowym prawdopodobieństwem?

3. Rzucamy dwiema rozróżnialnymi kośćmi sześciennymi. Każda uporządkowana para wyników ma prawdopodobieństwo 1/36.

   a) Opisz przestrzeń wyników, gdy zapisujemy wynik każdej kości osobno.
   b) Opisz przestrzeń wyników, gdy zapisujemy tylko sumę oczek.
   c) W drugim modelu oblicz prawdopodobieństwa wyników 2, 7 i 12. Czy wszystkie możliwe sumy są jednakowo prawdopodobne?
   d) Wybierz wygodniejszy z tych modeli i oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek wyniesie co najmniej 10.

4. Losujemy jedną liczbę ze zbioru $\Omega = \{1, 2, \ldots, 24\}$; każda liczba ma takie samo prawdopodobieństwo. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba jest podzielna przez 2, a B że jest podzielna przez 3.

   a) Wypisz zbiory A, B, $A \cap B$, $A \cup B$ oraz $A \setminus B$.
   b) Zapisz za pomocą A, B i działań na zbiorach zdarzenia, że wylosowana liczba jest podzielna:
      - przez co najmniej jedną z liczb 2 i 3;
      - przez obie te liczby;
      - przez dokładnie jedną z tych liczb;
      - przez żadną z tych liczb.
   c) Oblicz prawdopodobieństwo każdego ze zdarzeń z punktu b).
   d) Niech C oznacza podzielność przez 6. Które ze zdarzeń A, B, C pociągają inne? Zapisz odpowiednie inkluzje.

5. Generator zwraca jedną z liczb $1, 2, \ldots, 6$. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby k ma postać

$$p(k) = ck, \qquad k \in \{1, 2, \ldots, 6\},$$

   gdzie c jest stałą.

   a) Wyznacz c.
   b) Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby parzystej, liczby co najmniej 5 oraz liczby mniejszej niż 3.
   c) Wyjaśnij, dlaczego w tym modelu iloraz $|A|/|\Omega|$ nie musi być równy $\mathbb{P}[A]$. Podaj przykład zdarzenia, dla którego te wartości są różne.

6. Rzucamy monetą do otrzymania pierwszego orła. Uwzględniamy również wynik $\omega_\infty = RRR\ldots$, w którym orzeł nigdy nie wypada. Przyjmujemy model

$$p(R^{k-1}O) = 2^{-k} \quad (k \geq 1), \qquad p(\omega_\infty) = 0,$$

   gdzie $R^{k-1}O$ oznacza $k-1$ reszek, po których następuje orzeł.

   a) Oblicz prawdopodobieństwo zakończenia doświadczenia najpóźniej w trzecim rzucie.
   b) Oblicz prawdopodobieństwo, że pierwszy orzeł pojawi się w rzucie o numerze parzystym.

7. Niech $\mathbb{P}$ będzie miarą probabilistyczną na przestrzeni co najwyżej przeliczalnej. Uzasadnij następujące własności dla dowolnych zdarzeń A i B:

   a) $\mathbb{P}[\emptyset] = 0$ oraz $\mathbb{P}[\Omega] = 1$;
   b) $\mathbb{P}[A'] = 1 - \mathbb{P}[A]$;
   c) jeśli $A \subseteq B$, to $\mathbb{P}[A] \leq \mathbb{P}[B]$;
   d) $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] - \mathbb{P}[A \cap B]$.

8. Za jednymi z $n \geq 3$ drzwi znajduje się samochód, a za pozostałymi kozy. Uczestnik wybiera jedne drzwi z jednakowym prawdopodobieństwem. Prowadzący zna położenie samochodu i zawsze otwiera dokładnie r różnych drzwi z kozami, spośród drzwi niewybranych przez uczestnika, gdzie $1 \leq r \leq n-2$. Jeśli ma kilka możliwości, wybiera zestaw otwieranych drzwi z jednakowym prawdopodobieństwem. Zawsze proponuje zmianę.

   a) Oblicz prawdopodobieństwo wygranej przy pozostaniu przy pierwotnym wyborze.
   b) Uczestnik zmienia wybór na jedne z pozostałych zamkniętych, niewybranych wcześniej drzwi, losując między nimi z jednakowym prawdopodobieństwem. Oblicz prawdopodobieństwo wygranej w zależności od n i r.
   c) Dla $n = 100$ porównaj sytuacje $r = 1$ i $r = 98$. W której z nich zmiana wyboru daje większą szansę wygranej?

Lista 2. Prawdopodobieństwo klasyczne

Zadania na ćwiczenia 15.10.2026

1. W pudełku jest 6 śrubek dobrych i 2 złe. Jaka jest szansa, że przy wyborze 4 śrubek wybierze się 3 dobre i 1 złą?
2. Na szachownicy o wymiarach $n \times n$ umieszczono 8 nierozróżnialnych wież, w taki sposób aby żadne dwie się nie biły. Na ile sposobów można to zrobić? Jak zmieni się wynik, gdy wieże będą rozróżnialne?
3. Na ile sposobów można rozmieścić n kul w k urnach jeżeli:

   a. kule są rozróżnialne,
   b. kule są nierozróżnialne.

4. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że w potasowanej talii 52 kart wszystkie cztery asy znajdują się koło siebie.
5. W klasie jest 15 uczniów. Na każdej lekcji odpytywany jest losowo jeden z nich. Oblicz prawdopodobieństwo, że podczas 16 lekcji zostanie przepytany każdy z nich.
6. Grupa składająca się z $2n$ pań i $2n$ panów została podzielona na dwie równoliczne grupy. Znaleźć prawdopodobieństwo, że każda z tych grup składa się z takiej samej liczby pań i panów. Przybliżyć to prawdopodobieństwo za pomocą wzoru Stirlinga.
7. Uzasadnij, że dla dowolnego n i dowolnego j,

$$\binom{n}{j} + \binom{n}{j+1} = \binom{n}{j+1}.$$

   Czy potrafisz to zrobić bez wykonywania obliczeń? Zsumuj

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{n+k}{j}$$

   gdzie $m, n, j \in \mathbb{N}$ są liczbami naturalnymi. Zapisz k^2 jako $a_2\binom{k}{2}+a_1\binom{k}{1}+a_0\binom{k}{0}$. Wykorzystaj to do policzenia $\sum_{k=0}^{n} k^2$

8. Wachlarzem rzędu n nazywamy graf o wierzchołkach $\{0, 1, \ldots, n\}$ z $2n-1$ krawędziami zdefiniowanymi następująco: wierzchołek 0 połączony jest krawędzią z każdym z pozostałych wierzchołków i wierzchołek k połączony jest krawędzią z wierzchołkiem $k+1$ dla każdego $1 \leq k < n$. Przyjmując $S_0 = 0$, ile wynosi S_n liczba drzew rozpinających na takim grafie? Drzewem rozpinającym nazywamy spójny podgraf bez cykli zawierający wszystkie wierzchołki. Dla przykładu wachlarz rzędu 5 wygląda następująco