Titre

Roman Delgado

Université Pierre et Marie Curie

04/05/2016

Introduction

Motivation

- A
- B
- C

Objectif

- E
- F
- G

Le λ -calcul non typé

Présentation formelle

Un programme

$$(\lambda x (\lambda y (x y))$$

Syntaxe

$$\begin{array}{cccc} t & ::= & & (\lambda\text{-terme}) \\ & | & \chi & (\text{variable}) \\ & | & \lambda x \ t & (\text{abstraction}) \\ & | & (t \ t) & (\text{application}) \end{array}$$

Le λ -calcul non typé

Réduction et évaluation

Réduction

$$\lambda x \times t \rightsquigarrow x[x := t] \rightsquigarrow t$$

Évaluation

Trace de le xecution de le valuation dans le programme avec commande trace dans utopose de la valuation de l

Le λ -calcul non typé

Extensions

Addition

$$x + y = (\lambda x (\lambda y (iter x (\lambda n (succ n)) y)))$$

Les booléens

- true
- false
- if c then t else u

Les entiers

- zero
- Succ
- iter n f a

Motivations

$$f = (lambda \times (lambda y (ifte \times (succ y) y)))$$

f true
$$3 \rightarrow 4$$

f 3 true
$$\rightarrow$$

Peut-on rejeter ce programme à la compilation?

Règles de typage bidirectionnelles

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} (VAR) \\ x: T \in \Gamma \\ \hline \Gamma \vdash x \in T \end{array} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} (VAR) \\ x: T \in \Gamma \\ \hline \Gamma \vdash x \in T \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} (ABS) \\ T = A \rightarrow B \quad \Gamma, x: A \vdash B \ni t \\ \hline \Gamma \vdash T \ni \lambda x \ t \end{array} \qquad \begin{array}{c} (APP) \\ \hline \Gamma \vdash f \in A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash A \ni s \\ \hline \Gamma \vdash f \ s \in B \end{array} \\ \begin{array}{c} (ANN) \\ \hline \Gamma \vdash T \ni t \\ \hline \Gamma \vdash T \ni t \end{array} \\ \begin{array}{c} \Gamma \vdash T \ni t \\ \hline \Gamma \vdash (t:T) \in T \end{array} \end{array}$$

Exemple de dérivation de typage

$$\varnothing \vdash \mathsf{bool} \to \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda x \, \lambda y \, \mathsf{if} \, x \, \mathsf{then} \, \mathsf{succ} \, y \, \mathsf{else} \, y$$

Exemple de dérivation de typage

 $\Gamma \triangleq x$: bool

Exemple de dérivation de typage

$$\frac{\Delta \vdash \mathsf{int} \ni \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}{\Gamma \vdash \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}$$
$$\varnothing \vdash \mathsf{bool} \to \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda x \ \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y$$

 $\Gamma \triangleq x$: bool

 $\Delta \triangleq \Gamma, y : \mathsf{int}$

Exemple de dérivation de typage

$$\frac{y: \mathsf{int} \in \Delta}{\Delta \vdash \mathsf{bool} \ni x} \frac{y: \mathsf{int} \in \Delta}{\Delta \vdash y \in \mathsf{int}} \frac{\Delta \vdash \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}{\Delta \vdash \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}$$

$$\frac{\Delta \vdash \mathsf{int} \ni \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}{\Gamma \vdash \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}$$

$$\varnothing \vdash \mathsf{bool} \to \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda x \ \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y$$

$$\Gamma \triangleq x$$
: bool

$$\Delta \triangleq \Gamma, y : \mathsf{int}$$

Exemple de dérivation de typage

$$\frac{x : \mathsf{bool} \in \Delta}{\Delta \vdash \mathsf{bool} \ni x} \qquad \frac{\Delta \vdash y \in \mathsf{int}}{\Delta \vdash \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}$$

$$\frac{\Delta \vdash \mathsf{int} \ni \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}{\Gamma \vdash \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}$$

$$\varnothing \vdash \mathsf{bool} \to \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda x \ \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y$$

 $\Gamma \triangleq x$: bool

Exemple de dérivation de typage

$$\Gamma \triangleq x$$
: bool

$$\Delta \triangleq \Gamma, y : \mathsf{int}$$



Slide avec exemple du "et" logique entre deux vecteurs dans un stystème de type simple

Peut-on garantir la taille des listes à la compilation?

Règles de typage bi-directionnel

$$\Gamma \vdash T \ni in$$

$$\frac{\Gamma \vdash t \in T' \ T = T'}{\Gamma \vdash T \ni inv(t)} (Inv)$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash * \ni *} (\mathsf{Star})$$

$$\frac{\Gamma \vdash * \ni S \ \Gamma, x : S \vdash * \ni T}{\Gamma \vdash * \ni \forall x : S . T} (Pi)$$

$$\frac{\Gamma, x : S \vdash T \ni t}{\Gamma \vdash \forall x : S . T \ni \lambda x . t} (\mathsf{Abs})$$

$$\Gamma \vdash ex \in T$$

$$\frac{x: T \in \Gamma}{\Gamma \vdash x \in T}(Var)$$

$$\frac{\Gamma \vdash * \ni T \ \Gamma \vdash T \ni t}{\Gamma \vdash (t:T) \in T}(Ann)$$

$$\frac{\Gamma \vdash f \in \forall x : S.T \quad \Gamma \vdash S \ni s}{\Gamma \vdash f \ s \in T[s := x]} (App)$$

Les vecteurs

Parler de l'exemple avec maintenant les types dépendants

Correspondance de Curry Howard

$$\varnothing \vdash \forall A : *(\forall a, b : A (id \ A \ a \ b \rightarrow id \ A \ b \ a)) \ni \lambda x \ \lambda y \text{ if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$$

 $\Gamma \triangleq x$: bool

Correspondance de Curry Howard

 $\Gamma \vdash \text{int} \rightarrow \text{int} \ni \lambda y \text{ if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$

 $\varnothing \vdash \forall A : *(\forall a, b : A (id \ A \ a \ b \rightarrow id \ A \ b \ a)) \ni \lambda x \ \lambda y \text{ if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$

 $\Gamma \triangleq x$: bool

Correspondance de Curry Howard

 $\Delta \vdash \text{int} \ni \text{if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$

 $\Gamma \vdash \text{int} \rightarrow \text{int} \ni \lambda y \text{ if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$

 $\varnothing \vdash \forall A : *(\forall a, b : A (id \ A \ a \ b \rightarrow id \ A \ b \ a)) \ni \lambda x \ \lambda y \text{ if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$

 $\Gamma \triangleq x$: bool

Correspondance de Curry Howard

$$\frac{\Delta \vdash \mathsf{bool} \ni x}{\Delta \vdash y \in \mathsf{int}} \frac{\Delta \vdash \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}{\Delta \vdash \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}$$

$$\frac{\Delta \vdash \mathsf{int} \ni \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}{\Gamma \vdash \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}$$

 $\varnothing \vdash \forall A : *(\forall a, b : A (id \ A \ a \ b \rightarrow id \ A \ b \ a)) \ni \lambda x \ \lambda y \text{ if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$

 $\Gamma \triangleq x$: bool

Correspondance de Curry Howard

$$\frac{x : \mathsf{bool} \in \Delta}{\Delta \vdash \mathsf{bool} \ni x} \qquad \frac{\Delta \vdash y \in \mathsf{int}}{\Delta \vdash \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}$$

$$\frac{\Delta \vdash \mathsf{int} \ni \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}{\Gamma \vdash \mathsf{int} \to \mathsf{int} \ni \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}$$

 $\varnothing \vdash \forall A : *(\forall a, b : A (id \ A \ a \ b \rightarrow id \ A \ b \ a)) \ni \lambda x \ \lambda y \text{ if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$

 $\Gamma \triangleq x$: bool

Correspondance de Curry Howard

```
\frac{y : \mathsf{int} \in \Delta}{\Delta \vdash \mathsf{bool} \ni x} \qquad \frac{y : \mathsf{int} \in \Delta}{\Delta \vdash \mathsf{y} \in \mathsf{int}} \qquad \frac{y : \mathsf{int} \in \Delta}{\Delta \vdash \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}
\frac{\Delta \vdash \mathsf{int} \ni \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \in \mathsf{int}}{\Delta \vdash \mathsf{int} \mapsto \mathsf{int} \ni \lambda y \ \mathsf{if} \ x \ \mathsf{then} \ \mathsf{succ} \ y \ \mathsf{else} \ y}
```

 $\varnothing \vdash \forall A : *(\forall a, b : A (id \ A \ a \ b \rightarrow id \ A \ b \ a)) \ni \lambda x \ \lambda y \text{ if } x \text{ then succ } y \text{ else } y$

 $\Gamma \triangleq x : bool$ $\Delta \triangleq \Gamma, y : int$

Conclusion

Résumé

- A
- B
- C

Extensions

- A
- B
- C
- Slow.fast typechecker
- Tactics
- Proofs & complexity
- Untyped reduction : Krivine machine
- Rational bidirectionalisation

Autre titre

Foo.

$$\Gamma \vdash \lambda x \ \lambda y \ x \ y : (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{bool}$$

$$\Delta \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$$

$$E \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}, y : \mathsf{int}$$

$$\Delta \vdash \lambda y \times y : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$$

 $\Gamma \vdash \lambda x \ \lambda y \ x \ y : (\mathsf{int} \to \mathsf{bool}) \to \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$

$$\Delta \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$$

$$E \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}, y : \mathsf{int}$$

 $E \vdash x y$: bool

 $\Delta \vdash \lambda y \times y : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$

 $\Gamma \vdash \lambda x \ \lambda y \ x \ y : (\mathsf{int} \to \mathsf{bool}) \to \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$

 $\Delta \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$

 $E \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}, y : \mathsf{int}$

$$\frac{\overline{E \vdash x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}} \quad \overline{E \vdash y : \mathsf{int}}}{E \vdash x y : \mathsf{bool}}$$

$$\frac{\Delta \vdash \lambda y \times y : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}}{\Delta \vdash \lambda x \lambda y \times y : (\mathsf{int} \to \mathsf{bool}) \to \mathsf{int} \to \mathsf{bool}}$$

$$\Delta \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$$

 $E \triangleq \Gamma, x : \text{int} \rightarrow \text{bool}, y : \text{int}$

$$\frac{x: \mathsf{int} \to \mathsf{bool} \in E}{E \vdash x: \mathsf{int} \to \mathsf{bool}} \frac{E \vdash y: \mathsf{int}}{E \vdash x : \mathsf{int}}$$

$$\frac{E \vdash x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}}{\Delta \vdash \lambda y \times y: \mathsf{int} \to \mathsf{bool}}$$

$$\Gamma \vdash \lambda x \lambda y \times y: (\mathsf{int} \to \mathsf{bool}) \to \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$$

$$\Delta \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$$

$$E \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}, y : \mathsf{int}$$

$$\frac{x: \mathsf{int} \to \mathsf{bool} \in E}{E \vdash x: \mathsf{int} \to \mathsf{bool}} \qquad \frac{y: \mathsf{int} \in E}{E \vdash y: \mathsf{int}}$$

$$\frac{E \vdash x \ y: \mathsf{bool}}{\Delta \vdash \lambda y \ x \ y: \mathsf{int} \to \mathsf{bool}}$$

$$\Gamma \vdash \lambda x \ \lambda y \ x \ y: (\mathsf{int} \to \mathsf{bool}) \to \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$$

$$\Delta \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}$$

$$E \triangleq \Gamma, x : \mathsf{int} \to \mathsf{bool}, y : \mathsf{int}$$

(Backup slides)

. . .