

INTRODUCTION À LA THEORIE DES PROBABILITÉS

①

Il existe 2 sciences du hasard qui font partie intégrante des mathématiques:

- * la statistique: l'étude d'un phénomène par la collecte de données, leur analyse, l'interprétation des résultats et leur diffusion afin de rendre ces données accessibles à tous.
- * la théorie des probabilités qui étudie des phénomènes caractérisés par le hasard et l'incertitude.

LES ESPACES PROBABILISÉS

I) étude d'une expérience aléatoire:

- c'est une expérience renouvelable plusieurs fois dans des circonstances identiques.
- cette expérience donne des résultats différents à chaque fois qu'on la répète et, ceci, de manière imprévisible.

ex: lancer d'une pièce

lancer d'un dé

temps passé à attendre le bus

nombre de jours d'utilisation d'une carte de crédit par une imprimante

II) Les espaces probabilisés:

C'est un triplet (Ω, \mathcal{A}, P) qui va permettre la modélisation quantitative de l'expérience aléatoire étudiée.

1) Ω :

C'est l'ensemble des possibles (l'ensemble des résultats possibles de l'expérience)

ex: lancer d'une pièce: $\Omega = \{p, f\}$

lancer d'un dé: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

temps passé à attendre le bus: $\Omega = [0, a]$

nombre de jours d'utilisation d'une carte de crédit par une imprimante: $\Omega = \{1, 2\}$

↗ dénombrable

↗ non dénombrable

↗ dénombrable

2) Ω est l'ensemble d'événements:

(2)

2-1) 1 événement:

def: * C est 1 sous-ensemble de Ω

* C est donc 1 ensemble dont les éléments sont des résultats possibles de Ω .

ex: lancer d'1 pièce: $A = \{p\}$ événement "face pile"

lancer d'1 dé: $A = \{2, 4, 6\}$ événement "obtenir 1 résultat pair"

\emptyset = événement impossible

$A \cup B$: l'événement A ou l'événement B se produit

$A \cap B$: les événements A et B se produisent

\bar{A} : (complémentaire de A) l'événement A ne se produit pas

appel: les règles vues en mathématiques concernant les ensembles s'appliquent aux événements.

Ex particulier: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

définition d'1 système complet d'événements: $(A_i)_{i \geq 1}$ ensemble d'événements tels que: $\bigcup_{i \geq 1} A_i = \Omega$

et si $i \neq j$ alors $A_i \cap A_j = \emptyset$

C est 1 partition de Ω .

ex: lancer d'1 pièce: $A_1 = \{p\}$ et $A_2 = \{f\}$ sont 1 système complet d'événements sur $\{p, f\}$

lancer d'1 dé: $A_i = \{i\}$ pour $i = 1, \dots, 6$ forment aussi 1 système complet d'événements sur $\{1, \dots, 6\}$

2-2) A est 1 tribu sur Ω :

c'est 1 famille de parties de Ω vérifiant 3 propriétés:

déf: $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ est 1 tribu si:

① $\Omega \in A$

② pour toute suite $(A_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de A , on a: $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in A$

③ si $A \in A$ alors: $\bar{A} \in A$

ex: * $A = \{\emptyset; \Omega\}$ est toujours 1 tribu sur Ω

* lancer d'1 pièce: $A = \{\emptyset; \{p; f\}; \{p\}; \{f\}\}$

* lancer d'1 dé: $A = \{\emptyset; \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}; \{1, 2, 3, 4\}; \{5, 6\}\}$

exercice: Soit A 1 tribu sur Ω et E , 1 partie de Ω

montrer que: $F = \{A \cap E \text{ tel que: } A \in A\}$ est 1 tribu sur E

résolution:

① on veut montrer que: $E \in F$?

A étant 1 tribu, $\Omega \in A$

or: $E = E \cap \Omega$ donc: $E \in F$

② Soit $(B_n)_{n \geq 1}$, 1 suite d'éléments de F , on veut montrer que: $\bigcup_{n \geq 1} B_n \in F$?

est $n \geq 1$, $B_n \in F$ donc: $B_n = A_n \cap E$ avec: $A_n \in A$

d'où: $\bigcup_{n \geq 1} B_n = \bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap E)$

$= \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \right) \cap E$ [propriété des ensembles]

or: $(A_n)_{n \geq 1}$ est 1 suite d'éléments de A donc: $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in A$

soit on pose: $C = \bigcup_{n \geq 1} A_n$

$\bigcup_{n \geq 1} B_n = C \cap E$ avec $C \in A$ donc: $\bigcup_{n \geq 1} B_n \in F$

③ Soit $F \in \mathcal{F}$, a-t-on : $\bar{F} \in \mathcal{F}$? [complémentaire dans E]

④

$F \in \mathcal{F}$ donc : $\exists A \in \mathcal{A}$ tel que : $F = A \cap E$

$$\begin{aligned}\bar{F} &= \overline{A \cap E} = \bar{A} \cup \bar{E} = \{x \in E \mid x \notin A\} \cup \underbrace{\{x \in E \mid x \notin E\}}_{\emptyset} \\ &= \{x \in E \mid x \notin A\} \cup \emptyset \\ &= E \cap \bar{A}\end{aligned}$$

or : $\bar{A} \in \mathcal{A}$

donc : $\bar{F} \in \mathcal{F}$

3) \mathbb{P} : probabilité sur $(\Omega; \mathcal{A})$

On veut calculer la probabilité d'un événement de \mathcal{A}

déf : 3 propriétés doivent être vérifiées :

① $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0; 1]$

② $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

③ $\forall (A_n)_{n \geq 1}$ sont des éléments de \mathcal{A} , 2 à 2 disjoints

alors : $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n)$

ex : * lancer d'une pièce : $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0; 1]$

$$A \mapsto \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{card}(A)}{2} \text{ est } \underline{\text{1 probabilité sur } (\Omega; \mathcal{A})}$$

avec : $\Omega = \{p, f\}$ et $\mathcal{A} = \{\emptyset; \{p, f\}; \{p\}; \{f\}\}$

on a : $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

$$\mathbb{P}(\{p, f\}) = \frac{\text{card}(\{p, f\})}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\mathbb{P}(\{p\}) = \frac{\text{card}(\{p\})}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(\{f\}) = \frac{\text{card}(\{f\})}{2} = \frac{1}{2}$$

propriétés:

① $\forall A \in \mathcal{A}, P(A) + P(\bar{A}) = 1$

démo: $\Omega = A \cup \bar{A}$

donc: $P(\Omega) = P(A \cup \bar{A})$
 $= P(A) + P(\bar{A})$ [prop ③ de la définition]

or: $P(\Omega) = 1$ [prop ② de la définition]

donc: $1 = P(A) + P(\bar{A})$

② $\forall A \in \mathcal{A}, P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

démo: $A \cup B = A \cup (B \cap \bar{A})$

donc: $P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap \bar{A})$ (1)

or: $B = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A})$ [union disjointe]

donc: $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$ d'où: $P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(B \cap A)$

on remplace dans (1):

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

③ soient A et B dans \mathcal{A} , si $A \subset B$ alors: $P(A) \leq P(B)$:

démo: soient A et B dans \mathcal{A} tels que: $A \subset B$

$B = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A})$

donc: $B = A \cup (B \cap \bar{A})$

d'où: $P(B) = P(A \cup (B \cap \bar{A}))$ [union disjointe]
 $= P(A) + P(B \cap \bar{A})$

or: $P(B \cap \bar{A}) \geq 0$

donc: $P(B) \geq P(A)$

④ Formule des probabilités totales:

où $(A_i)_{i \geq 1}$ est 1 système complet d'événements de A

alors: $\forall B \in A, P(B) = \sum_{i \geq 1} P(B \cap A_i)$

dém: Soit $B \in A$

$$\begin{aligned} B &= B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i \geq 1} A_i \right) \\ &= \bigcup_{i \geq 1} (B \cap A_i) \end{aligned}$$

on pose $(B_i)_{i \geq 1} = (B \cap A_i)_{i \geq 1}$

on a: $\left\{ \begin{aligned} \forall i \geq 1, B_i &\in A \text{ car: } B \in A \text{ et } A_i \in A \\ \text{et: pour } i \neq j, B_i \cap B_j &= (B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = \emptyset \text{ car: } A_i \cap A_j = \emptyset \end{aligned} \right.$

d'où: $(B_i)_{i \geq 1}$ est 1 suite d'événements de A , 2 à 2 disjoints

d'où: $P\left(\bigcup_{i \geq 1} B_i\right) = \sum_{i \geq 1} P(B_i) = \sum_{i \geq 1} P(B \cap A_i)$ [pp ③ de la probabilité]

4) Le concept de probabilité conditionnelle :

(7)

C'est la probabilité qu'un événement sachant qu'un autre événement a eu lieu.

*déf: Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 1 espace probabilisé

et 2 événements E_1 et E_2 avec $\mathbb{P}(E_2) \neq 0$

on appelle probabilité de E_1 sachant que E_2 est réalisé $\mathbb{P}(E_1 | E_2) = \frac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_2)}$

on note aussi $\mathbb{P}_{E_2}(E_1)$

ex: Je prends les 4 as d'un jeu de cartes (pique, cœur, carreau, trèfle) et je retourne les cartes sur la table (faces invisibles). Je demande à 1 participant (ou 1 participante) à la préparation un concours d'attaché de cette année d'en choisir une.

Soient les événements : E_1 = "la carte est l'as de cœur"

E_2 = "la carte est de couleur rouge" (c'est donc l'as de cœur ou l'as de carreau)

on a : $\mathbb{P}(E_1) = \frac{1}{4}$

$$\mathbb{P}(E_2) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1) = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_1 | E_2) &= \frac{1}{2} \left(\text{intuitivement: 1 chance sur 2 qu'il soit l'as de cœur sachant que la carte est rouge} \right) \\ &= \frac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathbb{P}(E_2)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \left(\text{d'après la formule de la probabilité conditionnelle} \right). \end{aligned}$$

*Def: Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 1 espace probabilisé et $F \in \mathcal{F}$ 1 événement réalisable, la fonction

$$\mathbb{P}(\cdot | F) : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$E \mapsto \mathbb{P}(E | F)$$

est 1 mesure de probabilité

dém:

$$\textcircled{1} \text{ Soit } E \in \mathcal{A}, P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

$$\text{a: } P(E \cap F) \geq 0 \text{ et } P(F) > 0 \text{ donc: } P(E|F) \geq 0$$

$$\text{d: } P(E \cap F) \leq P(F) \Rightarrow \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \leq 1 \text{ donc: } P(E|F) \leq 1$$

$$\text{d'au: } \underline{P(E|F) \in [0, 1]}$$

$$\textcircled{2} \underline{P(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F)}{P(F)} = 1}$$

$$\textcircled{3} \text{ Soient } (A_n)_{n \geq 1} \text{ des éléments 2 à 2 disjoints de } \mathcal{A}$$

$$P\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \mid F\right) = \frac{P\left(F \cap \left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right)\right)}{P(F)} = \frac{P\left(\bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap F)\right)}{P(F)}$$

$$\text{Soit } (B_n)_{n \geq 1} \text{ tq: } B_n = A_n \cap F$$

les $(B_n)_{n \geq 1}$ sont des éléments de \mathcal{A} 2 à 2 disjoints

$$\text{donc: } P\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) = \sum_{n \geq 1} P(B_n)$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap F)\right) = \sum_{n \geq 1} P(A_n \cap F)$$

$$\Rightarrow \frac{P\left(\bigcup_{n \geq 1} (A_n \cap F)\right)}{P(F)} = \sum_{n \geq 1} \frac{P(A_n \cap F)}{P(F)} = \sum_{n \geq 1} P(A_n | F)$$

$$\text{d'au: } \underline{P\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n \mid F\right) = \sum_{n \geq 1} P(A_n | F)}$$

$P(\cdot | F)$ est bien 1 mesure de probabilité sur (Ω, \mathcal{A})

* formule des probabilités totales:

Soit (Ω, \mathcal{A}, P) 1 espace probabilisé et $(F_i)_{i \geq 1}$ 1 système complet d'événements

alors: pour tout événement E de \mathcal{A}

$$P(E) = \sum_{i \geq 1} P(E | F_i) \times P(F_i)$$

démo: soit $E \in \mathcal{A}$

$(F_i)_{i \geq 1}$ étant 1 système complet d'événements, on a:

$$P(E) = \sum_{i \geq 1} P(E \cap F_i)$$

Soit $i \geq 1$, étant donné que $F_i \neq \emptyset$, on a: $P(F_i) \neq 0$

$$\text{donc: } P(E \cap F_i) = P(E|F_i) \times P(F_i)$$

on en déduit que: $\sum_{i \geq 1} P(E \cap F_i) = \sum_{i \geq 1} P(E|F_i) \times P(F_i)$

d'où: $P(E) = \sum_{i \geq 1} P(E|F_i) \times P(F_i)$

* 1^{er} th de Bayes:

Soit (Ω, \mathcal{A}, P) 1 espace probabilisé et E et F , 2 événements réalisables de \mathcal{A}

$$P(E|F) = \frac{P(F|E) \times P(E)}{P(F)}$$

démo: $P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$

on: $P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)}$ donc: $P(E \cap F) = P(F|E) \times P(E)$

d'où: $P(E|F) = \frac{P(F|E) \times P(E)}{P(F)}$

* 2nd th de Bayes:

Soit (Ω, \mathcal{A}, P) 1 espace probabilisé, $F \in \mathcal{A}$ 1 événement réalisable et $(E_i)_{i \geq 1} \subset \mathcal{A}$ 1 système complet d'événements

$$\forall i \geq 1, P(E_i|F) = \frac{P(F|E_i) \times P(E_i)}{\sum_{j \geq 1} P(F|E_j) \times P(E_j)}$$

démo: Soit $i \geq 1$,

$$P(E_i|F) = \frac{P(F|E_i) \times P(E_i)}{P(F)} \text{ d'après le 1^{er} th de Bayes}$$

$$P(F) = \sum_{j \geq 1} P(F|E_j) \times P(E_j) \text{ d'après la formule des probabilités totales}$$

donc: $P(E_i|F) = \frac{P(F|E_i) \times P(E_i)}{\sum_{j \geq 1} P(F|E_j) \times P(E_j)}$

5) l'indépendance :

On dit que 2 événements sont indépendants si la réalisation (ou la non-réalisation) de l'un n'influence pas la réalisation de l'autre.

* déf. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ 1 espace probabilisé, soient E et F 2 événements de \mathcal{A} .

E et F sont indépendants $\Leftrightarrow \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(E) \times \mathbb{P}(F)$

* Th. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ 1 espace probabilisé, soient E et F 2 événements réalisables de \mathcal{A}

(i) E et F sont indépendants

(ii) $\mathbb{P}(E|F) = \mathbb{P}(E)$

(iii) $\mathbb{P}(F|E) = \mathbb{P}(F)$

ont 3 propositions équivalentes

dém.

* (i) \Rightarrow (ii) ?

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E|F) &= \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \frac{\mathbb{P}(E) \times \mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(F)} \quad \text{car } E \text{ et } F \text{ sont indépendants d'après (i)} \\ &= \mathbb{P}(E) \end{aligned}$$

donc (ii) est bien vérifiée

* (ii) \Rightarrow (iii) ?

$$\mathbb{P}(F|E) = \frac{\mathbb{P}(E|F) \times \mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(E)} \quad \text{d'après le th de Bayes}$$

or : $\mathbb{P}(E|F) = \mathbb{P}(E)$ d'après (ii)

$$\text{donc : } \mathbb{P}(F|E) = \frac{\mathbb{P}(E) \times \mathbb{P}(F)}{\mathbb{P}(E)} = \mathbb{P}(F)$$

donc : (iii) est bien vérifiée

* (iii) \Rightarrow (i) ?

$$\mathbb{P}(F|E) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(E)} \Rightarrow \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(F|E) \times \mathbb{P}(E)$$

or d'après (iii), $\mathbb{P}(F|E) = \mathbb{P}(F)$

$$\text{donc : } \mathbb{P}(E \cap F) = \mathbb{P}(F) \times \mathbb{P}(E)$$

donc : E et F sont indépendants

* déf: Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $(E_i)_{i=1, \dots, n}$, n éléments de \mathcal{A}

les événements $(E_i)_{i=1, \dots, n}$ sont indépendants $\Leftrightarrow \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} E_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(E_i), \forall I \subset \llbracket 1; n \rrbracket$

* prop: Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, 1 espace probabilisé et $(E_i)_{i=1, \dots, n}$ n événements de \mathcal{A} indépendants alors il sont indépendants 2 à 2

[simple quelle paire de ces événements est indépendante]

dém: Soient $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$ et $l \in \llbracket 1; n \rrbracket$ avec $k \neq l$

$$\text{on a: } \{k; l\} \subset \llbracket 1; n \rrbracket$$

$$\text{donc: } \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in \{k; l\}} E_i\right) = \prod_{i \in \{k; l\}} \mathbb{P}(E_i)$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(E_k \cap E_l) = \mathbb{P}(E_k) \times \mathbb{P}(E_l)$$

donc E_k et E_l sont indépendants

[appel: $\llbracket 1; n \rrbracket = \{1; 2; \dots; n\}$]

* contre-exemple: On lance 2 fois 1 pièce et on considère le résultat du lancer (pile ou face)

les événements: $P_1 =$ "j'obtiens pile au 1^{er} lancer"

$P_2 =$ "j'obtiens pile au 2^è lancer"

et: $I =$ "le résultat des 2 lancers est identique"

sont indépendants 2 à 2 mais pas indépendants.

Si on pose $\Omega = \{(P; P); (P; F); (F; P); (F; F)\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, et \mathbb{P} la probabilité uniforme

$$\text{on a: } P_1 = \{(P; P); (P; F)\}$$

$$P_2 = \{(P; P); (F; P)\}$$

$$I = \{(P; P); (F; F)\}$$

$$P_1 \cap P_2 = \{(P; P)\}$$

$$P_1 \cap I = \{(P; P)\}$$

$$P_2 \cap I = \{(P; P)\}$$

$$P_1 \cap P_2 \cap I = \{(P; P)\}$$

$$\mathbb{P}(P_1 \cap P_2) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(P_1) \times \mathbb{P}(P_2) \quad \text{mais } \mathbb{P}(P_1 \cap P_2 \cap I) = \frac{1}{4} \neq \mathbb{P}(P_1) \times \mathbb{P}(P_2) \times \mathbb{P}(I)$$

$$\mathbb{P}(P_1 \cap I) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(P_1) \times \mathbb{P}(I)$$

$$\mathbb{P}(P_2 \cap I) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(P_2) \times \mathbb{P}(I)$$