

On travaille dans E , 1 \mathbb{R} -espace vectoriel.

I) Les espaces euclidiens:

1) le produit scalaire sur E :

* déf. $\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est 1 produit scalaire sur E si:

① φ est bilinéaire:

①-1 $\forall (u, v, w) \in E^3, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \varphi(\lambda u + \mu v, w) = \lambda \varphi(u, w) + \mu \varphi(v, w)$ [linéaire à gauche]

①-2 $\forall (u, v, w) \in E^3, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \varphi(u, \lambda v + \mu w) = \lambda \varphi(u, v) + \mu \varphi(u, w)$ [linéaire à droite]

② φ est symétrique:

$$\forall (u, v) \in E^2, \varphi(u, v) = \varphi(v, u)$$

③ φ positive:

$$\forall u \in E, \varphi(u, u) \geq 0$$

④ φ est définie

$$\forall u \in E, \varphi(u, u) = 0 \Rightarrow u = 0_E$$

* remarques: il est souvent demandé de montrer qu'une application de $E \times E$ dans \mathbb{R} est 1 produit scalaire sur E

→ pour montrer la bilinéarité (1) et la symétrie (2) il vaut mieux:

② Montrer la symétrie

①-1 Montrer la linéarité à gauche

→ pour montrer la positivité (3) et la définition (4)

on peut montrer: $\forall x \in E \setminus \{0_E\}, \varphi(x, x) > 0$

* ex. $E = \mathbb{R}^n$

$$\varphi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto {}^t x y = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad \text{le produit scalaire usuel sur } \mathbb{R}^n \text{ (ou produit scalaire canonique)}$$

* pg 1 inégalité de Cauchy-Schwarz:

Soit E 1 espace vectoriel et φ 1 produit scalaire sur E

$$\forall (u, v) \in E^2, |\varphi(u, v)| \leq \sqrt{\varphi(u, u)} \sqrt{\varphi(v, v)}$$

dém: soit $(u,v) \in E^2$,

① Si $u = 0_E$ alors: $|\mathcal{Y}(u,v)| = |\mathcal{Y}(0_E, v)| = 0 = \sqrt{\mathcal{Y}(u,u)} \sqrt{\mathcal{Y}(v,v)}$

② Si $u \neq 0_E$ alors:

soit $x \in \mathbb{R}$, on déf: $\mathcal{P}(x) = \mathcal{Y}(xu+v; xu+v) = x^2 \mathcal{Y}(u,u) + 2x \mathcal{Y}(u,v) + \mathcal{Y}(v,v)$

$$\Delta = 4 \mathcal{Y}(u,v)^2 - 4 \mathcal{Y}(u,u) \mathcal{Y}(v,v) = 4 [\mathcal{Y}(u,v)^2 - \mathcal{Y}(u,u) \cdot \mathcal{Y}(v,v)]$$

or: $\mathcal{P}(x) \geq 0$ car le produit scalaire est 1 forme positive

donc: $\Delta \leq 0 \Leftrightarrow \mathcal{Y}(u,v)^2 - \mathcal{Y}(u,u) \cdot \mathcal{Y}(v,v) \leq 0$

$$\Leftrightarrow \mathcal{Y}(u,v)^2 \leq \mathcal{Y}(u,u) \cdot \mathcal{Y}(v,v)$$

$$\Leftrightarrow \underline{|\mathcal{Y}(u,v)| \leq \sqrt{\mathcal{Y}(u,u)} \sqrt{\mathcal{Y}(v,v)}}$$

* ex: $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, |\mathcal{Y}(x,y)| \leq \sqrt{\mathcal{Y}(x,x)} \sqrt{\mathcal{Y}(y,y)}$

$$\Leftrightarrow \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \text{ avec le produit scalaire canonique.}$$

* pp: égalité d'inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit (E, \mathcal{Y}) 1 espace préhilbertien réel et $(u,v) \in E^2$

alors: $|\mathcal{Y}(u,v)| = \sqrt{\mathcal{Y}(u,u)} \sqrt{\mathcal{Y}(v,v)} \Leftrightarrow u \text{ et } v \text{ sont liés}$

dém:

① si u et v sont liés:

$$\begin{aligned} v = \lambda u &\Rightarrow \underline{\mathcal{Y}(u,v) = \mathcal{Y}(u, \lambda u) = \lambda \mathcal{Y}(u,u) = \lambda \sqrt{\mathcal{Y}(u,u)} \cdot \sqrt{\mathcal{Y}(u,u)}} \\ &= \sqrt{\mathcal{Y}(u,u)} \cdot \sqrt{\lambda^2 \mathcal{Y}(u,u)} \\ &= \sqrt{\mathcal{Y}(u,u)} \cdot \sqrt{\mathcal{Y}(\lambda u, \lambda u)} \\ &= \underline{\sqrt{\mathcal{Y}(u,u)} \cdot \sqrt{\mathcal{Y}(v,v)}} \end{aligned}$$

② si $|\mathcal{Y}(u,v)| = \sqrt{\mathcal{Y}(u,u)} \sqrt{\mathcal{Y}(v,v)}$

alors $\mathcal{Y}(u,v)^2 = \mathcal{Y}(u,u) \cdot \mathcal{Y}(v,v)$ donc $\Delta = 0$

$\Rightarrow \mathcal{P}$ admet donc 1 racine double t

$$\mathcal{P}(t) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{Y}(tu+v; tu+v) = 0$$

$$\Leftrightarrow tu+v = 0_E \Leftrightarrow v = -tu$$

donc u et v sont liés

2) Espace de Hilbert et espace euclidien:

* déf 1: Si E est 1 \mathbb{R} -espace vectoriel et γ 1 produit scalaire sur E
alors (E, γ) est 1 espace préhilbertien réel.

* déf 2: Si, de plus, E est 1 espace vectoriel de dimension finie
alors (E, γ) est 1 espace euclidien.

II) Normes et distance sur E :

1) déf:

* déf d'1 norme: $\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ est 1 norme si:

- ① $\forall u \in E, \|u\| \geq 0$
- ② $\forall u \in E, \|u\| = 0 \Rightarrow u = 0_E$
- ③ $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$
- ④ $\forall (u, v) \in E^2, \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

* Ex de norme: $E = \mathbb{R}^2$

$$\| \cdot \| : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto |x| + |y|$$

* déf d'1 distance: $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$(x, y) \mapsto \|x - y\|$$

est la distance associée à la norme $\| \cdot \|$.

2) prop: des distances:

Th: si d est 1 distance sur E

- 1) $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) \geq 0$
- 2) $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$
- 3) $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = d(y, x)$
- 4) $\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

dém:

$$\begin{aligned} 4) \text{ Soit } (x, y, z) \in E^3, d(x, y) &= \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| \\ &\Rightarrow d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \end{aligned}$$

3) norme hilbertienne euclidienne:

*Th: Soit (E, \mathcal{Y}) 1 espace préhilbertien réel

par $u \in E$, on pose: $\|u\| = \sqrt{\mathcal{Y}(u, u)}$

$\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ est 1 norme sur E , c'est la norme sur E associée au produit scalaire \mathcal{Y} (on parle aussi de norme euclidienne)

dém:

① soit $u \in E$, $\|u\| = \sqrt{\mathcal{Y}(u, u)} \geq 0$

② soit $u \in E$, $\|u\| = 0 \Rightarrow \mathcal{Y}(u, u) = 0 \Rightarrow u = 0_E$

③ soit $u \in E$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda u\| = \sqrt{\mathcal{Y}(\lambda u, \lambda u)} = \sqrt{\lambda^2 \mathcal{Y}(u, u)} = |\lambda| \sqrt{\mathcal{Y}(u, u)} = |\lambda| \|u\|$

④ soit $(u, v) \in E^2$, $\|u+v\| = \sqrt{\mathcal{Y}(u+v, u+v)} = \left(\mathcal{Y}(u, u) + 2\mathcal{Y}(u, v) + \mathcal{Y}(v, v) \right)^{\frac{1}{2}}$

donc: $\|u+v\|^2 = \mathcal{Y}(u, u) + 2\mathcal{Y}(u, v) + \mathcal{Y}(v, v)$

$= \|u\|^2 + 2\mathcal{Y}(u, v) + \|v\|^2$

$\leq \|u\|^2 + 2|\mathcal{Y}(u, v)| + \|v\|^2$

$\leq \|u\|^2 + 2\sqrt{\mathcal{Y}(u, u)} \cdot \sqrt{\mathcal{Y}(v, v)} + \|v\|^2$ d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$= \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$

$\Rightarrow \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

*ex: Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire

alors la norme euclidienne sur (E, \mathcal{Y}) est:

$\| \cdot \| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$

$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto (\mathcal{Y}(u, u))^{\frac{1}{2}} = (u, u)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$

*Th de Pythagore: Soit (E, \mathcal{Y}) 1 espace préhilbertien réel

$\forall (u, v) \in E^2$, $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \Leftrightarrow \mathcal{Y}(u, v) = 0$

dém: soit $(u, v) \in E^2$, $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\mathcal{Y}(u, v) + \|v\|^2$

$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 = 0 \Leftrightarrow \mathcal{Y}(u, v) = 0$

III) Orthogonalité:1) déf:

* 2 vecteurs u et v sont orthogonaux si $\mathcal{Y}(u, v) = 0$

* Soit $A \subset E$, l'orthogonal de A noté $A^\perp = \{u \in E / \forall v \in A, \mathcal{Y}(u, v) = 0\}$

2) prop de l'orthogonal d'une partie de E :

- ① A^\perp est 1 sous-espace vectoriel de E
- ② $\{0_E\}^\perp = E$ et $E^\perp = \{0_E\}$
- ③ $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E), A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$

3) prop de l'orthogonal d'un sous-espace vectoriel de E :

Th: Soit (E, \mathcal{Y}) 1 espace préhilbertien réel et F 1 sous-espace vectoriel de E

alors: $F \cap F^\perp = \{0_E\}$

et: $F \subset (F^\perp)^\perp$

4) famille de vecteurs orthogonale et/ou orthonormale:

Soit $(e_i)_{i=1, \dots, I}$ 1 famille de I vecteurs de E .

* la famille $(e_i)_{i=1, \dots, I}$ est orthogonale $\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, \dots, I \rrbracket^2, i \neq j \Rightarrow \mathcal{Y}(e_i, e_j) = 0$

* la famille $(e_i)_{i=1, \dots, I}$ est orthonormale $\Leftrightarrow \forall (i, j) \in \llbracket 1, I \rrbracket^2, \mathcal{Y}(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

* remarque: 1 famille orthonormale est orthogonale

* Th: 1 famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre

démo: Soit $(e_i)_{i=1, \dots, I}$ 1 famille orthogonale de I vecteurs de E

Soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_I) \in \mathbb{R}^I$ tq: $\sum_{i=1}^I \lambda_i e_i = 0_E$

soit, $j \in \llbracket 1, I \rrbracket, \mathcal{Y}(e_j; \sum_{i=1}^I \lambda_i e_i) = 0$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^I \lambda_i \mathcal{Y}(e_j, e_i) = 0 \Rightarrow \lambda_j \mathcal{Y}(e_j, e_j) = 0$$

Étant donné que $e_j \neq 0_E$ on a: $\lambda_j = 0$

donc: $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_I = 0$

$(e_i)_{i=1, \dots, I}$ est 1 famille libre

(6)

* Th: 1 famille orthogonale est libre

* Ex: $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire, la base canonique est 1 famille orthogonale

4) base orthogonale:

* Th: Soit (E, \mathcal{P}) 1 espace euclidien

alors il existe une base orthogonale

* Th: Soit (E, \mathcal{P}) 1 espace euclidien de dimension n

et soit $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ 1 base orthogonale sur cet espace alors:

① coordonnées:

$$\forall u \in E, u = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(u, e_i) e_i$$

② produit scalaire:

$$\forall (u, v) \in E^2, \mathcal{P}(u, v) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(u, e_i) \mathcal{P}(v, e_i)$$

③ norme:

$$\forall u \in E, \|u\| = \left(\sum_{i=1}^n \mathcal{P}(u, e_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

dém:

① soit $u \in E$

$$u = \sum_{j=1}^n x_j e_j$$

$$\text{soit } i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \mathcal{P}(u, e_i) = \sum_{j=1}^n x_j \mathcal{P}(e_j, e_i) = x_i$$

$$\text{donc } u = \sum_{j=1}^n \mathcal{P}(u, e_j) e_j$$

② soit $(u, v) \in E^2$, $u = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $v = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

$$\mathcal{P}(u, v) = \mathcal{P}\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n x_i \mathcal{P}\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \mathcal{P}(e_i, e_i) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(u, e_i) \mathcal{P}(v, e_i)$$

d'après ①

③ soit $u \in E$,

$$\|u\|^2 = \mathcal{P}(u, u) = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\text{donc } \|u\| = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n \mathcal{P}(u, e_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

IV) projection orthogonale dans 1 espace euclidien:

1) orthogonal d'1 sous-espace d'1 espace euclidien:

* Th: Soit (E, \mathcal{G}) 1 espace euclidien et F 1 sous-espace vectoriel de E
alors: $E = F \oplus F^\perp$

* Th: Soit (E, \mathcal{G}) 1 espace euclidien et F 1 sous-espace vectoriel de E
alors: $(F^\perp)^\perp = F$

dém: $E = F^\perp \oplus (F^\perp)^\perp$

$$\text{donc: } \dim(F^{\perp\perp}) = \dim(E) - \dim(F^\perp) \\ = \dim(E) - (\dim(E) - \dim(F)) = \dim(F)$$

or: $F \subset F^{\perp\perp}$ dans tout espace préhilbertien réel.

$$\text{donc: } F^{\perp\perp} = F$$

2) projection orthogonale sur 1 vecteur u non nul:

* c'est l'application: $p_u: E \rightarrow \text{Vect}\{u\}$
$$x \mapsto \frac{\mathcal{G}(x, u)}{\mathcal{G}(u, u)} \cdot u$$

$p_u(x)$ est la projéction orthogonale de x sur le vecteur u

3) projection orthogonale sur 1 sous-espace F de E :

* Soit F 1 sous-espace de E muni d'1 base orthonormée $(e_i)_{i=1, \dots, k}$

$$p_F: E \rightarrow F \\ x \mapsto p_F(x) = \sum_{i=1}^k \mathcal{G}(x, e_i) e_i$$

On l'appelle aussi projection sur F parallèlement à F^\perp

* prop:

$$\textcircled{1} p_F \circ p_F = p_F$$

$$\textcircled{2} p_F \circ p_{F^\perp} = 0_E$$

$$\textcircled{3} p_F + p_{F^\perp} = Id_E$$

4) Comment obtenir 1 base?

8

Y a-t-il $(u_i)_{i=1, \dots, n}$ 1 famille libe de n vecteurs de E .

[Y a-t-il E est 1 espace euclidien de dimension n alors $(u_i)_{i=1, \dots, n}$ est 1 base de E]

alors la famille $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ définie par:

$$e_1 = u_1 \cdot \frac{1}{\|u_1\|}$$

$$\text{pour } k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, e_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \mathcal{Y}(u_{k+1}, e_i) e_i \cdot \frac{1}{\|u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \mathcal{Y}(u_{k+1}, e_i) e_i\|}$$

est 1 famille orthonormée de E

[Y a-t-il $(u_i)_{i=1, \dots, n}$ est 1 base de E alors $(e_i)_{i=1, \dots, k}$ est 1 base orthonormée de E]

c'est le procédé d'orthogonalisation de Schmidt.