

Planejamento e Análise de Experimentos (EEE933)

Estudo de Caso 1

Pedro Vinícius, Samara Silva e Savio Vieira

10 de Agosto de 2020

Introdução

Uma versão atual de um software conhecido apresenta uma distribuição dos custos de execução com média populacional $\mu_c = 50$ e variância populacional $\sigma_c^2 = 100$. Posteriormente, uma nova versão do software é desenvolvida, no qual deseja-se investigar prováveis melhorias de desempenho. Com esse intuito, duas análises estatísticas são propostas: (i) uma sobre o custo médio e (ii) uma sobre a variância do custo.

Para ambos os casos, as hipóteses nulas foram definidas de maneira conservadora, partindo-se do pressuposto de que os parâmetros populacionais conhecidos foram mantidos na nova versão. A partir disso, diversas etapas foram conduzidas até a conclusão dos experimentos, entre elas a coleta de dados da distribuição dos custos do software novo, a análise exploratória dessa amostra, a inferência por meio dos testes estatísticos, a validação das premissas consideradas e as conclusões. As próximas seções contém o detalhamento técnico de cada uma dessas etapas.

Parte 1: Teste Sobre o Custo Médio

Planejamento dos Experimentos

No que se refere a primeira parte do estudo de caso, o teste terá que dispor de um nível de significância $\alpha = 0.01$, um tamanho de efeito de mínima relevância $\delta^* = 4$ e uma potência desejada $\pi = 1 - \beta = 0.8$. As hipóteses estatísticas foram definidas com o intuito de responder às questões propostas abaixo:

- Há alguma diferença entre o custo médio da versão nova do software e o custo médio da versão corrente?
- Caso haja, qual a melhor versão em termos de custo médio?

Em concordância com a proposta de comparação de custo médio entre as versões, as hipóteses de teste podem ser formuladas sobre o parâmetro média:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_n = 50 \\ H_1 : \mu_n < 50 \end{cases}$$

onde a hipótese nula implica na igualdade entre os custos médios das versões e a hipótese alternativa unilateral na superioridade da nova versão em média.

A fase subsequente desse experimento consiste em gerar uma amostra representativa do desempenho da nova versão do software. Para tal fim, é necessário especificar o tamanho dessa amostra, considerando as propriedades preestabelecidas do teste. A priori, o Poder do Teste é bastante conveniente, porém implica em um grande dilema. O cálculo do tamanho amostral requer uma estimativa da variância, que só é obtida através das observações contidas na amostra. As possibilidades mais práticas de se conduzir o experimento nesse caso são [2]:

1. Utilização de conhecimento do problema para se obter uma estimativa (inicial) da variância;
2. Condução do estudo com um tamanho amostral predefinido, como $N = 30$, o que poderia violar a potência desejada;

3. Realização de um estudo piloto para estimar a variância dos dados a partir do tamanho de efeito de mínima relevância δ^* .

Considerando as vantagens e desvantagens de cada uma, optou-se por utilizar a primeira abordagem. Por mais que essa estimativa seja sobre-estimada e os prováveis ganhos não sejam observados ao término do estudo, uma vez que se espera ganhos de variância da nova versão do software em relação à versão atual, pode-se considerar igualdade de variâncias como uma estimativa inicial, ou seja, $\sigma_n^2 \approx \sigma_c^2 = 100$. Entretanto, essa premissa será avaliada posteriormente na análise exploratória dos dados.

Diante da estimativa inicial da variância amostral, o Poder do Teste pode ser finalmente realizado. Esse teste é originalmente usado para mensurar o controle do teste de hipóteses sobre o erro do tipo II (β), isto é, $P(\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é falso})$. No entanto, tal teste também pode ser utilizado para estimar outros parâmetros amostrais, como tamanho de efeito δ^* , nível de significância α , tamanho da amostra N , potência π e desvio padrão amostral σ_n [5]. No presente estudo, ele é utilizado para estimar o tamanho amostral N .

```
# Poder do Teste para estimar o tamanho amostral
(params <- power.t.test(delta = 4,
  sd = 10,
  sig.level = 0.01,
  power = 0.8,
  type = "one.sample",
  alternative = "one.sided"))
```

```
##
##      One-sample t test power calculation
##
##              n = 65.45847
##              delta = 4
##              sd = 10
##      sig.level = 0.01
##              power = 0.8
##      alternative = one.sided
```

```
N <- ceiling(params$n)
```

Assim, tem-se uma estimativa de $N = 66$ observações com o arredondamento superior.

Coleta dos Dados

O custo de execução do software novo é modelado por um algoritmo de Evolução Diferencial que faz uso de recombinação binomial, mutação aleatória e seleção elitista padrão para a minimização do *Shifted Sphere Problem*. Dessa forma, como cada observação é obtida por meio do módulo ExpDE [1], foram necessárias N execuções para construção da amostra. Os dados coletados foram salvos em um arquivo `.csv` com uma semente definida empiricamente `seed = 1007`. Uma vez que a amostra está fixa, as análises estatísticas da média e da variância poderão ser efetuadas sobre os mesmos dados.

```
data_generation <- function(n){
  mre <- list(name = "recombination_bin", cr = 0.9)
  mmu <- list(name = "mutation_rand", f = 2)
  mpo <- 100
  mse <- list(name = "selection_standard")
  mst <- list(names = "stop_maxeval", maxevals = 10000)
  mpr <- list(name = "sphere", xmin = -seq(1, 20), xmax = 20 + 5 * seq(5, 24))
```

```

sample <- c()
# Geração de N observações
for (i in 1:n){
  observation <- ExpDE(mpo, mmu, mre, mse, mst, mpr,
    showpars = list(show.itors = "none"))$Fbest
  sample <- c(sample, observation)
}

return(sample)
}

```

Análise Exploratória de Dados

Algumas primeiras propriedades da amostra, como média, mediana, valores extremos e variância, podem ser obtidas de imediato.

```

sample_statistics <- data.frame('Variância' = var(sample), 'Média' = mean(sample),
  'Mediana' = median(sample), 'Mínimo' = min(sample),
  'Máximo' = max(sample), 'Desvio' = sd(sample))

print(sample_statistics)

```

```

##  Variância  Média  Mediana  Mínimo  Máximo  Desvio
## 1    36.6344 49.63844 48.92703 38.76112 67.21031 6.052636

```

É importante ressaltar que a variância é significativamente menor que a considerada no cálculo do tamanho amostral N , assim, caso as premissas consideradas sejam válidas, a potência do teste será superior a desejada ($\pi > 0.8$).

Entretanto, a fim de compreender melhor os dados em estudo, algumas representações gráficas da amostra coletada serão investigadas. Inicialmente, faz-se o uso do histograma, que representa a distribuição de frequências das observações. O histograma é uma boa ferramenta de análise visual do comportamento de variáveis contínuas em geral, auxiliando no processo de visualização de características, como a média da amostra e a variação da distribuição em torno da mesma. Para a amostra em questão, o histograma mostra uma distribuição levemente inclinada à direita, que corrobora que a média é maior do que a moda, bem como sugere a presença de outliers com custos maiores que 60 (Figura 1).

```

histogram <- ggplot(data = as.data.frame(sample), mapping = aes(x = sample))
histogram + geom_histogram(lwd = 0.3, bins = 20, color = 'black', fill = 'gray') +
  scale_x_continuous(name = 'Custo de Execução') +
  scale_y_continuous(name = 'Frequência') +
  theme(axis.title = element_text(size = 8),
    axis.text = element_text(size = 8))

```




Figura 1: Histograma.

Posteriormente, o boxplot, também conhecido como gráfico de caixa, é considerado. Além de descrever simultaneamente várias propriedades importantes de um conjunto de dados, como centro, dispersão e desvio de simetria, ele também possibilita a identificação de valores atípicos [4]. Para a amostra em questão, foi possível reforçar a presença das observações em torno da mediana levemente inferior a 50 (segundo quartil). Outro aspecto importante é a presença de uma assimetria positiva na distribuição, uma vez que a mediana está mais próxima do primeiro do que do terceiro quartil. A diferença nos comprimentos das linhas que saem da caixa pressupõe novamente a cauda acentuada à direita (Figura 2).

```
boxplot <- ggplot(data = as.data.frame(sample), mapping = aes(y = sample))
boxplot + geom_boxplot(lwd = 0.3) +
  scale_x_continuous(name = '') +
  scale_y_continuous(name = 'Custo de Execução') +
  theme(axis.text.x = element_blank(), axis.title = element_text(size = 8),
        axis.text = element_text(size = 8))
```




Figura 2: Boxplot.

Por fim, um gráfico bastante utilizado em estatística é o quantil-quantil (*QQ-Plot*), cujo objetivo é verificar a adequação da distribuição de frequência dos dados à uma distribuição de probabilidades de interesse. Caso os dados tenham distribuições idênticas, uma linha reta com inclinação unitária é traçada. A densidade com que os pontos são representados indicam a frequência de ocorrência dos mesmos [3]. No presente trabalho, o gráfico Q-Q foi utilizado para comparar a distribuição dos custos de execução da nova versão do software com uma distribuição normal. Ao gerá-lo, é evidente que os dados não seguem um padrão linear e, portanto, não provém de uma distribuição normal (Figura 3).

```
qqplot <- ggplot(data = as.data.frame(sample), mapping = aes(sample = sample))
qqplot + geom_qq_line() +
  geom_qq() +
  scale_y_continuous(name = 'Quantis da Amostra') +
  scale_x_continuous(name = 'Quantis Teóricos Normais') +
  theme(axis.title = element_text(size = 8),
        axis.text = element_text(size = 8))
```




Figura 3: QQ-Plot.

Validação de Premissas

Devido à presumível falta de normalidade dos dados, o teste de Shapiro-Wilk foi feito para confirmação. A hipótese nula H_0 desse teste assume que a amostra veio de uma população com distribuição normal e para isso o parâmetro W é calculado e comparado com um valor de referência. Caso a resultante de W seja inferior ao valor tabelado, rejeita-se a hipótese de normalidade a um nível de significância α . A aplicação do teste gerou como resultado $W = 0.94772$ e o valor de $p = 0.00755$, que confirmam a não normalidade dos dados ($p < 0.05$).

```
(shapiro_test <- shapiro.test(x = sort(sample)))
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  sort(sample)
## W = 0.94772, p-value = 0.007555
```

Apesar disso, como o número de observações é suficientemente grande ($N = 66 \gg 30$), o Teorema do Limite Central pôde ser evocado para estimação da distribuição amostral das médias. Já a premissa de independência foi assumida no processo de coleta dos dados. No entanto, o teste de Durbin-Watson também caberia para avaliar uma possível autocorrelação nos resíduos.

Análise Estatística

A partir disso, pode-se realizar o Teste t de Student sem que suas premissas sejam violadas.

```
(t_test <- t.test(x = sample,
  mu = 50,
  alternative = "less",
  conf.level = 0.99))
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: sample
## t = -0.4853, df = 65, p-value = 0.3145
## alternative hypothesis: true mean is less than 50
## 99 percent confidence interval:
##      -Inf 51.4154
## sample estimates:
## mean of x
## 49.63844
```

```
cat('Intervalo de confiança:', t_test$conf.int[1:2])
```

```
## Intervalo de confiança: -Inf 51.4154
```

Como o valor p encontrado é maior que o nível de significância estabelecido ($0.3145 > 0.05$), conclui-se que a hipótese nula H_0 não pode ser rejeitada a um nível de confiança de 95%. No contexto do problema estudado e para as configurações de teste definidas, uma falha ao rejeitar a hipótese nula significa que não há evidências de que os desempenhos médios das duas versões do software sejam distintos e, portanto, trata-se de uma conclusão fraca. Além disso, dado que a hipótese alternativa H_1 é unilateral, tem-se um intervalo de confiança aberto à esquerda $[-\infty, 51.42]$.

Potência do Teste

Conforme relatado anteriormente, como a estimativa da variância amostral foi substancialmente superior à variância calculada sobre os dados, é bem provável que a potência do teste seja superior aos 80% utilizados para o cálculo do tamanho amostral N . Dessa forma, uma estimativa da potência para detecção de diferenças maiores ou iguais ao tamanho de efeito δ^* pode ser obtida pelo Poder do Teste, utilizando o desvio padrão amostral $\sigma = 6.05$, o tamanho amostral $N = 66$ e conservando as demais propriedades.

```
(params <- power.t.test(delta = 4,
  sd = sqrt(var(sample)),
  sig.level = 0.01,
  n = 66,
  type = "one.sample",
  alternative = "one.sided"))
```

```
##
## One-sample t test power calculation
##
##      n = 66
##      delta = 4
##      sd = 6.052636
##      sig.level = 0.01
##      power = 0.9982989
##      alternative = one.sided
```

```
cat('Potência obtida:', params$power)
```

```
## Potência obtida: 0.9982989
```

Em concordância com o que se esperava, a potência obtida $\pi = 0.9982$ é superior à desejada.

Outra perspectiva para esse caso é que, conseqüentemente, o número de observações na amostra foi sobre-estimado. Assim, uma estimativa para N capaz de garantir exatamente a potência desejada $\pi = 0.8$

pode ser obtida pelo Poder de Teste ao utilizar o desvio padrão amostral em conjunto com os demais parâmetros.

```
(params <- power.t.test(delta = 4,
  sd = sqrt(var(sample)),
  sig.level = 0.01,
  power = 0.8,
  type = "one.sample",
  alternative = "one.sided"))

##
##      One-sample t test power calculation
##
##              n = 25.752
##              delta = 4
##              sd = 6.052636
##      sig.level = 0.01
##      power = 0.8
##      alternative = one.sided

cat('Tamanho amostral:', ceiling(params$n))

## Tamanho amostral: 26
```

Ou seja, o tamanho amostral necessário para o experimento é de apenas 26 observações, 40 observações a menos do que foi utilizado na estimativa inicial.

Parte 2: Teste Sobre a Variância do Custo

Planejamento dos Experimentos

Em relação à segunda parte deste experimento, quanto a avaliação da melhora da variância, foi considerado como hipótese nula H_0 a asserção de que o valor de variância conhecido foi mantido e como hipótese alternativa a que este valor foi reduzido.

Existem vários testes estatísticos para comparação de variância, como o teste F, o teste de Bonett, o teste Chi-quadrado, o teste de Levene, dentre outros. Contudo, além das particularidades de cada um deles, os três primeiros são indicados para amostras normais. Tendo em vista que o TLC não é aplicável para o cálculo da variância, a opção recomendada é o uso de um teste não-paramétrico, como o teste de Levene, já que os dados não pertencem a uma distribuição normal.

O Teste de Levene tem como hipótese nula a proposição de que os grupos que estão sendo comparados têm variâncias iguais, enquanto que a hipótese alternativa é que pelo menos um par desses grupos não possui igualdade de variância. Entretanto, essa categorização que não comporta a situação em questão, visto que o intuito é a comparação da amostra da versão atual com o valor de referência da versão nova. Nesse âmbito, adequa-se o teste não-paramétrico que receba somente uma amostra e a compare em com variância populacional dada. Sendo assim, mesmo sendo indicado para dados não paramétricos, o teste de Levene não é apropriado para o problema em questão.

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_n^2 = 100 \\ H_1 : \sigma_n^2 < 100 \end{cases}$$

Conclusões

Referências

- [1] Felipe Campelo. Modular Differential Evolution for Experimenting with Operators. <https://www.rdocumentation.org/packages/ExpDE/versions/0.1.2>, 2016. Version 0.1.2.

- [2] Felipe Campelo. Lecture Notes on Design and Analysis of Experiments. <http://git.io/v3Kh8>, 2018. Version 2.12; Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
- [3] Ramanathan Gnanadesikan and Martin B Wilk. Probability Plotting Methods for the Analysis of Data. *Biometrika*, 55(1):1–17, 1968.
- [4] Douglas C Montgomery and George C Runger. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. John Wiley & Sons, 2010.
- [5] R Development Core Team. Power Calculations For One And Two Sample T Tests. <https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/power.t.test>, 2020. Documentation reproduced from package stats, version 3.6.2, License: Part of R 3.6.2.