

Matemática Discreta

Dirk Hofmann

Departamento de Matemática, Universidade de Aveiro
dirk@ua.pt, <http://sweet.ua.pt/dirk/aulas/>

Gabinete: 11.3.10

OT: Quinta, 14:00 – 15:00, Sala 11.2.24

Atendimento de dúvidas: Segunda, 13:30 – 14:30

Equações de Recorrência

Introdução

Torre de Hanói

O problema é



mover n discos de **origem** para **destino** com a ajuda de **auxiliar**, de modo que

Torre de Hanói

O problema é



mover n discos de **origem** para **destino** com a ajuda de **auxiliar**, de modo que

- apenas um disco poderia ser movido por vez, e
- um disco maior nunca pode ficar acima de um disco menor.

Torre de Hanói

O problema é



mover n discos de **origem** para **destino** com a ajuda de **auxiliar**, de modo que

- apenas um disco poderia ser movido por vez, e
- um disco maior nunca pode ficar acima de um disco menor.

A lenda diz que, num templo, havia uma torre com 64 discos de ouro e mais duas estacas equilibradas sobre uma plataforma. Os monges foram ordenados pelo “Brama” de mover todos os discos de uma estaca para outra. Segundo a lenda, quando todos os discos fossem transferidos de **origem** para **destino**, o mundo desapareceria.

O problema é



mover n discos de **origem** para **destino** com a ajuda de **auxiliar**, de modo que

- apenas um disco poderia ser movido por vez, e
- um disco maior nunca pode ficar acima de um disco menor.

A lenda diz que, num templo, havia uma torre com 64 discos de ouro e mais duas estacas equilibradas sobre uma plataforma. Os monges foram ordenados pelo “Brama” de mover todos os discos de uma estaca para outra. Segundo a lenda, quando todos os discos fossem transferidos de **origem** para **destino**, o mundo desapareceria.

Temos de preocupar-nós?

O problema é



mover n discos de **origem** para **destino** com a ajuda de **auxiliar**, de modo que

- apenas um disco poderia ser movido por vez, e
- um disco maior nunca pode ficar acima de um disco menor.

A lenda diz que, num templo, havia uma torre com 64 discos de ouro e mais duas estacas equilibradas sobre uma plataforma. Os monges foram ordenados pelo “Brama” de mover todos os discos de uma estaca para outra. Segundo a lenda, quando todos os discos fossem transferidos de **origem** para **destino**, o mundo desapareceria.

Temos de preocupar-nós? Vale a pena preparar o teste?

O problema é



mover n discos de **origem** para **destino** com a ajuda de **auxiliar**, de modo que

- apenas um disco poderia ser movido por vez, e
- um disco maior nunca pode ficar acima de um disco menor.

A lenda diz que, num templo, havia uma torre com 64 discos de ouro e mais duas estacas equilibradas sobre uma plataforma. Os monges foram ordenados pelo “Brama” de mover todos os discos de uma estaca para outra. Segundo a lenda, quando todos os discos fossem transferidos de **origem** para **destino**, o mundo desapareceria.

Temos de preocupar-nós? Vale a pena preparar o teste? (Sim!!)

Torre de Hanói

A questão



Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

Torre de Hanói

A questão



Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

A solução

É mais fácil pensar *recursivamente*:

Torre de Hanói

A questão



Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

A solução

É mais fácil pensar *recursivamente*:

- Se $n = 1$, basta mover o disco diretamente de **origem** para **destino**. Logo, $a_n = 1$.

Torre de Hanói

A questão



Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

A solução

É mais fácil pensar *recursivamente*:

- Se $n > 1$, então podemos

A questão




Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

A solução

É mais fácil pensar *recursivamente*:

- Se $n > 1$, então podemos
 - mover os $n - 1$ discos acima de **origem** para **auxiliar** utilizando **destino**, depois

A questão



Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

A solução

É mais fácil pensar *recursivamente*:

- Se $n > 1$, então podemos
 - mover os $n - 1$ discos acima de **origem** para **auxiliar** utilizando **destino**, depois
 - mover o último disco de **origem** para **destino**; depois

A questão



Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

A solução

É mais fácil pensar *recursivamente*:

- Se $n > 1$, então podemos
 - mover os $n - 1$ discos acima de **origem** para **auxiliar** utilizando **destino**, depois
 - mover o último disco de **origem** para **destino**; depois
 - mover os $n - 1$ discos de **auxiliar** para **destino** utilizando **origem**.

A questão



Para n discos (digamos, $n \geq 1$), denotamos por a_n o menor número de passos necessários. Então, $a_{64} = ??$

A solução

É mais fácil pensar *recursivamente*:

- Se $n > 1$, então podemos
 - mover os $n - 1$ discos acima de **origem** para **auxiliar** utilizando **destino**, depois
 - mover o último disco de **origem** para **destino**; depois
 - mover os $n - 1$ discos de **auxiliar** para **destino** utilizando **origem**.

$$\text{Logo, } a_n = a_{n-1} + 1 + a_{n-1} = 2a_{n-1} + 1.$$

Os números de Fibonacci

Os números

Os famosos números de Fibonacci^a

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

^aLeonardo Fibonacci ou Leonardo de Pisa (1170 – 1250), matemático italiano.

Os números de Fibonacci

Os números

Os famosos números de Fibonacci^a

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

são os termos da sucessão $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que começa com $F_0 = 1$ e $F_1 = 1$ e satisfaz a regra $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, para todo o $n \in \mathbb{N}$.

^aLeonardo Fibonacci ou Leonardo de Pisa (1170 – 1250), matemático italiano.

Os números de Fibonacci

Os números

Os famosos números de Fibonacci^a

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

são os termos da sucessão $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que começa com $F_0 = 1$ e $F_1 = 1$ e satisfaz a regra $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, para todo o $n \in \mathbb{N}$.

Embora os números de Fibonacci sejam completamente determinados pelos primeiros dois termos F_0 e F_1 , não é fácil calcular, por exemplo, $F_{312493741}$ porque, pela definição, é necessário calcular primeiro $F_{312493740}$ e $F_{312493739}$, para isso precisamos de $F_{312493738}$ e $F_{312493737}$, ... e assim até $F_2 = F_1 + F_0$.

^aLeonardo Fibonacci ou Leonardo de Pisa (1170 – 1250), matemático italiano.

Os números de Fibonacci

Os números

Os famosos números de Fibonacci^a

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

são os termos da sucessão $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que começa com $F_0 = 1$ e $F_1 = 1$ e satisfaz a regra $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, para todo o $n \in \mathbb{N}$.

Embora os números de Fibonacci sejam completamente determinados pelos primeiros dois termos F_0 e F_1 , não é fácil calcular, por exemplo, $F_{312493741}$ porque, pela definição, é necessário calcular primeiro $F_{312493740}$ e $F_{312493739}$, para isso precisamos de $F_{312493738}$ e $F_{312493737}$, ... e assim até $F_2 = F_1 + F_0$.

Estes números aparecem em muitos contextos

^aLeonardo Fibonacci ou Leonardo de Pisa (1170 – 1250), matemático italiano.

Os números de Fibonacci (exemplo I)

Uma população de coelhos (ver exercício 5 da folha 6)

Numa população de animais (digamos, de coelhos) há animais *adultos* (que podem ter descendentes) e animais *jovens* (que ainda não podem ter descendente). Suponhamos que depois de n meses temos A_n pares de coelhos adultos e J_n pares de coelhos jovens, e que cada par de coelhos adultos tem um par de descendentes (necessariamente jovem) no final do mês. Além disso, depois de um mês, um coelho jovem passa a ser um coelho adulto.

Começando com um par de coelhos jovens, qual é o número c_n de pares de coelhos no final do mês n ?

Os números de Fibonacci (exemplo I)

Uma população de coelhos (ver exercício 5 da folha 6)

Numa população de animais (digamos, de coelhos) há animais *adultos* (que podem ter descendentes) e animais *jovens* (que ainda não podem ter descendente). Suponhamos que depois de n meses temos A_n pares de coelhos adultos e J_n pares de coelhos jovens, e que cada par de coelhos adultos tem um par de descendentes (necessariamente jovem) no final do mês. Além disso, depois de um mês, um coelho jovem passa a ser um coelho adulto.

Começando com um par de coelhos jovens, qual é o número c_n de pares de coelhos no final do mês n ?

Por hipótese, $A_0 = 0$, $J_0 = 1$, $A_1 = 1$, $J_1 = 0$ e, para $n \geq 1$,

$$A_n = A_{n-1} + J_{n-1} \quad \text{e} \quad J_n = A_{n-1}.$$

Os números de Fibonacci (exemplo I)

Uma população de coelhos (ver exercício 5 da folha 6)

Numa população de animais (digamos, de coelhos) há animais *adultos* (que podem ter descendentes) e animais *jovens* (que ainda não podem ter descendente). Suponhamos que depois de n meses temos A_n pares de coelhos adultos e J_n pares de coelhos jovens, e que cada par de coelhos adultos tem um par de descendentes (necessariamente jovem) no final do mês. Além disso, depois de um mês, um coelho jovem passa a ser um coelho adulto.

Começando com um par de coelhos jovens, qual é o número c_n de pares de coelhos no final do mês n ?

Por hipótese, $A_0 = 0$, $J_0 = 1$, $A_1 = 1$, $J_1 = 0$ e, para $n \geq 1$,

$$A_n = A_{n-1} + J_{n-1} \quad \text{e} \quad J_n = A_{n-1}.$$

Portanto, para $n \geq 2$, $A_n = A_{n-1} + A_{n-2}$; e $c_n = A_n + J_n$ satisfaz

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 1, \quad c_n = c_{n-1} + c_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

Os números de Fibonacci (exemplo II)

Quadrados

Acrescentamos um quadrado no lado mais comprido. Qual é o comprimento de um lado do quadrado n ?

$$a_0 = 1,$$

$$a_1 = 1,$$

$$\vdots$$


Os números de Fibonacci (exemplo II)


Quadrados

Acrescentamos um quadrado no lado mais comprido. Qual é o comprimento de um lado do quadrado n ?

$$a_0 = 1,$$

$$a_1 = 1,$$

$$a_2 = 2,$$

$$\vdots$$


Os números de Fibonacci (exemplo II)

Quadrados

Acrescentamos um quadrado no lado mais comprido. Qual é o comprimento de um lado do quadrado n ?


$$a_0 = 1,$$

$$a_1 = 1,$$

$$a_2 = 2,$$


$$a_3 = 3,$$

\vdots



Os números de Fibonacci (exemplo II)

Quadrados



Acrescentamos um quadrado no lado mais comprido. Qual é o comprimento de um lado do quadrado n ?

$$a_0 = 1,$$

$$a_1 = 1,$$

$$a_2 = 2,$$


$$a_3 = 3,$$

$$a_4 = 5,$$

$$\vdots$$

Os números de Fibonacci (exemplo II)

Quadrados



Acrescentamos um quadrado no lado mais comprido. Qual é o comprimento de um lado do quadrado n ?

$$a_0 = 1,$$

$$a_1 = 1,$$

$$a_2 = 2,$$

$$a_3 = 3,$$

$$a_4 = 5,$$

$$\vdots$$

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

Exemplo

Quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?

Exemplo

Quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?

Se $n = 0$, então o número a_0 de ordens totais em \emptyset é $a_0 = 1$.

Exemplo

Quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?

Se $n = 0$, então o número a_0 de ordens totais em \emptyset é $a_0 = 1$.

As ordens totais em $\{1, 2, \dots, n, n + 1\}$ podemos obter de seguinte modo:

Exemplo

Quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?

Se $n = 0$, então o número a_0 de ordens totais em \emptyset é $a_0 = 1$.

As ordens totais em $\{1, 2, \dots, n, n+1\}$ podemos obter de seguinte modo:

- ordenamos primeiro $\{1, 2, \dots, n\}$, denotamos o número de maneiras por a_n ; depois

Exemplo

Quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?

Se $n = 0$, então o número a_0 de ordens totais em \emptyset é $a_0 = 1$.

As ordens totais em $\{1, 2, \dots, n, n + 1\}$ podemos obter de seguinte modo:

- ordenamos primeiro $\{1, 2, \dots, n\}$, denotamos o número de maneiras por a_n ; depois
- podemos inserir $n + 1$, aqui há $n + 1$ possibilidades.

Exemplo

Quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?

Se $n = 0$, então o número a_0 de ordens totais em \emptyset é $a_0 = 1$.

As ordens totais em $\{1, 2, \dots, n, n + 1\}$ podemos obter de seguinte modo:

- ordenamos primeiro $\{1, 2, \dots, n\}$, denotamos o número de maneiras por a_n ; depois
- podemos inserir $n + 1$, aqui há $n + 1$ possibilidades.

Pelo princípio da multiplicação, o número a_{n+1} de ordens totais em $\{1, 2, \dots, n, n + 1\}$ é

$$a_{n+1} = (n + 1)a_n.$$

- 1 Noções gerais
- 2 Equações de recorrência lineares
- 3 Equações de recorrência lineares homogêneas
- 4 Equações de recorrência lineares em geral
- 5 Equações de recorrência não lineares

Noções gerais

Equações de Recorrência

Definição

- Uma **equação de recorrência**^a é uma equação da forma

$$x_n = f(n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}), \quad (*)$$

com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq k$ (e $a_i \in \mathbb{R}$).

^aou relação de recorrência

Equações de Recorrência

Definição

- Uma **equação de recorrência** é uma equação da forma

$$x_n = f(n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}), \quad (*)$$

com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq k$ (e $a_i \in \mathbb{R}$).

- A equação de recorrência $(*)$ diz-se de **ordem** k ou que tem **profundidade** k (supondo que f depende da última variável).

Equações de Recorrência

Definição

- Uma **equação de recorrência** é uma equação da forma

$$x_n = f(n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}), \quad (*)$$

com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq k$ (e $a_i \in \mathbb{R}$).

- A equação de recorrência $(*)$ diz-se de **ordem** k ou que tem **profundidade** k (supondo que f depende da última variável).
- Uma sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diz-se **solução** de $(*)$ quando os seus termos satisfazem a equação $(*)$, para todo o $n \geq k$.

Equações de Recorrência

Definição

- Uma **equação de recorrência** é uma equação da forma

$$x_n = f(n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}), \quad (*)$$

com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq k$ (e $a_i \in \mathbb{R}$).

- A equação de recorrência (*) diz-se de **ordem** k ou que tem **profundidade** k (supondo que f depende da última variável).
- Uma sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diz-se **solução** de (*) quando os seus termos satisfazem a equação (*), para todo o $n \geq k$.

Nota

Resolver uma relação de recorrência significa determinar todas as suas soluções.

Equações de Recorrência

Definição

- Uma **equação de recorrência** é uma equação da forma

$$x_n = f(n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}), \quad (*)$$

com $n \in \mathbb{N}$, $n \geq k$ (e $a_i \in \mathbb{R}$).

- A equação de recorrência $(*)$ diz-se de **ordem** k ou que tem **profundidade** k (supondo que f depende da última variável).
- Uma sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diz-se **solução** de $(*)$ quando os seus termos satisfazem a equação $(*)$, para todo o $n \geq k$.

Nota

Resolver uma relação de recorrência significa determinar todas as suas soluções. Estamos particularmente interessados em descrever as soluções com *fórmulas fechadas*; ou seja, na forma

$a_n =$ “uma expressão que apenas envolve a variável n ”.

Exemplo

Voltamos à questão de “quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?”. Já observamos que o correspondentes números a_n satisfazem

$$a_0 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = (n+1)a_n.$$

Exemplo

Voltamos à questão de “quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?”. Já observamos que o correspondentes números a_n satisfazem

$$a_0 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = (n+1)a_n.$$

Então,

$$a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1, a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!, a_4 = 4 \cdot a_3 = 4!.$$

Exemplo

Voltamos à questão de “quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?”. Já observamos que o correspondentes números a_n satisfazem

$$a_0 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = (n+1)a_n.$$

Então,

$$a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1, a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!, a_4 = 4 \cdot a_3 = 4!.$$

Será $a_n = n!$, para cada $n \in \mathbb{N}$?

Exemplo

Voltamos à questão de “quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?”. Já observamos que o correspondentes números a_n satisfazem

$$a_0 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = (n+1)a_n.$$

Então,

$$a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1, a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!, a_4 = 4 \cdot a_3 = 4!.$$

Será $a_n = n!$, para cada $n \in \mathbb{N}$? Provamos esta conjectura por indução:

Exemplo

Voltamos à questão de “quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?”. Já observamos que o correspondentes números a_n satisfazem

$$a_0 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = (n+1)a_n.$$

Então,

$$a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1, a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!, a_4 = 4 \cdot a_3 = 4!.$$

Será $a_n = n!$, para cada $n \in \mathbb{N}$? Provamos esta conjectura por indução:

- Para $n = 0$: $a_0 = 1 = 1!$.

Exemplo

Voltamos à questão de “quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?”. Já observamos que o correspondentes números a_n satisfazem

$$a_0 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = (n+1)a_n.$$

Então,

$$a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1, a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!, a_4 = 4 \cdot a_3 = 4!.$$

Será $a_n = n!$, para cada $n \in \mathbb{N}$? Provamos esta conjectura por indução:

- Para $n = 0$: $a_0 = 1 = 1!$.
- Seja $n \in \mathbb{N}$ e suponhamos $a_n = n!$.

Exemplo

Voltamos à questão de “quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?”. Já observamos que o correspondentes números a_n satisfazem

$$a_0 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = (n+1)a_n.$$

Então,

$$a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1, a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!, a_4 = 4 \cdot a_3 = 4!.$$

Será $a_n = n!$, para cada $n \in \mathbb{N}$? Provamos esta conjectura por indução:

- Para $n = 0$: $a_0 = 1 = 1!$.
- Seja $n \in \mathbb{N}$ e suponhamos $a_n = n!$. Então,

$$a_{n+1} = (n+1)a_n =$$

Exemplo

Voltamos à questão de “quantas ordens totais existem em $\{1, 2, \dots, n\}$, para cada $n \in \mathbb{N}$?”. Já observamos que o correspondentes números a_n satisfazem

$$a_0 = 1 \quad \text{e} \quad a_{n+1} = (n+1)a_n.$$

Então,

$$a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1, a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!, a_4 = 4 \cdot a_3 = 4!.$$

Será $a_n = n!$, para cada $n \in \mathbb{N}$? Provamos esta conjectura por indução:

- Para $n = 0$: $a_0 = 1 = 1!$.
- Seja $n \in \mathbb{N}$ e suponhamos $a_n = n!$. Então,

$$a_{n+1} = (n+1)a_n = (n+1)n! = (n+1)!.$$

Equações de recorrência lineares

Definição

- Uma **equação de recorrência linear**^a é uma equação da forma

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n, \quad (*)$$

(para $n \geq k$) onde c_1, c_2, \dots, c_k ($c_k \neq 0$) são constantes e $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sucessão.

^ade coeficientes constantes

Equações de recorrência lineares

Definição

- Uma **equação de recorrência linear** é uma equação da forma

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n, \quad (*)$$

(para $n \geq k$) onde c_1, c_2, \dots, c_k ($c_k \neq 0$) são constantes e $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sucessão.

- A equação (*) diz-se **homogênea** quando $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é a sucessão nula.

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k}.$$

Equações de recorrência lineares

Definição

- Uma **equação de recorrência linear** é uma equação da forma

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n, \quad (*)$$

(para $n \geq k$) onde c_1, c_2, \dots, c_k ($c_k \neq 0$) são constantes e $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sucessão.

- A equação (*) diz-se **homogénea** quando $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é a sucessão nula.
- A equação homogénea **associada** a (*) é a equação

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k}.$$

Equações de recorrência lineares

Definição

- Uma **equação de recorrência linear** é uma equação da forma

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n, \quad (*)$$

(para $n \geq k$) onde c_1, c_2, \dots, c_k ($c_k \neq 0$) são constantes e $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sucessão.

- A equação (*) diz-se **homogénea** quando $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é a sucessão nula.
- A equação homogénea **associada** a (*) é a equação

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k}.$$

Exemplo

- $x_n = 3x_{n-1} + 2x_{n-2} + 3n$ é uma equação de recorrência linear (não homogénea) da ordem 2.

Equações de recorrência lineares

Definição

- Uma **equação de recorrência linear** é uma equação da forma

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n, \quad (*)$$

(para $n \geq k$) onde c_1, c_2, \dots, c_k ($c_k \neq 0$) são constantes e $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sucessão.

- A equação (*) diz-se **homogénea** quando $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é a sucessão nula.
- A equação homogénea **associada** a (*) é a equação

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k}.$$

Exemplo

- $x_n = 3x_{n-1} + 2x_{n-2} + 3n$ é uma equação de recorrência linear (não homogénea) da ordem 2.
- $x_n = 3x_{n-1} + 2x_{n-2}$ é a equação homogénea associada.

Exemplo

- A equação da recorrência $x_{n+1} = (n+1)x_n$ é linear e homogênea mas *não tem coeficientes constantes*.

Exemplo

- A equação $x_n = 2x_{n-1} - x_{n-2}$ ($n \geq 2$) é uma equação de recorrência linear homogênea (de coeficientes constantes).

Exemplo

- A equação $x_n = 2x_{n-1} - x_{n-2}$ ($n \geq 2$) é uma equação de recorrência linear homogênea (de coeficientes constantes). Verificamos que a sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por

$$a_n = 3n \quad (n \in \mathbb{N})$$

é solução desta equação.

Exemplo

- A equação $x_n = 2x_{n-1} - x_{n-2}$ ($n \geq 2$) é uma equação de recorrência linear homogénea (de coeficientes constantes). Verificamos que a sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por

$$a_n = 3n \quad (n \in \mathbb{N})$$

é solução desta equação. De facto, para cada $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} 2a_{n-1} - a_{n-2} &= 2(3(n-1)) - 3(n-2) = \\ &= 3(2(n-1) - (n-2)) = 3n = a_n. \end{aligned}$$

Exemplo

- A equação $x_n = 2x_{n-1} - x_{n-2}$ ($n \geq 2$) é uma equação de recorrência linear homogénea (de coeficientes constantes). Verificamos que a sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por

$$a_n = 3n \quad (n \in \mathbb{N})$$

é solução desta equação. De facto, para cada $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} 2a_{n-1} - a_{n-2} &= 2(3(n-1)) - 3(n-2) = \\ &= 3(2(n-1) - (n-2)) = 3n = a_n. \end{aligned}$$

Um cálculo semelhante revela que as sucessões

$$(0)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (1)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (5n+2)_{n \in \mathbb{N}}$$

são soluções da equação acima.

Como resolver equações de recorrência lineares?

Teorema

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \quad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de ().*

+

todas as soluções da equação homogênea ass. a ().*

·

Como resolver equações de recorrência lineares?

Teorema

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \quad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de ().*

+

todas as soluções da equação homogênea ass. a ().*

·

Um resultado deste tipo já conhecemos de

- ALGA \rightsquigarrow resolver equações lineares;
- Cálculo II \rightsquigarrow resolver equações diferenciais lineares.

Como resolver equações de recorrência lineares?

Teorema

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \quad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de ().*

+

todas as soluções da equação homogênea ass. a ().*

.

Demonstração.

- Se b é uma solução de $(*)$ e a é uma solução da equação homogênea associada, então $a + b$ é uma solução de $(*)$.

Como resolver equações de recorrência lineares?

Teorema

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \quad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de ().*

+

todas as soluções da equação homogênea ass. a ().*

.

Demonstração.

- Se b é uma solução de $(*)$ e a é uma solução da equação homogênea associada, então $a + b$ é uma solução de $(*)$.
- Se b_1 e b_0 são soluções de $(*)$, então $b_1 - b_0$ é uma solução da equação homogênea associada, e $b_1 = b_0 + (b_1 - b_0)$. \square

Equações de recorrência lineares homogêneas

O espaço das soluções

Considerações iniciais

Seja

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \quad (*)$$

($c_k \neq 0$) uma equação de recorrência linear homogênea. Então:

O espaço das soluções

Considerações iniciais

Seja

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \quad (*)$$

($c_k \neq 0$) uma equação de recorrência linear homogênea. Então:

- O conjunto das soluções de (*) é um subespaço do espaço de todas as sucessões (digamos reais ou complexos).

O espaço das soluções

Considerações iniciais

Seja

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \quad (*)$$

($c_k \neq 0$) uma equação de recorrência linear homogénea. Então:

- O conjunto das soluções de (*) é um subespaço do espaço de todas as sucessões (digamos reais ou complexos).
- Cada solução $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de (*) é completamente determinada pelos primeiros k termos. De facto

$$\mathbb{C}^k \text{ ou } \mathbb{R}^k \longrightarrow \{\text{as soluções de } (*)\}$$

$$(a_0, \dots, a_{k-1}) \longmapsto (a_0, \dots, a_{k-1}, c_1 a_{k-1} + \cdots + c_k a_0, \dots)$$

é um isomorfismo;

Considerações iniciais

Seja

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \quad (*)$$

($c_k \neq 0$) uma equação de recorrência linear homogénea. Então:

- O conjunto das soluções de (*) é um subespaço do espaço de todas as sucessões (digamos reais ou complexos).
- Cada solução $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de (*) é completamente determinada pelos primeiros k termos. De facto

$$\mathbb{C}^k \text{ ou } \mathbb{R}^k \longrightarrow \{\text{as soluções de } (*)\}$$

$$(a_0, \dots, a_{k-1}) \longmapsto (a_0, \dots, a_{k-1}, c_1 a_{k-1} + \cdots + c_k a_0, \dots)$$

é um isomorfismo; logo, $\dim\{\text{as soluções de } (*)\} = k$.

O espaço das soluções

Considerações iniciais

Seja

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \quad (*)$$

($c_k \neq 0$) uma equação de recorrência linear homogénea. Então:

- O conjunto das soluções de $(*)$ é um subespaço do espaço de todas as sucessões (digamos reais ou complexos).
- Cada solução $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $(*)$ é completamente determinada pelos primeiros k termos. De facto

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^k \text{ ou } \mathbb{R}^k &\longrightarrow \{\text{as soluções de } (*)\} \\ (a_0, \dots, a_{k-1}) &\longmapsto (a_0, \dots, a_{k-1}, c_1 a_{k-1} + \cdots + c_k a_0, \dots) \end{aligned}$$

é um isomorfismo; logo, $\dim\{\text{as soluções de } (*)\} = k$.

Conclusão: Para descrever todas as soluções de $(*)$, procuramos k soluções de $(*)$ *linearmente intendente*.

A equação característica

Uma tentativa (mais ou menos) “esperta”

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0). \quad (*)$$

A equação característica

Uma tentativa (mais ou menos) “esperta”

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0). \quad (*)$$

Para uma sucessão da forma $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$, para quais valores de q obtemos uma soluções?

A equação característica

Uma tentativa (mais ou menos) “esperta”

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0). \quad (*)$$

Para uma sucessão da forma $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$, para quais valores de q obtemos uma soluções? Seguramente não para $q = 0$,

A equação característica

Uma tentativa (mais ou menos) “esperta”

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0). \quad (*)$$

Para uma sucessão da forma $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$, para quais valores de q obtemos uma soluções? Seguramente não para $q = 0$, e para $q \neq 0$ temos

$$\begin{aligned} 0 &= q^n - c_1 q^{n-1} - c_2 q^{n-2} - \cdots - c_k q^{n-k} \\ &= q^{n-k} (q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k), \end{aligned}$$

A equação característica

Uma tentativa (mais ou menos) “esperta”

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0). \quad (*)$$

Para uma sucessão da forma $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$, para quais valores de q obtemos uma soluções? Seguramente não para $q = 0$, e para $q \neq 0$ temos

$$\begin{aligned} 0 &= q^n - c_1 q^{n-1} - c_2 q^{n-2} - \cdots - c_k q^{n-k} \\ &= q^{n-k} (q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k), \end{aligned}$$

portanto, $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ é solução de $(*)$ se e somente se

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k.$$

A equação característica

Uma tentativa (mais ou menos) “esperta”

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0). \quad (*)$$

Para uma sucessão da forma $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$, para quais valores de q obtemos uma soluções? Seguramente não para $q = 0$, e para $q \neq 0$ temos

$$\begin{aligned} 0 &= q^n - c_1 q^{n-1} - c_2 q^{n-2} - \cdots - c_k q^{n-k} \\ &= q^{n-k} (q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k), \end{aligned}$$

portanto, $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ é solução de $(*)$ se e somente se

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k.$$

A equação acima diz-se **equação característica** de $(*)$.

Exemplo

Procuramos todas as solução da equação de recorrência linear homogénea

$$0 = x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} \quad (n \geq 2). \quad (*)$$

Exemplo

Procuramos todas as soluções da equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} \quad (n \geq 2). \quad (*)$$

A equação característica é

$$0 = q^2 - q - 2 =$$

Exemplo

Procuramos todas as soluções da equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} \quad (n \geq 2). \quad (*)$$

A equação característica é

$$0 = q^2 - q - 2 =$$

Nota: As raízes inteiras de um polinómio da forma

$$q^n + \cdots + c$$

dividem c (e as outras raízes não são racionais).

Exemplo

Procuramos todas as soluções da equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} \quad (n \geq 2). \quad (*)$$

A equação característica é

$$0 = q^2 - q - 2 = (q - 2)$$

Nota: As raízes inteiras de um polinómio da forma

$$q^n + \cdots + c$$

dividem c (e as outras raízes não são racionais).

Exemplo

Procuramos todas as soluções da equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} \quad (n \geq 2). \quad (*)$$

A equação característica é

$$0 = q^2 - q - 2 = (q - 2)(q + 1),$$

Nota: As raízes inteiras de um polinómio da forma

$$q^n + \cdots + c$$

dividem c (e as outras raízes não são racionais).

Exemplo

Procuramos todas as solução da equação de recorrência linear homogénea

$$0 = x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} \quad (n \geq 2). \quad (*)$$

A equação caraterística é

$$0 = q^2 - q - 2 = (q - 2)(q + 1),$$

com as soluções $q_0 = 2$ e $q_1 = -1$.

Exemplo

Procuramos todas as soluções da equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} \quad (n \geq 2). \quad (*)$$

A equação característica é

$$0 = q^2 - q - 2 = (q - 2)(q + 1),$$

com as soluções $q_0 = 2$ e $q_1 = -1$. Verifica-se que as sucessões

$$(2^n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{e} \quad ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

são linearmente independentes; portanto,

Exemplo

Procuramos todas as soluções da equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - x_{n-1} - 2x_{n-2} \quad (n \geq 2). \quad (*)$$

A equação característica é

$$0 = q^2 - q - 2 = (q - 2)(q + 1),$$

com as soluções $q_0 = 2$ e $q_1 = -1$. Verifica-se que as sucessões

$$(2^n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{e} \quad ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

são linearmente independentes; portanto, todas as soluções (reais) da equação (*) tem a forma

$$(\alpha 2^n + \beta (-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Exemplo

Solução geral:

$$(\alpha 2^n + \beta (-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, procuramos a solução que satisfaz $x_0 = 5$ e $x_1 = 4$;

Exemplo

Solução geral:

$$(\alpha 2^n + \beta (-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, procuramos a solução que satisfaz $x_0 = 5$ e $x_1 = 4$; ou seja, aquele com

$$\alpha + \beta = 5 \text{ (caso } n = 0) \quad \text{e} \quad 2\alpha - \beta = 4 \text{ (caso } n = 1).$$

Exemplo

Solução geral:

$$(\alpha 2^n + \beta (-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, procuramos a solução que satisfaz $x_0 = 5$ e $x_1 = 4$; ou seja, aquele com

$$\alpha + \beta = 5 \text{ (caso } n = 0) \quad \text{e} \quad 2\alpha - \beta = 4 \text{ (caso } n = 1).$$

Resolvendo este sistema de duas equações lineares dá $\alpha = 3$ e $\beta = 2$.

Exemplo

Solução geral:

$$(\alpha 2^n + \beta (-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, procuramos a solução que satisfaz $x_0 = 5$ e $x_1 = 4$; ou seja, aquele com

$$\alpha + \beta = 5 \text{ (caso } n = 0) \quad \text{e} \quad 2\alpha - \beta = 4 \text{ (caso } n = 1).$$

Resolvendo este sistema de duas equações lineares dá $\alpha = 3$ e $\beta = 2$. Assim, a solução é a sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ com

$$a_n = 3 \cdot 2^n + 2 \cdot (-1)^n, \quad \text{para todo o } n \in \mathbb{N}.$$

O primeiro resultado

Corolário

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0). \quad (*)$$

Se a equação característica

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k$$

de () têm as k soluções (diferentes) q_1, q_2, \dots, q_k , então as soluções de (*) são precisamente as combinações lineares das sucessões^a $(q_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, \dots, (q_k^n)_{n \in \mathbb{N}}$; ou seja, as sucessões da forma*

$$(C_1 q_1^n + C_2 q_2^n + \cdots + C_k q_k^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

com constantes C_1, C_2, \dots, C_k .

^alinearmente independente

Exemplo

Recordamos que os números de Fibonacci $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfazem as equações

$$F_0 = 1, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

Exemplo

Recordamos que os números de Fibonacci $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfazem as equações

$$F_0 = 1, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

Para resolver a equação de recorrência linear homogênea $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, consideramos a equação $q^2 - q - 1 = 0$ de segundo grau que tem duas soluções:

$$q_0 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \qquad \text{e} \qquad q_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Os números de Fibonacci outra vez ...

Exemplo

Recordamos que os números de Fibonacci $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfazem as equações

$$F_0 = 1, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

Para resolver a equação de recorrência linear homogênea $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, consideramos a equação $q^2 - q - 1 = 0$ de segundo grau que tem duas soluções:

$$q_0 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \qquad \text{e} \qquad q_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Portanto, todas as soluções da equação homogênea são combinações lineares das sucessões $(q_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(q_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Em particular,

$$(F_n)_{n \in \mathbb{N}} = \alpha(q_0^n)_{n \in \mathbb{N}} + \beta(q_1^n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exemplo

Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ obtemos

$$1 = \alpha + \beta, \quad 1 = \alpha \overbrace{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)}^{q_0} + \beta \overbrace{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)}^{q_1}.$$

Exemplo

Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ obtemos

$$1 = \alpha + \beta, \quad 1 = \alpha \overbrace{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)}^{q_0} + \beta \overbrace{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)}^{q_1}.$$

Fazendo redução com a correspondente matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ q_0 & q_1 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & q_1 - q_0 & (1 - q_0) \end{bmatrix}$$

$$\text{produz } \beta = \frac{1 - q_0}{q_1 - q_0} = \frac{1 - q_0}{\sqrt{5}} \text{ e } \alpha = 1 - \beta = \frac{q_1 - 1}{q_1 - q_0} = -\frac{1 - q_1}{\sqrt{5}}.$$

Exemplo

Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ obtemos

$$1 = \alpha + \beta, \quad 1 = \alpha \overbrace{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)}^{q_0} + \beta \overbrace{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)}^{q_1}.$$

Fazendo redução com a correspondente matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ q_0 & q_1 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & q_1 - q_0 & (1 - q_0) \end{bmatrix}$$

produz $\beta = \frac{1 - q_0}{q_1 - q_0} = \frac{1 - q_0}{\sqrt{5}}$ e $\alpha = 1 - \beta = \frac{q_1 - 1}{q_1 - q_0} = -\frac{1 - q_1}{\sqrt{5}}$.

Portanto, com algum cálculo,

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}((1 - q_0)q_1^n - (1 - q_1)q_0^n) = \frac{1}{\sqrt{5}}(q_1^{n+1} - q_0^{n+1}).$$

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \cdots + c_kx_{n-k}$.

Exemplo

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \cdots + c_kx_{n-k}$.

Exemplo

- Consideramos $0 = x_n + 2x_{n-1} - x_{n-2} - 2x_{n-3}$ de ordem 3.

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \dots + c_kx_{n-k}$.

- Obter a equação característica

$$0 = q^k - c_1q^{k-1} - c_2q^{k-2} - \dots - c_k$$

Exemplo

- Consideramos $0 = x_n + 2x_{n-1} - x_{n-2} - 2x_{n-3}$ de ordem 3.
- Eq. car.: $0 = q^3$

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \dots + c_kx_{n-k}$.

- Obter a equação característica

$$0 = q^k - c_1q^{k-1} - c_2q^{k-2} - \dots - c_k$$

Exemplo

- Consideramos $0 = x_n + 2x_{n-1} - x_{n-2} - 2x_{n-3}$ de ordem 3.
- Eq. car.: $0 = q^3 + 2q^2 - q - 2$.

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \dots + c_kx_{n-k}$.

- Obter a equação caraterística

$$0 = q^k - c_1q^{k-1} - c_2q^{k-2} - \dots - c_k$$

- e obter as soluções da equação caraterística:

$$\dots = (q - q_1)(q - q_2) \dots (q - q_k).$$

Exemplo

- Consideramos $0 = x_n + 2x_{n-1} - x_{n-2} - 2x_{n-3}$ de ordem 3.
- Eq. car.: $0 = q^3 + 2q^2 - q - 2 = (q -$

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \dots + c_kx_{n-k}$.

- Obter a equação caraterística

$$0 = q^k - c_1q^{k-1} - c_2q^{k-2} - \dots - c_k$$

- e obter as soluções da equação caraterística:

$$\dots = (q - q_1)(q - q_2) \dots (q - q_k).$$

Exemplo

- Consideramos $0 = x_n + 2x_{n-1} - x_{n-2} - 2x_{n-3}$ de ordem 3.
- Eq. car.: $0 = q^3 + 2q^2 - q - 2 = (q - 1)(q$.

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \dots + c_kx_{n-k}$.

- Obter a equação caraterística

$$0 = q^k - c_1q^{k-1} - c_2q^{k-2} - \dots - c_k$$

- e obter as soluções da equação caraterística:

$$\dots = (q - q_1)(q - q_2) \dots (q - q_k).$$

Exemplo

- Consideramos $0 = x_n + 2x_{n-1} - x_{n-2} - 2x_{n-3}$ de ordem 3.
- Eq. car.: $0 = q^3 + 2q^2 - q - 2 = (q - 1)(q + 1)(q + 2)$.

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \dots + c_kx_{n-k}$.

- Obter a equação caraterística

$$0 = q^k - c_1q^{k-1} - c_2q^{k-2} - \dots - c_k$$

- e obter as soluções da equação caraterística:

$$\dots = (q - q_1)(q - q_2) \dots (q - q_k).$$

Exemplo

- Consideramos $0 = x_n + 2x_{n-1} - x_{n-2} - 2x_{n-3}$ de ordem 3.
- Eq. car.: $0 = q^3 + 2q^2 - q - 2 = (q - 1)(q + 1)(q + 2)$.

Resumo (resolver eq. de recorrência lineares homogêneas

de ordem k com k raízes diferentes)

Consideramos $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \cdots + c_kx_{n-k}$.

- Obter a equação caraterística

$$0 = q^k - c_1q^{k-1} - c_2q^{k-2} - \cdots - c_k$$

- e obter as soluções da equação caraterística:

$$\dots = (q - q_1)(q - q_2) \dots (q - q_k).$$

- Se obtemos k soluções diferentes, então todas as soluções da equação de recorrência tem a forma

$$(C_1q_1^n + C_2q_2^n + \cdots + C_kq_k^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

com constantes C_1, C_2, \dots, C_k .

Exemplo

- Consideramos $0 = x_n + 2x_{n-1} - x_{n-2} - 2x_{n-3}$ de ordem 3.
- Eq. car.: $0 = q^3 + 2q^2 - q - 2 = (q - 1)(q + 1)(q + 2)$.

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3 - 3q$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3 - 3q + 2$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3 - 3q + 2 = (q$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3 - 3q + 2 = (q - 1)(q$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3 - 3q + 2 = (q - 1)(q + 2)(q$$

.

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3 - 3q + 2 = (q - 1)(q + 2)(q - 1)$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3 - 3q + 2 = (q - 1)(q + 2)(q - 1) = (q - 1)^2(q + 2).$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-2} - 2x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

de ordem 3; ou seja $0 = x_n - 3x_{n-2} + 2x_{n-3}$.

A corresponde equação caraterística é

$$0 = q^3 - 3q + 2 = (q - 1)(q + 2)(q - 1) = (q - 1)^2(q + 2).$$

E agora? Temos apenas as duas soluções independentes

$$(1^n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{e} \quad ((-2)^n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \dots$$

Equações de recorrência lineares homogêneas (caso geral)

Teorema

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0) \quad (*)$$

com a equação característica

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \cdots (q - q_l)^{n_l}$$

$(n_1 + \cdots + n_l = k, n_i > 0)$.

Equações de recorrência lineares homogêneas (caso geral)

Teorema

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0) \quad (*)$$

com a equação característica

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \cdots (q - q_l)^{n_l}$$

($n_1 + \cdots + n_l = k, n_i > 0$). Então, as soluções da equação () são precisamente as combinações lineares das k sucessões*

$$(q_1^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$(q_2^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

\dots

$$(q_l^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

Equações de recorrência lineares homogêneas (caso geral)

Teorema

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0) \quad (*)$$

com a equação característica

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \cdots (q - q_l)^{n_l}$$

($n_1 + \cdots + n_l = k$, $n_i > 0$). Então, as soluções da equação () são precisamente as combinações lineares das k sucessões*

$$(q_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n \cdot q_1^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$(q_2^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n \cdot q_2^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

\dots

$$(q_l^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n \cdot q_l^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

Equações de recorrência lineares homogêneas (caso geral)

Teorema

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \cdots - c_k x_{n-k} \quad (k \geq 1, c_k \neq 0) \quad (*)$$

com a equação característica

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \cdots (q - q_l)^{n_l}$$

($n_1 + \cdots + n_l = k, n_i > 0$). Então, as soluções da equação () são precisamente as combinações lineares das k sucessões*

$$(q_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n \cdot q_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n^2 \cdot q_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \dots \quad (n^{n_1-1} \cdot q_1^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$(q_2^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n \cdot q_2^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n^2 \cdot q_2^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \dots \quad (n^{n_2-1} \cdot q_2^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

\dots

$$(q_l^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n \cdot q_l^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n^2 \cdot q_l^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \dots \quad (n^{n_l-1} \cdot q_l^n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$x_n = 5x_{n-1} - 8x_{n-2} + 4x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

com os valores iniciais $x_0 = 0$, $x_1 = 4$ e $x_2 = 18$.

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$x_n = 5x_{n-1} - 8x_{n-2} + 4x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

com os valores iniciais $x_0 = 0$, $x_1 = 4$ e $x_2 = 18$.

A equação caraterística é

$$0 = q^3 - 5q^2 + 8q - 4 = (q - 1)(q - 2)(q - 2) = (q - 1)(q - 2)^2;$$

portanto, as solução da equação de recorrência são as sucessões da forma (com $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$)

$$(\alpha 1^n + \beta 2^n + \gamma n 2^n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência linear homogênea

$$x_n = 5x_{n-1} - 8x_{n-2} + 4x_{n-3} \quad (n \geq 3)$$

com os valores iniciais $x_0 = 0$, $x_1 = 4$ e $x_2 = 18$.

A equação característica é

$$0 = q^3 - 5q^2 + 8q - 4 = (q - 1)(q - 2)(q - 2) = (q - 1)(q - 2)^2;$$

portanto, as soluções da equação de recorrência são as sucessões da forma (com $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$)

$$(\alpha 1^n + \beta 2^n + \gamma n 2^n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Considerando os valores iniciais, procuramos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tais que

$$\alpha + \beta = 0, \quad \alpha + 2\beta + 2\gamma = 4, \quad \alpha + 4\beta + 8\gamma = 18.$$

Exemplo

Utilizando a primeira equação, o sistema

$$\alpha + \beta = 0,$$

$$\alpha + 2\beta + 2\gamma = 4,$$

$$\alpha + 4\beta + 8\gamma = 18$$

reduz ($\alpha = -\beta$) a

$$\beta + 2\gamma = 4,$$

$$3\beta + 8\gamma = 18;$$

cuja solução é $\gamma = 3$ e $\beta = -2$, logo $\alpha = 2$.

Exemplo

Utilizando a primeira equação, o sistema

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= 0, \\ \alpha + 2\beta + 2\gamma &= 4, \\ \alpha + 4\beta + 8\gamma &= 18\end{aligned}$$

reduz ($\alpha = -\beta$) a

$$\begin{aligned}\beta + 2\gamma &= 4, \\ 3\beta + 8\gamma &= 18;\end{aligned}$$

cuja solução é $\gamma = 3$ e $\beta = -2$, logo $\alpha = 2$. Assim, a solução da equação de recorrência com os valores iniciais é a sucessão

$$(2 - 2 \cdot 2^n + 3 \cdot n \cdot 2^n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

A de(s)monstração (do teorema)

Preparação

Consideramos a função linear S “esquecer o primeiro termo” definida por

$$S((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}.$$

A de(s)monstração (do teorema)

Preparação

Consideramos a função linear S “esquecer o primeiro termo” definida por

$$S((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}.$$

Então, uma sucessão $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é solução da equação $0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \dots - c_k x_{n-k}$ se e somente se

$$\begin{aligned} \text{sucessão nula} &= S^n(a) - c_1 S^{n-1}(a) - \dots - c_k S^{n-k}(a) \\ &= (S^n - c_1 S^{n-1} - \dots - c_k S^{n-k})(a) \\ &= S^{n-k} \circ (S^k - c_1 S^{k-1} - \dots - c_k \text{id})(a), \end{aligned}$$

para cada $n \in \mathbb{N}$.

A de(s)monstração (do teorema)

Preparação

Consideramos a função linear S “esquecer o primeiro termo” definida por

$$S((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}.$$

Então, uma sucessão $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é solução da equação $0 = x_n - c_1 x_{n-1} - c_2 x_{n-2} - \dots - c_k x_{n-k}$ se e somente se

$$\begin{aligned} \text{sucessão nula} &= S^n(a) - c_1 S^{n-1}(a) - \dots - c_k S^{n-k}(a) \\ &= (S^n - c_1 S^{n-1} - \dots - c_k S^{n-k})(a) \\ &= S^{n-k} \circ (S^k - c_1 S^{k-1} - \dots - c_k \text{id})(a), \end{aligned}$$

para cada $n \in \mathbb{N}$. Veremos agora quais sucessões a função linear

$$S^k - c_1 S^{k-1} - \dots - c_k \text{id}$$

anula.

A de(s)monstração (do teorema)

Decompor a função

Seja (com $n_1 + \dots + n_l = k$, $n_i > 0$)

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \dots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \dots (q - q_k)^{n_k}$$

a equação caraterística,

A de(s)monstração (do teorema)

Decompor a função

Seja (com $n_1 + \dots + n_l = k$, $n_i > 0$)

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \dots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \dots (q - q_k)^{n_k}$$

a equação caraterística, então

$$S^k - c_1 S^{k-1} - \dots - c_k \text{id} = (S - q_1 \text{id})^{n_1} \circ \dots \circ (S - q_k \text{id})^{n_k}.$$

A de(s)monstração (do teorema)

Decompor a função

Seja (com $n_1 + \dots + n_l = k$, $n_i > 0$)

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \dots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \dots (q - q_k)^{n_k}$$

a equação caraterística, então

$$S^k - c_1 S^{k-1} - \dots - c_k \text{id} = (S - q_1 \text{id})^{n_1} \circ \dots \circ (S - q_k \text{id})^{n_k}.$$

“A chave” da prova do teorema é o seguinte lema.

A de(s)monstração (do teorema)

Decompor a função

Seja (com $n_1 + \dots + n_l = k$, $n_i > 0$)

$$0 = q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \dots - c_k = (q - q_1)^{n_1} \dots (q - q_k)^{n_k}$$

a equação caraterística, então

$$S^k - c_1 S^{k-1} - \dots - c_k \text{id} = (S - q_1 \text{id})^{n_1} \circ \dots \circ (S - q_k \text{id})^{n_k}.$$

“A chave” da prova do teorema é o seguinte lema.

Lema

Seja $q \in \mathbb{R}$ e $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 1$. A função linear $(S - q \text{id})^m$ anula as sucessões

$$(q^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (n^2 \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \dots \quad (n^{m-1} \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

A de(s)monstração (do lema)

$$s_1 = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}, s_2 = (n \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}, \dots, s_m = (n^{m-1} \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Demonstração.

Utilizamos indução sobre m .



A de(s)monstração (do lema)

$$s_1 = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}, s_2 = (n \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}, \dots, s_m = (n^{m-1} \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Demonstração.

Utilizamos indução sobre m .

Para $m = 1$, $S((q^n)_{n \in \mathbb{N}}) = (q^{n+1})_{n \in \mathbb{N}} = q(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$.



A de(s)monstração (do lema)

$$s_1 = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}, s_2 = (n \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}, \dots, s_m = (n^{m-1} \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Demonstração.

Seja agora $m > k$ e suponhamos que, para cada $r < m$, $(S - q \operatorname{id})^r$ anula as sucessões s_1, \dots, s_k .



A de(s)monstração (do lema)

$$s_1 = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}, s_2 = (n \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}, \dots, s_m = (n^{m-1} \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Demonstração.

Seja agora $m > k$ e suponhamos que, para cada $r < m$, $(S - q \text{id})^r$ anula as sucessões s_1, \dots, s_k . Calculamos, para cada $n \in \mathbb{N}$, o termo n de $S(s_m) - (q \cdot s_m)$:

$$\begin{aligned} & (n+1)^{m-1} \cdot q^{n+1} - n^{m-1} q^{n+1} \\ &= \left(\sum_{i=0}^{m-1} \binom{m-1}{i} \cdot n^i \cdot q^{n+1} \right) - n^{m-1} q^{n+1} \\ &= \underbrace{\left(\sum_{i=0}^{m-2} q \cdot \binom{m-1}{i} \cdot n^i \cdot q^n \right)}_{\text{combinação linear de } s_1, \dots, s_{m-1}}; \end{aligned}$$



A de(s)monstração (do lema)

$$s_1 = (q^n)_{n \in \mathbb{N}}, s_2 = (n \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}, \dots, s_m = (n^{m-1} \cdot q^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Demonstração.

Seja agora $m > k$ e suponhamos que, para cada $r < m$, $(S - q \text{id})^r$ anula as sucessões s_1, \dots, s_k . Calculamos, para cada $n \in \mathbb{N}$, o termo n de $S(s_m) - (q \cdot s_m)$:

$$\begin{aligned} & (n+1)^{m-1} \cdot q^{n+1} - n^{m-1} q^{n+1} \\ &= \left(\sum_{i=0}^{m-1} \binom{m-1}{i} \cdot n^i \cdot q^{n+1} \right) - n^{m-1} q^{n+1} \\ &= \underbrace{\left(\sum_{i=0}^{m-2} q \cdot \binom{m-1}{i} \cdot n^i \cdot q^n \right)}_{\text{combinação linear de } s_1, \dots, s_{m-1}}; \end{aligned}$$

Logo, $(S - q \text{id})^{m-1}$ anula $(S - q \text{id})(s_m)$.



... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \quad \text{e} \quad \bar{z} = a - ib.$$

... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \quad \text{e} \quad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$b = (\bar{z}^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \quad \text{e} \quad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$b = (\bar{z}^n)_{n \in \mathbb{N}}$$

- $z = a + ib = r(\cos \varphi + i \operatorname{sen} \varphi)$

$$\text{com } r = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \tan \varphi = \frac{b}{a} \quad (\text{se } a \neq 0).$$

... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \quad \text{e} \quad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(\varphi) + i \operatorname{sen}(\varphi)))_{n \in \mathbb{N}},$$

$$b = (\bar{z}^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(\varphi) - i \operatorname{sen}(\varphi)))_{n \in \mathbb{N}}.$$

- $z = a + ib = r(\cos \varphi + i \operatorname{sen} \varphi)$

$$\text{com } r = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \tan \varphi = \frac{b}{a} \quad (\text{se } a \neq 0).$$

... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \quad \text{e} \quad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(\varphi) + i \operatorname{sen}(\varphi))^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$b = (\bar{z}^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(\varphi) - i \operatorname{sen}(\varphi))^n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

- $z = a + ib = r(\cos \varphi + i \operatorname{sen} \varphi)$

com $r = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}$ e $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ (se $a \neq 0$).

- $(\cos \varphi + i \operatorname{sen} \varphi)^n = \cos(n\varphi) + i \operatorname{sen}(n\varphi).$

Abraham de Moivre (1667 – 1754), matemático francês.

... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \quad \text{e} \quad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(n\varphi) + i \operatorname{sen}(n\varphi)))_{n \in \mathbb{N}},$$

$$b = (\bar{z}^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(n\varphi) - i \operatorname{sen}(n\varphi)))_{n \in \mathbb{N}}.$$

- $z = a + ib = r(\cos \varphi + i \operatorname{sen} \varphi)$

com $r = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}$ e $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ (se $a \neq 0$).

- $(\cos \varphi + i \operatorname{sen} \varphi)^n = \cos(n\varphi) + i \operatorname{sen}(n\varphi).$

Abraham de Moivre (1667 – 1754), matemático francês.

... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \quad \text{e} \quad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(n\varphi) + i \operatorname{sen}(n\varphi)))_{n \in \mathbb{N}},$$

$$b = (\bar{z}^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(n\varphi) - i \operatorname{sen}(n\varphi)))_{n \in \mathbb{N}}.$$

Assim, obtemos as soluções (independentes)

$$\frac{a + b}{2} = (r^n \cos(n\varphi))_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{e} \quad \frac{a - b}{2i} = (r^n \operatorname{sen}(n\varphi))_{n \in \mathbb{N}}.$$

... e se as raízes são complexas?

Um par de raízes complexas

Suponhamos que o polinómio caraterístico de uma equação de recorrência linear homogénea tem as raízes complexas

$$z = a + ib \quad \text{e} \quad \bar{z} = a - ib.$$

Portanto, obtemos as duas soluções (da equação de recorrência):

$$a = (z^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)))_{n \in \mathbb{N}},$$

$$b = (\bar{z}^n)_{n \in \mathbb{N}} = (r^n(\cos(n\varphi) - i \sin(n\varphi)))_{n \in \mathbb{N}}.$$

Assim, obtemos as soluções (independentes)

$$\frac{a+b}{2} = (r^n \cos(n\varphi))_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{e} \quad \frac{a-b}{2i} = (r^n \sin(n\varphi))_{n \in \mathbb{N}}.$$

Finalmente, se z e \bar{z} são raízes múltiplas, consideramos

$$\dots, (r^n n^i \cos(n\varphi))_{n \in \mathbb{N}}, \dots, (r^n n^i \sin(n\varphi))_{n \in \mathbb{N}}, \dots$$

Exemplo (Exercício 7c)

Consideramos a equação de recorrência

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad \text{com} \quad a_0 = 0, a_1 = 1.$$

Exemplo (Exercício 7c)

Consideramos a equação de recorrência

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad \text{com} \quad a_0 = 0, a_1 = 1.$$

A correspondente equação característica é $0 = q^2 - q + 1$,

Exemplo (Exercício 7c)

Consideramos a equação de recorrência

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad \text{com} \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

A correspondente equação característica é $0 = q^2 - q + 1$,

com as soluções $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\bar{z} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exemplo (Exercício 7c)

Consideramos a equação de recorrência

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad \text{com} \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

A correspondente equação característica é $0 = q^2 - q + 1$,

com as soluções $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\bar{z} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Portanto, $r = 1$ e $\tan(\varphi) = \sqrt{3}$, logo $\varphi = \frac{\pi}{3}$;

Exemplo (Exercício 7c)

Consideramos a equação de recorrência

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad \text{com} \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

A correspondente equação característica é $0 = q^2 - q + 1$,

com as soluções $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\bar{z} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Portanto, $r = 1$ e $\tan(\varphi) = \sqrt{3}$, logo $\varphi = \frac{\pi}{3}$; e a solução geral é dada por

$$\left(\alpha \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \beta \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right)_{n \in \mathbb{N}} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).$$

Exemplo (Exercício 7c)

Consideramos a equação de recorrência

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad \text{com} \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

A correspondente equação característica é $0 = q^2 - q + 1$,

com as soluções $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\bar{z} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Portanto, $r = 1$ e $\tan(\varphi) = \sqrt{3}$, logo $\varphi = \frac{\pi}{3}$; e a solução geral é dada por

$$\left(\alpha \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \beta \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right)_{n \in \mathbb{N}} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).$$

Com a condição inicial $a_0 = 0$ obtemos $\alpha = 0$,

Exemplo (Exercício 7c)

Consideramos a equação de recorrência

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad \text{com} \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

A correspondente equação característica é $0 = q^2 - q + 1$,

com as soluções $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\bar{z} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Portanto, $r = 1$ e $\tan(\varphi) = \sqrt{3}$, logo $\varphi = \frac{\pi}{3}$; e a solução geral é dada por

$$\left(\alpha \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \beta \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right)_{n \in \mathbb{N}} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).$$

Com a condição inicial $a_0 = 0$ obtemos $\alpha = 0$, e com $a_1 = 1$ obtemos

$$1 = \beta \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \beta \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Um exemplo

Exemplo (Exercício 7c)

Consideramos a equação de recorrência

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n, \quad n \geq 0, \quad \text{com} \quad a_0 = 0, \quad a_1 = 1.$$

A correspondente equação caraterística é $0 = q^2 - q + 1$,

com as soluções $z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\bar{z} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Portanto, $r = 1$ e $\tan(\varphi) = \sqrt{3}$, logo $\varphi = \frac{\pi}{3}$; e a solução geral é dada por

$$\left(\alpha \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \beta \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right)_{n \in \mathbb{N}} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).$$

Com a condição inicial $a_0 = 0$ obtemos $\alpha = 0$, e com $a_1 = 1$ obtemos

$$1 = \beta \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \beta \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Portanto, a solução é a sucessão $\left(\frac{2}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right)_{n \in \mathbb{N}}$.

Equações de recorrência lineares em geral

Equações de recorrência lineares em geral

Recordamos:

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \quad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de (*).

+

Equações de recorrência lineares em geral

Recordamos:

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \quad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de (*).

+

todas as soluções da equação homogênea ass. a (*).

.

Equações de recorrência lineares em geral

Recordamos:

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \quad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de (*).

+

todas as soluções da equação homogénea ass. a (*).

- Já sabemos resolver a segunda questão.

Equações de recorrência lineares em geral

Recordamos:

O conjunto de todas as soluções da equação de recorrência linear

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n \quad (*)$$

obtém-se como

uma solução particular de (*).

+

todas as soluções da equação homogénea ass. a (*).

- Já sabemos resolver a segunda questão.
- Estudamos agora métodos para obter *uma solução particular* de (*).

Obter uma solução particular

Seja $x_n = c_1x_{n-1} + c_2x_{n-2} + \cdots + c_kx_{n-k} + d_n$.

Obter uma solução particular

Seja $x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n$.

- Se $d_n = c \cdot p^n$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A \cdot p^n$$

($A \in \mathbb{R}$ a determinar) se p não é solução da equação característica

Obter uma solução particular

Seja $x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n$.

- Se $d_n = c \cdot p^n$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A \cdot p^n \quad \text{resp.} \quad b_n = A \cdot n^m \cdot p^n$$

($A \in \mathbb{R}$ a determinar) se p não é solução da equação característica (mais geral, se p é solução da equação característica de multiplicidade m).

Obter uma solução particular

Seja $x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n$.

- Se $d_n = c \cdot p^n$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A \cdot p^n \quad \text{resp.} \quad b_n = A \cdot n^m \cdot p^n$$

($A \in \mathbb{R}$ a determinar) se p não é solução da equação característica (mais geral, se p é solução da equação característica de multiplicidade m).

- Se $d_n = \text{um polinómio em } n \text{ de grau } j$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A_0 + A_1 n + \cdots + A_j n^j \quad (A_i \in \mathbb{R} \text{ a determinar})$$

se 1 não é solução da equação característica respetivamente

Obter uma solução particular

Seja $x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n$.

- Se $d_n = c \cdot p^n$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A \cdot p^n \quad \text{resp.} \quad b_n = A \cdot n^m \cdot p^n$$

($A \in \mathbb{R}$ a determinar) se p não é solução da equação característica (mais geral, se p é solução da equação característica de multiplicidade m).

- Se $d_n = \text{um polinómio em } n \text{ de grau } j$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A_0 + A_1 n + \cdots + A_j n^j \quad (A_i \in \mathbb{R} \text{ a determinar})$$

se 1 não é solução da equação característica respetivamente

$$b_n = (A_0 + A_1 n + \cdots + A_j n^j) \cdot n^m \quad (A_i \in \mathbb{R} \text{ a determinar})$$

se 1 é solução da equação característica de multiplicidade m .

Obter uma solução particular

Seja $x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n$.

- Se $d_n = c \cdot p^n$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A \cdot p^n \quad \text{resp.} \quad b_n = A \cdot n^m \cdot p^n$$

($A \in \mathbb{R}$ a determinar) se p não é solução da equação característica (mais geral, se p é solução da equação característica de multiplicidade m).

- Se $d_n = \text{um polinómio em } n \text{ de grau } j$: Procuramos uma solução da forma

$$b_n = A_0 + A_1 n + \cdots + A_j n^j \quad (A_i \in \mathbb{R} \text{ a determinar})$$

se 1 não é solução da equação característica respetivamente

$$b_n = (A_0 + A_1 n + \cdots + A_j n^j) \cdot n^m \quad (A_i \in \mathbb{R} \text{ a determinar})$$

se 1 é solução da equação característica de multiplicidade m .

Os valores dos parâmetros A, A_i obtém-se substituindo b_n na equação de recorrência dada.

Exemplo

Vamos determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots;$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

Exemplo

Vamos determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots;$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

Procuramos primeiro a solução geral da equação homogênea associada, cuja equação característica é

Exemplo

Vamos determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots;$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

Procuramos primeiro a solução geral da equação homogênea associada, cuja equação característica é

$$0 = q^2 - 3q + 2 =$$

Exemplo

Vamos determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots;$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

Procuramos primeiro a solução geral da equação homogénea associada, cuja equação caraterística é

$$0 = q^2 - 3q + 2 = (q - 2)(q - 1).$$

Exemplo

Vamos determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots;$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

Procuramos primeiro a solução geral da equação homogênea associada, cuja equação característica é

$$0 = q^2 - 3q + 2 = (q - 2)(q - 1).$$

Portanto, a solução geral da equação de recorrência homogênea é a sucessão $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por

$$a_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \cdot 2^n = \alpha + \beta \cdot 2^n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Exemplo

Agora procuramos uma solução de

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

da forma

Exemplo

Agora procuramos uma solução de

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

da forma

$$b_n = A \cdot n \cdot 2^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

tendo em conta que 2 é uma raiz simples de $q^2 - 3q + 2$.

Um exemplo (continuação)

Exemplo

Agora procuramos uma solução de

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

da forma

$$b_n = A \cdot n \cdot 2^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

tendo em conta que 2 é uma raiz simples de $q^2 - 3q + 2$.
Substituindo na equação acima, obtemos

$$An2^n - 3A(n-1)2^{n-1} + 2A(n-2)2^{n-2} = 2^n,$$

Um exemplo (continuação)

Exemplo

Agora procuramos uma solução de

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

da forma

$$b_n = A \cdot n \cdot 2^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

tendo em conta que 2 é uma raiz simples de $q^2 - 3q + 2$.
Substituindo na equação acima, obtemos

$$An2^n - 3A(n-1)2^{n-1} + 2A(n-2)2^{n-2} = 2^n,$$

o que é equivalente a

$$2 = 2An - 3A(n-1) + A(n-2) = A.$$

Um exemplo (continuação)

Exemplo

Agora procuramos uma solução de

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

da forma

$$b_n = A \cdot n \cdot 2^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

tendo em conta que 2 é uma raiz simples de $q^2 - 3q + 2$.
Substituindo na equação acima, obtemos

$$An2^n - 3A(n-1)2^{n-1} + 2A(n-2)2^{n-2} = 2^n,$$

o que é equivalente a

$$2 = 2An - 3A(n-1) + A(n-2) = A.$$

Logo, uma solução da equação de recorrência acima é $(n2^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemplo

Assim, sabemos que a solução geral da equação

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

é dada por $(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemplo

Assim, sabemos que a solução geral da equação

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

é dada por $(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

Finalmente, procuramos aquele que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

Um exemplo (continuação)

Exemplo

Assim, sabemos que a solução geral da equação

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

é dada por $(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

Finalmente, procuramos aquele que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$. Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ obtemos as equações

$$\begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta + 4 \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -6 & = & \alpha + 2\beta \end{array}.$$

Um exemplo (continuação)

Exemplo

Assim, sabemos que a solução geral da equação

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

é dada por $(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

Finalmente, procuramos aquele que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$. Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ obtemos as equações

$$\begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta + 4 \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -6 & = & \alpha + 2\beta \end{array}.$$

Subtraindo a primeira linha à segunda dá $\beta = -6$ e por isso $\alpha = 6$.

Um exemplo (continuação)

Exemplo

Assim, sabemos que a solução geral da equação

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

é dada por $(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

Finalmente, procuramos aquele que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$. Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ obtemos as equações

$$\begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta + 4 \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -6 & = & \alpha + 2\beta \end{array}.$$

Subtraindo a primeira linha à segunda dá $\beta = -6$ e por isso $\alpha = 6$.
Portanto, a solução é

$$(6 - 6 \cdot 2^n + n2^{n+1})_{n \in \mathbb{N}}.$$

Teorema

Seja

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n^{(1)} + \cdots + d_n^{(m)} \quad (*)$$

uma equação de recorrência linear e suponhamos que as sucessões $b^{(1)}, b^{(2)}, \dots, b^{(m)}$ são soluções de

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n^{(1)}$$

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n^{(2)}$$

$$\vdots$$

$$x_n = c_1 x_{n-1} + c_2 x_{n-2} + \cdots + c_k x_{n-k} + d_n^{(m)}$$

respetivamente. Então, a sucessão $b^{(1)} + \cdots + b^{(m)}$ é uma solução de (*).

Mais um exemplo

Exemplo

Vamos agora determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n + (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

Exemplo

Vamos agora determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n + (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

A solução geral desta equação (ignorando as condições iniciais) é da forma

$$(a_n + b_n^{(1)} + b_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$$

Mais um exemplo

Exemplo

Vamos agora determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n + (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

A solução geral desta equação (ignorando as condições iniciais) é da forma

$$(a_n + b_n^{(1)} + b_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$$

onde $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ denota a solução geral da equação homogénea associada,

Exemplo

Vamos agora determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n + (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

A solução geral desta equação (ignorando as condições iniciais) é da forma

$$(a_n + b_n^{(1)} + b_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$$

onde $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ denota a solução geral da equação homogênea associada, $(b_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}}$ é uma solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots,$$

Mais um exemplo

Exemplo

Vamos agora determinar a solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n + (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

com $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

A solução geral desta equação (ignorando as condições iniciais) é da forma

$$(a_n + b_n^{(1)} + b_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$$

onde $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ denota a solução geral da equação homogênea associada, $(b_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}}$ é uma solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n, \quad n = 2, 3, \dots,$$

e $(b_n^{(2)})_{n \in \mathbb{N}}$ é uma solução da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

Falta determinar *uma solução* da equação de recorrência

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

Falta determinar *uma solução* da equação de recorrência

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

Uma vez que $1 + n$ é um polinómio de grau 1 e 1 é raiz de multiplicidade 1 da equação característica

$$0 = q^2 - 3q + 2 = (q - 2)(q - 1),$$

consideramos $b_n^{(2)} = (A_0 + A_1 n)n^1 = A_0 n + A_1 n^2$.

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

Falta determinar *uma solução* da equação de recorrência

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

Uma vez que $1 + n$ é um polinómio de grau 1 e 1 é raiz de multiplicidade 1 da equação característica

$$0 = q^2 - 3q + 2 = (q - 2)(q - 1),$$

consideramos $b_n^{(2)} = (A_0 + A_1 n)n^1 = A_0 n + A_1 n^2$. Substituindo na equação acima, obtemos $b_n^{(2)} = -\frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2$.

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

Falta determinar *uma solução* da equação de recorrência

$$x_n - 3x_{n-1} + 2x_{n-2} = (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

Uma vez que $1 + n$ é um polinómio de grau 1 e 1 é raiz de multiplicidade 1 da equação característica

$$0 = q^2 - 3q + 2 = (q - 2)(q - 1),$$

consideramos $b_n^{(2)} = (A_0 + A_1 n)n^1 = A_0 n + A_1 n^2$. Substituindo na equação acima, obtemos $b_n^{(2)} = -\frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2$.

Portanto, a solução geral da equação de recorrência

$$x_n = 3x_{n-1} - 2x_{n-2} + 2^n + (1 + n), \quad n = 2, 3, \dots$$

é dada por $(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1} - \frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$).

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

Finalmente, procuramos aquele solução que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$.

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

Finalmente, procuramos aquele solução que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$. Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ em

$$(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1} - \frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2)_{n \in \mathbb{N}}$$

obtemos as equações

$$\begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta + 4 - \frac{7+1}{2} \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta \end{array} ;$$

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

Finalmente, procuramos aquela solução que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$. Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ em

$$(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1} - \frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2)_{n \in \mathbb{N}}$$

obtemos as equações

$$\begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta + 4 - \frac{7+1}{2} \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta \end{array} ;$$

logo $\beta = -2$ e $\alpha = 2$.

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

Finalmente, procuramos aquela solução que satisfaz as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$. Portanto, para $n = 0$ e $n = 1$ em

$$(\alpha + \beta 2^n + n2^{n+1} - \frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2)_{n \in \mathbb{N}}$$

obtemos as equações

$$\begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta + 4 - \frac{7+1}{2} \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{rcl} 0 & = & \alpha + \beta \\ -2 & = & \alpha + 2\beta \end{array} ;$$

logo $\beta = -2$ e $\alpha = 2$.

Logo, a solução da equação de recorrência dada com as condições iniciais $x_0 = 0$ e $x_1 = -2$ é

$$(2 - 2 \cdot 2^n + n2^{n+1} - \frac{7}{2}n - \frac{1}{2}n^2)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Equações de recorrência não lineares

Equações de recorrência não lineares

O problema

Nesta parte consideramos equações de recorrência onde x_n não depende da forma linear dos termos x_{n-1}, \dots, x_{n-k} .

Equações de recorrência não lineares

O problema

Nesta parte consideramos equações de recorrência onde x_n não depende da forma linear dos termos x_{n-1}, \dots, x_{n-k} . Em muitos casos podemos “linearizar” a equação utilizando uma substituição adequada.

Equações de recorrência não lineares

O problema

Nesta parte consideramos equações de recorrência onde x_n não depende da forma linear dos termos x_{n-1}, \dots, x_{n-k} . Em muitos casos podemos “linearizar” a equação utilizando uma substituição adequada.

Exemplo (Substituição “simples”)

Consideramos a equação de recorrência não linear

$$x_n^2 = 2x_{n-1}^2 + 1 \quad (n \geq 1),$$

com a condição inicial $x_0 = 2$; aqui suponhamos $x_n \geq 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Equações de recorrência não lineares

O problema

Nesta parte consideramos equações de recorrência onde x_n não depende da forma linear dos termos x_{n-1}, \dots, x_{n-k} . Em muitos casos podemos “linearizar” a equação utilizando uma substituição adequada.

Exemplo (Substituição “simples”)

Consideramos a equação de recorrência não linear

$$x_n^2 = 2x_{n-1}^2 + 1 \quad (n \geq 1),$$

com a condição inicial $x_0 = 2$; aqui suponhamos $x_n \geq 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Escrevendo $y_n = x_n^2$, esta equação de recorrência não linear transforma-se na equação de recorrência linear

$$y_n = 2y_{n-1} + 1 \quad (n \geq 1),$$

com a condição inicial $y_0 = x_0^2 = 4$.

Exemplo (continuação)

Exemplo

$$y_n = 2y_{n-1} + 1 \quad (n \geq 1), \quad y_0 = 4.$$

Exemplo (continuação)

Exemplo

$$y_n = 2y_{n-1} + 1 \quad (n \geq 1), \quad y_0 = 4.$$

- A solução geral da equação homogénea associada $y_n = 2y_{n-1}$ é dada por $c \cdot (2^n)_{n \in \mathbb{N}}$, $c \in \mathbb{R}$.

Exemplo (continuação)

Exemplo

$$y_n = 2y_{n-1} + 1 \quad (n \geq 1), \quad y_0 = 4.$$

- A solução geral da equação homogénea associada $y_n = 2y_{n-1}$ é dada por $c \cdot (2^n)_{n \in \mathbb{N}}$, $c \in \mathbb{R}$.
- Como o termo “não homogéneo” é o polinómio de grau zero 1, e como 1 não é raiz do polinómio característico $q - 2$, sabemos que existe uma solução particular $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ onde $b_n = A$, para todo o $n \in \mathbb{N}$. Substituindo na equação produz $A = 2A + 1$, ou seja, $A = -1$.

Exemplo (continuação)

Exemplo

$$y_n = 2y_{n-1} + 1 \quad (n \geq 1), \quad y_0 = 4.$$

- A solução geral da equação homogénea associada $y_n = 2y_{n-1}$ é dada por $c \cdot (2^n)_{n \in \mathbb{N}}$, $c \in \mathbb{R}$.
- Como o termo “não homogéneo” é o polinómio de grau zero 1, e como 1 não é raiz do polinómio caraterístico $q - 2$, sabemos que existe uma solução particular $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ onde $b_n = A$, para todo o $n \in \mathbb{N}$. Substituindo na equação produz $A = 2A + 1$, ou seja, $A = -1$.
- Consequentemente, as soluções desta equação de recorrência são precisamente as sucessões $(c \cdot 2^n - 1)_{n \in \mathbb{N}}$, com $c \in \mathbb{R}$. Tendo em conta a condição inicial $y_0 = 4$, obtemos $c = 5$; assim, a solução da equação $x_n^2 = 2x_{n-1}^2 + 1$ com $x_0 = 2$ é a sucessão

$$(\sqrt{5 \cdot 2^n - 1})_{n \in \mathbb{N}}.$$

Utilizar o “linearizator”

Recordamos que,

para cada $a \in \mathbb{R}^+$, a função $\log_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaz

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y), \quad \log_a(1) = 0.$$

Utilizar o “linearizator”

Recordamos que,

para cada $a \in \mathbb{R}^+$, a função $\log_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaz

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y), \quad \log_a(1) = 0.$$

Portanto, em muitos exemplos podemos “linearizar” passando para o logaritmo.

Utilizar o “linearizator”

Recordamos que,

para cada $a \in \mathbb{R}^+$, a função $\log_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaz

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y), \quad \log_a(1) = 0.$$

Portanto, em muitos exemplos podemos “linearizar” passando para o logaritmo.

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência não linear

$$x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad x_0 = x_1 = 2.$$

Logo, $x_n > 0$ para todo o $n \in \mathbb{N}$.

Utilizar o “linearizator”

Recordamos que,

para cada $a \in \mathbb{R}^+$, a função $\log_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaz

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y), \quad \log_a(1) = 0.$$

Portanto, em muitos exemplos podemos “linearizar” passando para o logaritmo.

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência não linear

$$x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad x_0 = x_1 = 2.$$

Logo, $x_n > 0$ para todo o $n \in \mathbb{N}$. Estas equações são equivalentes às equações (para $n \geq 2$)

$$\log_2(x_n) = \log_2(x_{n-1}) + \log_2(x_{n-2}), \quad \log_2(x_0) = \log_2(x_1) = 1.$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência não linear

$$x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad x_0 = x_1 = 2.$$

Logo, $x_n > 0$ para todo o $n \in \mathbb{N}$. Estas equações são equivalentes às equações (para $n \geq 2$)

$$\log_2(x_n) = \log_2(x_{n-1}) + \log_2(x_{n-2}), \quad \log_2(x_0) = \log_2(x_1) = 1.$$

Fazendo $y_n = \log_2(x_n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, obtemos a equação de recorrência linear

$$y_n = y_{n-1} + y_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad y_0 = y_1 = 1;$$

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência não linear

$$x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad x_0 = x_1 = 2.$$

Logo, $x_n > 0$ para todo o $n \in \mathbb{N}$. Estas equações são equivalentes às equações (para $n \geq 2$)

$$\log_2(x_n) = \log_2(x_{n-1}) + \log_2(x_{n-2}), \quad \log_2(x_0) = \log_2(x_1) = 1.$$

Fazendo $y_n = \log_2(x_n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, obtemos a equação de recorrência linear

$$y_n = y_{n-1} + y_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad y_0 = y_1 = 1;$$

cujas solução é a sucessão $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos números de Fibonacci.

Exemplo

Consideramos a equação de recorrência não linear

$$x_n = x_{n-1} \cdot x_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad x_0 = x_1 = 2.$$

Logo, $x_n > 0$ para todo o $n \in \mathbb{N}$. Estas equações são equivalentes às equações (para $n \geq 2$)

$$\log_2(x_n) = \log_2(x_{n-1}) + \log_2(x_{n-2}), \quad \log_2(x_0) = \log_2(x_1) = 1.$$

Fazendo $y_n = \log_2(x_n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, obtemos a equação de recorrência linear

$$y_n = y_{n-1} + y_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad y_0 = y_1 = 1;$$

cuja solução é a sucessão $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos números de Fibonacci.

Portanto, a solução da equação acima com as condições iniciais é

$$(2^{F_n})_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exemplo

Consideramos agora a equação de recorrência não linear

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + \sqrt{x_{n-2} + \sqrt{x_{n-3} + \sqrt{\dots \sqrt{x_0}}}}}$$

com a condição inicial $x_0 = 4$.

Exemplo

Consideramos agora a equação de recorrência não linear

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + \sqrt{x_{n-2} + \sqrt{x_{n-3} + \sqrt{\dots \sqrt{x_0}}}}}$$

com a condição inicial $x_0 = 4$. Portanto, $x_1 = \sqrt{x_0} = 2$,

Mais um exemplo

Exemplo

Consideramos agora a equação de recorrência não linear

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + \underbrace{\sqrt{x_{n-2} + \sqrt{x_{n-3} + \sqrt{\dots \sqrt{x_0}}}}_{x_{n-1}}}$$

com a condição inicial $x_0 = 4$. Portanto, $x_1 = \sqrt{x_0} = 2$, e para $n \geq 2$ temos

Mais um exemplo

Exemplo

Consideramos agora a equação de recorrência não linear

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + \underbrace{\sqrt{x_{n-2} + \sqrt{x_{n-3} + \sqrt{\dots \sqrt{x_0}}}}_{x_{n-1}}}$$

com a condição inicial $x_0 = 4$. Portanto, $x_1 = \sqrt{x_0} = 2$, e para $n \geq 2$ temos

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + x_{n-1}} > 0;$$

Mais um exemplo

Exemplo

Consideramos agora a equação de recorrência não linear

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + \underbrace{\sqrt{x_{n-2} + \sqrt{x_{n-3} + \sqrt{\dots \sqrt{x_0}}}}_{x_{n-1}}}$$

com a condição inicial $x_0 = 4$. Portanto, $x_1 = \sqrt{x_0} = 2$, e para $n \geq 2$ temos

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + x_{n-1}} > 0;$$

ou seja $x_n^2 = 2x_{n-1}$ ($n \geq 2$);

Mais um exemplo

Exemplo

Consideramos agora a equação de recorrência não linear

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + \underbrace{\sqrt{x_{n-2} + \sqrt{x_{n-3} + \sqrt{\dots \sqrt{x_0}}}}_{x_{n-1}}}$$

com a condição inicial $x_0 = 4$. Portanto, $x_1 = \sqrt{x_0} = 2$, e para $n \geq 2$ temos

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + x_{n-1}} > 0;$$

ou seja $x_n^2 = 2x_{n-1}$ ($n \geq 2$); o que é equivalente a

$$2 \log_2(x_n) = 1 + \log_2(x_{n-1}) \quad (n \geq 2).$$

Mais um exemplo

Exemplo

Consideramos agora a equação de recorrência não linear

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + \underbrace{\sqrt{x_{n-2} + \sqrt{x_{n-3} + \sqrt{\dots \sqrt{x_0}}}}_{x_{n-1}}}$$

com a condição inicial $x_0 = 4$. Portanto, $x_1 = \sqrt{x_0} = 2$, e para $n \geq 2$ temos

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} + x_{n-1}} > 0;$$

ou seja $x_n^2 = 2x_{n-1}$ ($n \geq 2$); o que é equivalente a

$$2 \log_2(x_n) = 1 + \log_2(x_{n-1}) \quad (n \geq 2).$$

Fazendo $y_n = \log_2(x_n)$, obtemos a equação de recorrência linear $y_n = \frac{1}{2}y_{n-1} + \frac{1}{2}$ ($n \geq 2$) com a condição inicial $y_1 = 1$.

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

$$y_n = \frac{1}{2}y_{n-1} + \frac{1}{2} \quad (n \geq 2), \quad y_1 = 1 \quad (y_n = \log_2(x_n)).$$

A solução geral da equação de recorrência (ignorando a condição inicial) é dado por

$$(c(\frac{1}{2})^n + 1)_{n \geq 1} \quad (c \in \mathbb{R}).$$

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

$$y_n = \frac{1}{2}y_{n-1} + \frac{1}{2} \quad (n \geq 2), \quad y_1 = 1 \quad (y_n = \log_2(x_n)).$$

A solução geral da equação de recorrência (ignorando a condição inicial) é dado por

$$(c\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1)_{n \geq 1} \quad (c \in \mathbb{R}).$$

Utilizando a condição inicial $y_1 = 1$ obtemos

$$1 = c\left(\frac{1}{2}\right) + 1;$$

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

$$y_n = \frac{1}{2}y_{n-1} + \frac{1}{2} \quad (n \geq 2), \quad y_1 = 1 \quad (y_n = \log_2(x_n)).$$

A solução geral da equação de recorrência (ignorando a condição inicial) é dado por

$$(c\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1)_{n \geq 1} \quad (c \in \mathbb{R}).$$

Utilizando a condição inicial $y_1 = 1$ obtemos

$$1 = c\left(\frac{1}{2}\right) + 1;$$

logo, $c = 0$.

Mais um exemplo (continuação)

Exemplo

$$y_n = \frac{1}{2}y_{n-1} + \frac{1}{2} \quad (n \geq 2), \quad y_1 = 1 \quad (y_n = \log_2(x_n)).$$

A solução geral da equação de recorrência (ignorando a condição inicial) é dado por

$$(c(\frac{1}{2})^n + 1)_{n \geq 1} \quad (c \in \mathbb{R}).$$

Utilizando a condição inicial $y_1 = 1$ obtemos

$$1 = c(\frac{1}{2}) + 1;$$

logo, $c = 0$. Portanto, para todo o $n \geq 1$,

$$x_n = 2^{y_n} = 2,$$

e $x_0 = 4$.

Ainda mais um exemplo

Exemplo

Finalmente, consideramos a equação de recorrência (linear mas não com coeficientes constantes)

$$x_n = n \cdot 2 \cdot x_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Ainda mais um exemplo

Exemplo

Finalmente, consideramos a equação de recorrência (linear mas não com coeficientes constantes)

$$x_n = n \cdot 2 \cdot x_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Com $x_n = n! \cdot y_n$, a equação acima é equivalente a

$$n! \cdot y_n = 2 \cdot n \cdot (n-1)! \cdot y_{n-1} = 2 \cdot n! \cdot y_{n-1},$$

Ainda mais um exemplo

Exemplo

Finalmente, consideramos a equação de recorrência (linear mas não com coeficientes constantes)

$$x_n = n \cdot 2 \cdot x_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Com $x_n = n! \cdot y_n$, a equação acima é equivalente a

$$n! \cdot y_n = 2 \cdot n \cdot (n-1)! \cdot y_{n-1} = 2 \cdot n! \cdot y_{n-1},$$

o que é equivalente a $y_n = 2 \cdot y_{n-1}$, para todo o $n \geq 1$.

Ainda mais um exemplo

Exemplo

Finalmente, consideramos a equação de recorrência (linear mas não com coeficientes constantes)

$$x_n = n \cdot 2 \cdot x_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Com $x_n = n! \cdot y_n$, a equação acima é equivalente a

$$n! \cdot y_n = 2 \cdot n \cdot (n-1)! \cdot y_{n-1} = 2 \cdot n! \cdot y_{n-1},$$

o que é equivalente a $y_n = 2 \cdot y_{n-1}$, para todo o $n \geq 1$. Portanto, a solução geral da equação acima é dada por

$$(n! \cdot c \cdot 2^n)_{n \in \mathbb{N}} \quad (c \in \mathbb{R}).$$