
Distribuciones antes de imputar




Solo valores observados.
Eje vertical logarítmico.
Línea punteada: referencia = 1.
Puntos: muestras/condiciones.
Cajas: Q1–Q3 y mediana.
Bigotes: hasta 1,5 IQR.
Escalas distintas entre metabolitos.
MMC2 incluye la fila de referencia.


Patrones por muestra y metabolito
Gris = faltante; línea negra separa Ishii y MMC2


KO01
KO02
KO03
KO04
KO05
KO05x
KO06
KO07
KO08
KO09
KO10
KO11
KO12
KO13
KO14
KO15
KO16
KO17
KO18
KO19
KO20
KO21
KO22
KO23
KO24
RF02
RF03
RF04
RF05
RF06
MMC2_ACETATE
MMC2_FRUCTOSE
MMC2_GALACTOSE
MMC2_GLUCONATE
MMC2_GLUCOSE
MMC2_GLYCEROL
MMC2_PYRUVATE
MMC2_SUCCINATE

Fumarato
PEP
s7p
Succinato
Piruvato
α-cetoglutarato
Citrato

8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
log₂(ratio): 0 = referencia; +1 = doble; −1 = mitad


Cobertura por metabolito
Etiquetas = número de valores medidos
Ishii
MMC2
Cobertura (%)
0
20
40
60
80
100
23
8
22
8
29
8
27
7
14
7
11
8
12
8
Fumarato
PEP
s7p
Succinato
Piruvato
α-cetoglutarato
Citrato


Información disponible por muestra
Número de muestras Ishii
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
Metabolitos observados de 7


Asociaciones exploratorias dentro de Ishii
Pares observados; mínimo 8 pares; sin imputación
Fumarato
PEP
s7p
Succinato
Piruvato
α-cetoglutarato
Citrato
1.00 n=23
-0.12 n=22
0.51 n=23
0.23 n=22
0.14 n=14
0.04 n=11
0.50 n=10
-0.12 n=22
1.00 n=22
-0.02 n=22
0.47 n=21
0.20 n=13
0.08 n=11
-0.02 n=10
0.51 n=23
-0.02 n=22
1.00 n=29
0.10 n=27
0.21 n=14
0.45 n=11
-0.16 n=12
0.23 n=22
0.47 n=21
0.10 n=27
1.00 n=27
0.68 n=13
-0.05 n=11
-0.56 n=12
0.14 n=14
0.20 n=13
0.21 n=14
0.68 n=13
1.00 n=14
— n=7
0.23 n=9
0.04 n=11
0.08 n=11
0.45 n=11
-0.05 n=11
— n=7
1.00 n=11
— n=5
0.50 n=10
-0.02 n=10
-0.16 n=12
-0.56 n=12
0.23 n=9
— n=5
1.00 n=12
ρ de Spearman
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00