

Ficha Visual – Valores de Referência em Avaliação Nutricional

Glicemia e Perfil Lipídico

- **Glicemia jejum:** <100 mg/dL (normal), 100–125 = pré-DM, ≥126 = DM
- **HbA1c:** <5,7% (normal), 5,7–6,4% = pré-DM, ≥6,5% = DM
- **CT:** <190 mg/dL - Aumento do risco cardiovascular
- **TG:** <150 mg/dL - Relacionado à síndrome metabólica, risco de pancreatite em níveis muito altos
- **HDL:** >40 mg/dL (H), >50 mg/dL (M) - Perda de proteção cardiovascular
- **LDL:** <130 mg/dL (geral), <70 mg/dL (alto risco) - risco de aterosclerose e eventos cardíacos (Aterogênico).

Hemograma – Indicadores de Anemia

- **VCM:** 80–100 fL - Suspeita de anemia ferropriva
- **HCM:** 27–32 pg - Menos hemoglobina nas hemácias → anemia ferropriva
- **CHCM:** 31–36 g/dL - anemia por deficiência de ferro
- **RDW:** 11,5–14,5% - Hemácias de tamanhos variados

Antropometria

- **IMC adulto:** 18,5–24,9 | IMC idoso: 22–27
- **CC risco:** >88 cm (M) | >102 cm (H) - Risco cardiovascular aumentado
- **RCQ risco:** >0,85 (M) | >1,0 (H) - Indica distribuição central da gordura, risco de doenças crônicas
- **CP risco:** <33 cm (M) | <34 cm (H) - Sarcopenia, desnutrição proteico-calórica

Bioimpedância

- **AIC:** >55% (massa magra adequada) - risco de sarcopenia
- **AEC:** <45% (retenção hídrica controlada) – sinal de inflamação, desnutrição
- **Ângulo de fase (AF):** >5° (bom) | <4° (risco elevado) – inflamação
- **%MG:** Homens <25%, Mulheres <32% - Obesidade, inflamação crônica

Massa Muscular e Imunidade

- **CMB:** >90% do P50 (normal) - Sarcopenia, risco de desnutrição
- **AMBc:** >P15 = ok | <P5 = risco nutricional - Perda de massa magra, baixa reserva proteica
- **ICA:** >10,4 mg/cm (H) | >8,8 mg/cm (M) - Alta probabilidade de desnutrição proteica
- **CTL:** >2000 = normal | 1200–2000 = leve | <1200 = moderada a grave - Imunossupressão, risco de infecção

Inflamação e Desnutrição

- **PCR:** <5 mg/L (normal), >10 mg/L (inflamação aguda) - ↑ Inflamação aguda ou crônica
- **Albumina:** >3,5 g/dL (normal), mas cai com inflamação - ↓ Edema, cicatrização lenta, risco de desnutrição proteica