Anemia Falciforme

- Tipo de anemia hemolítica crônica

Hemocatereze → hemácia morre de causa fisiológica depois de 120 dias
Hemólise → hemácia morre por uma doença

Forma hemoglobina HbS

- Portadores de hemoglobina S para desenvolver a falciforme se passa por 3 processos
Acidose e/ou desidratação, desoxigenação
Precisa ter um desses 3 para realizar polimeração (quando as hemoglobinas ficam enfileiradas na hemácia e ai fica em formato de foice

Para ter um dos 3 fatores precisa acontecer algumas coisas

O problema da polimeracao não é apenas o formato, ela tem mais tendencia a ruptura e tem dificuldade de passar pelos capilares e ela fica grudenta e faz um fluxo turbilhonar → com isso acontece hemólise e vaso oclusão → gera lesão endotelial

Até os 6 meses mesmo se a criança tiver o HbS ela é assintomática, pois, as hemácias são as fetais → após 6 meses começa a predominar a beta S e se tem crises agudas

Acidose e/ou desidratação, desoxigenação provoca a tendencia a vaso oclusão por trombose → isso se chama Tríade Virchow

Crises agudas
Síndrome mão- pé → ocorre entre os 6 meses a 2-3 anos onde ocorre polimerização dentro da medula óssea.
- Acontece um vaso oclusão da medula óssea → isquemia do osso da criança → gera inflamação → mas esse osso é muito poroso então a inflamação é capaz de extravasar e pega principalmente nos dedos das mãos e dos pés. Ai a inflamação dentro do osso poroso extravasa e aí provoca edema nas mãos e pés → isso se chama dor + edema
Dactilite
De 3 anos para frente não tem mais a extravasamento pois o osso já não é tão poroso → Aí a inflamação não extravasa. Se tem dor também → Crise óssea
→ A radiografia se apresenta sem mudanças nas duas na crise óssea e a mao pé

Sequestro esplênicos
→ apenas em crianças menos de 5 anos
→ Baço é muito esmolar
→ hemácia quando passa pelo baço tem polimerização na veia → então começa a entupir a veia esplênica → mas continua chegando na artéria esplênica → então entra sangue mais não começa a sair → baço que já é distensivo ele começa a ficar maior ainda e ficar com muito sangue nele, pois a artéria continua funcionando mas a veia não → então o baço sequestra mais sangue dentro dele → inicio de uma anemia → medula tenta compensar

→ É com menos de 5 anos pois o baço ele consegue distender, e ai consegue acontecer esse sequestro
→ Pode acontecer no pulmão e fígado

Quando a hemácia chega polimerizada no pulmão ela recebe O2 e volta ao normal → depois de 15 dias, essa hemácia que chega em formato de foice e volta ao normal
Depois de 15 dias da hemácia recebe o O2 mas não volta ao normal
Depois de 15 dias de vida da hemácia ela chega em formato de foice no pulmão recebe O2, mas não volta ao normal → aí fica em foice até morrer → ai ela vai para o baço → passa divagar e grudenta → mata um pouco do baço e vai causando isquemia e necrose. Ela vai encalhando em diferentes veias, arteríolas do baço
Ai com 5 anos já teve muita isquemia e necrose no baço → esse baço fibrosa → ai ele não distende mais e não sequestra mais hemácias → esse processo de morte do baço é chamado de autoesplenectomia

Osteomelite → salmonela
Uma pessoa com falciforme se ela apresenta febre ela precisa ser internada, pois o risco é de sepse pois o baço está sendo fibrosado pelo autoesplenectomia e sem baço que é linfático (sistema imune- resposta imune está prejudicada)
- Criança precisa ser bem vacinada e toma penicilina

Síndrome toráxica aguda
- Tem polimerização dentro do pulmão
- Ela encalha no pulmão depois de seus 15 dias que não volt ao normal e começa a polimerizar ainda mais
- Infiltrado pulmonar + um achado pneumônico
- Achado pneumônico → febre, tosse, dor toráxica, purulência e dispneia)
- Infecção pulmonar pode gerar síndrome torácica aguda
- Se só tratar a pneumonia a pessoa morre

Tratamento