#### FEUP - MIEIC

NOME:\_\_\_\_\_\_LOG-IN FEUP:\_\_\_\_\_


Exame final 16 de Junho de 2011

**Duração**: Duas horas. Com consulta de formulário e utilização de meios de cálculo. Note que os meios de cálculo não podem ser usados como meios de comunicação ou de consulta da matéria! A violação desta regra implica exclusão imediata. Use  $g=9.8~\mathrm{m/s^2}$  para a aceleração da gravidade.

1. (4 valores) O sistema dinâmico com equações de evolução:  $\dot{x} = -x + 4y - y^3$   $\dot{y} = -y + 4x - x^3$  tem nove pontos de equilíbrio. As coordenadas (x, y) de dois desses pontos são:

 $P_1 = (-\sqrt{5}, \sqrt{5})$   $P_2 = ((\sqrt{3} - 2)\sqrt{2 + \sqrt{3}}, -\sqrt{2 + \sqrt{3}})$ 

- (a) Diga que tipo de pontos de equilíbrio são  $P_1$  e  $P_2$ . (b) Escreva as equações de evolução do sistema linear que aproxima o sistema na vizinhança do ponto  $P_1$ .
- 2. (4 valores) Um atleta com massa de 91 kg puxa um camião numa estrada horizontal, com velocidade constante, por meio de uma corda amarrada às suas costas. A figura mostra as posições relativas do centro de gravidade do atleta, C, do ponto de apoio do seu pé com o chão, A, e do ponto de ligação com a corda, B. (a) Calcule o módulo da tensão na corda. (b) Desenhe um diagrama com as forças que julga que poderão estar a atuar no camião.



**PERGUNTAS**. Cotação: Respostas certas, 0.8, erradas, -0.2, em branco, 0. Cada pergunta tem uma única resposta. Serão avaliadas apenas as respostas que apareçam na caixa de **Resposta** (e não na folha de exame ou de rascunho).

- 3. Um aluno empurra um bloco de massa 900 g, sobre uma mesa horizontal com uma aceleração constante de 1.9 m/s². A força que o aluno exerce é horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa é 0.7, calcule o módulo da força do aluno sobre o bloco.
  - (**A**) 7.88 N
- (C) 78.84 N
- (E) 15.77 N

- (**B**) 19.71 N
- (**D**) 4.46 N

Resposta:

- 4. Um campo de futebol tem 70 m de largura e 115 m de comprimento. No início de um jogo, a bola foi colocada no centro do campo e passados 3 minutos foi colocada num canto. Calcule o módulo da velocidade média nesse intervalo.
  - (A) 0.194 m/s
- (**D**) 0.748 m/s
- **(B)** 0.319 m/s
- (**E**) 0.374 m/s
- (C) 1.028 m/s
- \_ \_

Resposta:

5. O comando

a:rk([f,g],[y,z],[0,1],[x,0,1.6,0.1])

do Maxima foi usado para resolver numericamente um

- sistema de equações. Qual será o resultado do comando length(a)?
- (A) 17
- **(C)** 1

**(E)** 16

**(B)** 2

**(D)** 3

Resposta:

- 6. As equações  $\dot{x}=x(2+y),\,\dot{y}=y(2+x)$  definem um sistema:
  - (A) Linear.
  - (B) Conservativo.
  - (C) De duas espécies com cooperação.
  - (**D**) De duas espécies com competição.
  - (E) Presa-predador.

Resposta:


- 7. Uma partícula desloca-se ao longo do eixo dos x com uma aceleração que aumenta em função do tempo:  $a=5\,t$  (unidades SI). No instante t=0, a partícula encontra-se em repouso no ponto x=8 m. Calcule a posição da partícula em t=6 s.
  - (**A**) 564.0 m
- (C) 94.0 m
- (E) 188.0 m

- **(B)** 470.0 m
- (**D**) 1165.6 m

Resposta:

8.	O comando a:rk([f,g],[y,z],[0,1],[x,0,1,0.1]) do Maxima foi usado para resolver numericamente um sis tema de equações. Qual dos comandos seguintes produz uma lista com os valores de z?
	<pre>(A) makelist(a[3][i],i,1,11) (B) makelist(a[i][3],i,1,11) (C) makelist(a[i][1],i,1,11) (D) makelist(a[i][2],i,1,11) (E) makelist(a[1][i],i,1,11) Resposta:</pre>
a	Um camião com massa total do 1300 kg acolora dosdo o

9. Um camião com massa total de 1300 kg acelera desde o repouso até uma velocidade de 25 km/h numa distância de 100 m, ao longo de uma rampa com declive constante de 20% (em cada 10 metros na horizontal, a rampa sobe 2 metros). Calcule o trabalho realizado pelas forças de atrito.



- (A) 218.5 kJ
- (C) -31.3 kJ
- **(E)** -218.5 kJ

- (**B**) 281.2 kJ
- (**D**) 249.9 kJ

### Resposta:

- 10. Um sistema dinâmico com duas variáveis de estado tem exactamente dois pontos de equilíbrio, P e Q. O ponto P é ponto de sela e o ponto Q é foco repulsivo. Qual das seguintes afirmações sobre o sistema é verdadeira?
  - (A) Pode existir uma órbita homoclínica.
  - (B) O sistema pode ser linear.
  - (C) Podem existir ciclos.
  - (D) Pode existir uma órbita heteroclínica.
  - $(\mathbf{E})$  O sistema pode estar em estado de equilíbrio estável.

# Resposta:

- 11. Um piloto de corridas de aviões, com 105 kg, executa um loop vertical de 900 m de raio, com velocidade constante em módulo. Sabendo que a força exercida no piloto pela base do assento do avião é igual a 2572 N, no ponto mais baixo do loop, calcule a mesma força no ponto mais alto do loop.
  - (A) 2572.0 N
- (C) 257.0 N
- **(E)** 1028.5 N

- (**B**) 1543.0 N
- (**D**) 514.0 N


## Resposta:

- 12. Se o ponto de equilíbrio de um sistema linear for um foco atrativo, o que podemos concluir acerca do traço, T, ou o determinante, D, da matriz do sistema?
  - (A) T < 0
- (C) D < 0
- **(E)** T > 0

- **(B)** T = 0
- **(D)** D = 0

## Resposta:

13. Na figura, a força  $\vec{F}$  é horizontal e constante, com módulo igual a 32 N. As massas dos dois blocos são  $m_1=9~{\rm kg}$  e  $m_2=63~{\rm kg}$ . Os dois blocos aceleram sobre a superfície horizontal. Calcule o módulo da força que o bloco do lado esquerdo exerce sobre o bloco do lado direito.



- (**A**) 0
- (C) 4 N
- (E) 28 N

- (**B**) 24 N
- (**D**) 32 N

### Resposta:

**14.** De acordo com o critério de Bendixson, qual dos seguintes sistemas dinâmicos não pode ter nenhuma órbita fechada (ciclo, órbita homoclínica ou órbita heteroclínica)?

(A) 
$$\dot{x} = 3x^2 + y^2$$
  $\dot{y} = x^2 - y^2$ 

**(B)** 
$$\dot{x} = 3x^3 + y^2$$
  $\dot{y} = x^2y - y$ 

(C) 
$$\dot{x} = 3x + y^2$$
  $\dot{y} = x^2 + y^2$ 

**(D)** 
$$\dot{x} = 3x + y^2$$
  $\dot{y} = x^3y - y$ 

**(E)** 
$$\dot{x} = 3x^3 + y^2$$
  $\dot{y} = y - yx^2$ 

### Resposta:

15. A matriz de um sistema dinâmico linear é:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$

Se A for a trajectória que passa pelo ponto (0,1) no espaço de fase e B for a trajectória que passa pelo ponto (1,0), podemos afirmar que a origem é:

- (A) Conjunto limite negativo de A e de B.
- (B) Conjunto limite positivo e negativo de A.
- (C) Conjunto limite positivo de A e limite negativo de B.
- (D) Conjunto limite negativo de A e limite positivo de B.
- (E) Conjunto limite positivo de A e de B.

Resposta:

- **16.** A força resultante sobre uma partícula que se desloca no eixo dos x é F=(x+1)(x-1)(3-x). Qual das seguintes afirmações é verdadeira, em relação aos pontos de equilíbrio da partícula?
  - (A) x = 1 é estável e x = 3 é instável.
  - (B) x = -1 é estável e x = 3 é instável.
  - (C) x = -1 é instável e x = 3 é estável.
  - (**D**) x = -1 e x = 1 são instáveis.
  - (E) x = 1 é instável e x = 3 é estável.

Resposta:

17. A matriz jacobiana de um sistema dinâmico com variáveis de estado (x, y), é:

 $\left[\begin{array}{cc} y & x-1 \\ y+1 & x \end{array}\right]$ 

Sabendo que (0, 0) é ponto de equilíbrio do sistema, determine que tipo de ponto é.


- (A) ponto de sela
- (D) nó atractivo
- (B) centro
- (E) foco repulsivo
- (C) nó repulsivo

Resposta:

e, portanto, a tensão na corda é:

$$T = \frac{0.52 \times 891.8}{0.91\cos(15^\circ) - 0.19T\sin(15^\circ)} = 559 \text{ N}$$

(b) As forças sobre o camião são a tensão na corda, o peso total do camião e da sua carga e as reações normais e forças de atrito nos pneus. A direção e sentido dessas forças está indicado no diagrama seguinte:



O atrito é estático e aponta na direção oposta ao movimento, porque nenhuma das rodas tem tração. A força da resistência do ar for desprezada, porque a velocidade deverá ser muito baixa, mas se fosse considerada teria a mesma direção e sentido das forças de atrito.

### **Perguntas**

**3.** A

**6.** C

**9.** B

**12.** A

**15.** E

**4.** E

**7.** E

**10.** A

**16.** E

**13.** E

**5.** A

**8.** B

**11.** D

**14.** E

**17.** B