

Q1 do Exame de Recurso

$$1.a) \quad f(x) := \arccos(e^{2x} - 2e^x + 1) = \arccos((e^x - 1)^2)$$

Como  $\mathcal{D}_{\arccos} = [-1, 1]$  tem-se

$$\mathcal{D}_f = \left\{ x \in \mathbb{R} : -1 \leq \underbrace{(e^x - 1)^2}_{\geq 0} \leq 1 \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} : (e^x - 1)^2 \leq 1 \right\}$$

$$(e^x - 1)^2 \leq 1 \Leftrightarrow e^{2x} - 2e^x + 1 \leq 1 \Leftrightarrow e^{2x} - 2e^x \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\underbrace{(e^x - 2)}_{> 0} e^x \leq 0 \Leftrightarrow e^x - 2 \leq 0 \Leftrightarrow e^x \leq 2 \Leftrightarrow x \leq \ln 2$$

$$\mathcal{D}_f = ]-\infty, \ln 2].$$

$$1.b) \quad f'(x) = \frac{-[(e^x - 1)^2]'}{\sqrt{1 - (e^x - 1)^2}} = \frac{-2(e^x - 1)e^x}{\sqrt{1 - (e^x - 1)^2}}$$

$$f'(x) = \frac{-2e^x(e^x - 1)}{\sqrt{1 - (e^x - 1)^2}}, \quad x \in ]-\infty, \ln 2[.$$

Como  $f$  é diferenciável em  $]-\infty, \ln 2[$  o Teorema de Fermat permite concluir que se houver extremantes locais em  $x \in ]-\infty, \ln 2[$  então  $f'(x) = 0$ .

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2e^x(e^x - 1) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$$

Concluindo-se que  $x = 0$  é candidato a extremante.

$$f(0) = \arccos(1 - 2 + 1) = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$f(\ln 2) = \arccos((e^{\ln 2} - 1)^2) = \arccos(1) = 0$$

.../...



$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \arccos(1) = 0$ . Para  $x \in ]-\infty, \ln 2[$ :

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow -2e^x(e^x - 1) < 0 \Leftrightarrow e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$$

	$-\infty$		0		$\ln 2$	
$f$		$\nearrow$	$\frac{\pi}{2}$	$\searrow$	0	
$f'$		+	0	-	N.D.	

Conclusão:  $m=0$  é o mínimo local e global de  $f$  atingido em  $x_m = \ln 2$ .

$M = \frac{\pi}{2}$  é o máximo local e global de  $f$  atingido em  $x_M = 0$ .

Não existem outros extremos de  $f$ .

//