

SME0510 - Introdução à Pesquisa Operacional

**Forma Padrão e
Solução Básica**

Modelos Otimização Linear

- *Modelo matemático*

$x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow$ Variáveis de decisão

Minimizar $f(x) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \quad \leftarrow \text{função objetivo}$

sujeito a:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = b_m \end{cases} \quad \leftarrow \text{restrições } (\leq \text{ ou } \geq)$$

$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \dots \quad x_n \geq 0. \quad \leftarrow \text{condição de não-negatividade}$

(x_1, x_2, \dots, x_n)

Que satisfaz todas as restrições é chamado de solução factível

Forma Padrão - Definição

Minimizar $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0.$$

■ Características da forma padrão:

- ✓ Problema de minimização
- ✓ Todas as restrições são de igualdade
- ✓ Todas as variáveis são não negativas
- ✓ Considerar $b \geq 0$ (nos livros geralmente não consideram).

Forma Padrão (matricial)

Minimizar $f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0},$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Matriz mXn chamada matriz dos coeficientes
(matriz tecnológica)

$$\mathbf{c}^T = (c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_n) \quad \text{Vetor de Custos}$$

$$\mathbf{x}^T = (x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n) \quad \text{Vetor das Variáveis}$$

$$\mathbf{b}^T = (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_m) \quad \text{Vetor dos termos Independentes ou de recursos}$$

Solução Factível - Definição

- Definição 1: Uma solução (x_1, x_2, \dots, x_n) é factível se atende a todas as restrições do problema ($\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$) e as condições de não-negatividade ($\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$).
- Definição 2: O conjunto $S=\{\mathbf{x} \text{ tal que } \mathbf{Ax}=\mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ é denominado de conjunto de soluções factíveis (também chamado de região factível).

Solução Factível - exemplo

$$\text{Minimizar } f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 - x_2 + 4x_3$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

$x^T = (1, 0, 2)$ é factível. $f(1,0,2)=10$.

$x^T = (0.25, 0.5, 1.75)$ é factível? f ?

Solução Ótima - Definição

- Definição 3: Uma solução factível que fornece o menor valor à função objetivo f é chamada solução ótima, denotada por: $(x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n)$.

ou seja:

$(x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n) \in S$ é ótima se,

$$f(x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n) \leq f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in S$$

Transformação para a forma padrão

- Problemas de maximização

$$\text{Max } c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = \text{Min } -c_1x_1 - c_2x_2 - \dots - c_nx_n$$

Pois

$$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}), \text{ para toda solução } \mathbf{x} \text{ factível.}$$

$$-f(\mathbf{x}^*) \leq -f(\mathbf{x}), \text{ para toda solução } \mathbf{x} \text{ factível}$$

Transformação para a forma padrão

- Restrição de desigualdade:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

Variável de folga (x_k)

$$x_k = b_1 - a_{11}x_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n \geq 0$$

Restrição na forma de igualdade:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + x_k = b_1$$

Transformação para a forma padrão

- Restrição de desigualdade:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1$$

Variável de folga (x_k)

$$x_k = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n - b_1 \geq 0$$

Restrição na forma de igualdade:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n - x_k = b_1$$

Transformação para a forma padrão

- Variáveis livres

x_i irrestrita.

$$x_i = x_i^+ - x_i^-, \text{ com } x_i^+ \geq 0, x_i^- \geq 0.$$

Exercício

Escrever o problema a seguir na forma padrão.

$$\begin{aligned} \text{a) maximizar } z &= x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a: } x_1 + 5x_2 &\leq 5 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 4 \\ \mathbf{x} &\geq 0 \end{aligned}$$

Conceitos básicos – Solução Básica

- Consideramos sempre o problema na forma padrão:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } f(\mathbf{x}) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Dimensões:

A ($m \times n$)

b ($m \times 1$)

Solução Básica

- Considere a seguinte região factível no R^2

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 6 \\x_1 - x_2 &\leq 4 \\3x_1 + x_2 &\geq 3 \\x_1 \geq 0, x_2 &\geq 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_3 &= 6 - (x_1 + x_2) \geq 0 \\x_4 &= 4 - (x_1 - x_2) \geq 0 \\x_5 &= (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,\end{aligned}$$

variáveis de folga

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\x_1 - x_2 + x_4 &= 4 \\3x_1 + x_2 - x_5 &= 3 \\x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.\end{aligned}$$

Forma padrão


Exemplo

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$x_1 - x_2 + x_4 = 4$$

$$3x_1 + x_2 - x_5 = 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$



Alguns pontos

$$x_3 = 6 - (x_1 + x_2) \geq 0$$

$$x_4 = 4 - (x_1 - x_2) \geq 0$$

$$x_5 = (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,$$

Ponto **A**:


$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 6 - (3 + 2) = 1$$

$$x_4 = 4 - (3 - 2) = 3$$

$$x_5 = (3 \times 3 + 2) - 3 = 8$$



Ponto **B**:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 3$$

$$x_3 = 6 - (1 + 3) = 2$$

$$x_4 = 4 - (1 - 3) = 6$$

$$x_5 = (3 \times 1 + 3) - 3 = 3$$

Ponto **C**:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 4$$

$$x_3 = 6 - (2 + 4) = 0$$

$$x_4 = 4 - (2 - 4) = 6$$

$$x_5 = (3 \times 2 + 4) - 3 = 7$$

Ponto **D**:

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 6 - (5 + 1) = 0$$

$$x_4 = 4 - (5 - 1) = 0$$

$$x_5 = (3 \times 5 + 1) - 3 = 13.$$

Factíveis (Por quê ?)

(construção e não-negatividade)

Alguns pontos

Ponto **A**:

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = 6 - (3 + 2) = 1$$

$$x_4 = 4 - (3 - 2) = 3$$

$$x_5 = (3 \times 3 + 2) - 3 = 8$$

Ponto **B**:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 3$$

$$x_3 = 6 - (1 + 3) = 2$$


$$x_4 = 4 - (1 - 3) = 6$$

$$x_5 = (3 \times 1 + 2) - 3 = 3$$

$$x_3 = 6 - (x_1 + x_2) \geq 0$$

$$x_4 = 4 - (x_1 - x_2) \geq 0$$

$$x_5 = (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,$$



No interior da região factível (todas as variáveis de folga são positivas).

Alguns pontos

Ponto C:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 4$$

$$x_3 = 6 - (2 + 4) = 0$$

$$x_4 = 4 - (2 - 4) = 6$$

$$x_5 = (3 \times 2 + 2) - 3 = 7$$

Ponto D:

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 6 - (5 + 1) = 0$$


$$x_4 = 4 - (5 - 1) = 0$$

$$x_5 = (3 \times 5 + 1) - 3 = 13.$$

$$x_3 = 6 - (x_1 + x_2) \geq 0$$

$$x_4 = 4 - (x_1 - x_2) \geq 0$$

$$x_5 = (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,$$



Na fronteira (alguma variável se anula)!

Variáveis nulas indicam restrições ativas!

Mais de uma variável se anula: vértice (mais de uma restrição ativa)!

Outros pontos

$$x_3 = 6 - (x_1 + x_2) \geq 0$$

$$x_4 = 4 - (x_1 - x_2) \geq 0$$

$$x_5 = (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,$$

Ponto E:

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = 5$$

$$x_3 = 6 - (4 + 5) = -3$$

$$x_4 = 4 - (4 - 5) = 5$$

$$x_5 = (3 \times 4 + 5) - 3 = 14$$

Ponto F:


$$x_1 = 6$$

$$x_2 = 0$$

$$x_3 = 6 - (6 + 0) = 0$$

$$x_4 = 4 - (6 - 0) = -2$$

$$x_5 = (3 \times 6 + 0) - 3 = 15$$



Infactíveis:


Respeitam o sistema $Ax = b$

mas não respeitam as restrições de não-negatividade!

Vértices

- Duas restrições ativas*:
duas variáveis nulas!

Ponto **D**: $\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$



$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 - x_2 + x_4 &= 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$


$$\longrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 4, \\ 3x_1 + x_2 - x_5 = 3 \end{cases}$$

3 equações, 3 incógnitas!

* Caso geral: $n-m$ variáveis nulas.

$$\begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 1 \\ x_5 = 13. \end{cases}$$

Vértices



- Factíveis:
 - Ao fixar $(n-m)$ variáveis em zero, a resolução do sistema resulta em valores positivos para as variáveis restantes. (Ex. ponto D)
- Infactíveis
 - Ao fixar $(n-m)$ variáveis em zero, a resolução do sistema resulta em **ao menos um valor negativo** para as variáveis restantes. (Ex. ponto F)

Escrevendo o sistema (vértice D)

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 - x_2 + x_4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{Ax}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Apesar de fixarmos $(n-m)$ variáveis em zero (no exemplo, x_3 e x_4), continuamos as escrevendo (embora de maneira isolada):

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis restantes}} + \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis a serem fixadas}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Escrevendo o sistema

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis restantes}} + \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis a serem fixadas}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Em notação matricial

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Índices:

$$B = (B_1 \ B_2 \ B_3):$$

$$N = (N_1 \ N_2):$$

$$B_1 = 1, \ B_2 = 2, \ B_3 = 5,$$

$$N_1 = 3, \ N_2 = 4,$$

Referenciando

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Índices:


$$B = (B_1 \ B_2 \ B_3):$$

$$N = (N_1 \ N_2):$$

$$B_1 = 1, \ B_2 = 2, \ B_3 = 5,$$

$$N_1 = 3, \ N_2 = 4,$$

colunas associadas



$$\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1} \ \mathbf{a}_{B_2} \ \mathbf{a}_{B_3}] = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_5]$$

$$\mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \ \mathbf{a}_{N_2}] = [\mathbf{a}_3 \ \mathbf{a}_4],$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{B_1} \\ x_{B_2} \\ x_{B_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_{N_1} \\ x_{N_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

Resumindo

- Temos um problema de otimização e o escrevemos na forma padrão.

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } f(\mathbf{x}) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

- Escrevemos o sistema $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ na forma:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N = \mathbf{b}$$

Resumindo

- Escolhendo $(n-m)$ variáveis para x_N e o restante para x_B .

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N = \mathbf{b}$$

- $x_N=0$ (e colunas de B invertível)
- $\mathbf{Bx}_B = \mathbf{b}$ é um sistema com o mesmo número de equações e incógnitas (m). Se as variáveis solução desse sistema são ≥ 0 , vértice factível. Caso contrário, vértice Infactível.

Resolvendo o sistema

- E se B não for invertível ?

Sempre escolhemos para B , m variáveis cujas colunas constituem uma matriz invertível.

- Supor que $\text{posto}(A)=m$ (implica $m \leq n$). Se $m=n$, o sistema tem solução única (não tem problema), na forma padrão admitimos $m < n$. $Ax=b$ tem infinitas soluções.

$$\mathbf{A} = [\mathbf{B} \ \mathbf{N}]$$

Partição básica (Matriz básica)

- $\mathbf{B}_{m \times m}$ - matriz básica - formada por m colunas linearmente independentes de \mathbf{A} .
- \mathbf{B} pode ser escrita como:

$$\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1} \ \mathbf{a}_{B_2} \ \cdots \ \mathbf{a}_{B_m}]$$

Onde B_1, B_2, \dots, B_m são os índices das colunas escolhidas da matriz \mathbf{A} (índices básicos)

Partição básica (Matriz não-básica)

$$A = [B \ N]$$

- $N_{m \times (n-m)}$ - matriz não-básica - formada pelas $n-m$ colunas restantes de A .
- N pode ser escrita como:

$$N = [a_{N_1} \ a_{N_2} \ \cdots \ a_{N_{n-m}}]$$

Onde N_1, N_2, \dots, N_m são os índices das colunas da matriz A que pertencem a N (índices não-básicos)

Partição básica (partição das variáveis)

- Consequentemente, a partição de A em $[B \ N]$ cria uma partição das variáveis:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \nearrow \mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{B_1} \\ x_{B_2} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{bmatrix} \quad \text{variáveis básicas} \\ \searrow \mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_{N_1} \\ \vdots \\ x_{N_{n-m}} \end{bmatrix} \quad \text{variáveis não básicas} \end{array}$$

Solução geral do sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow [\mathbf{BN}] \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N = \mathbf{b}.$$

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N$$

- A última expressão de \mathbf{x}_B é conhecida como solução geral do sistema.

Solução básica

- Considere uma partição básica $A=[B,N]$. Uma solução é dita básica quando:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{0}. \end{cases}$$

^

- Se todas as componentes de \mathbf{x}_B são não-negativas, então temos uma *solução básica factível*. Caso contrário, temos uma *solução básica não-factível*.


Voltando ao exemplo

- Ponto D:


$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{B}\hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{b}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 13 \end{bmatrix}$$



Solução básica factível.



Voltando ao exemplo


- Ponto F:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_N} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$


$$\hat{\mathbf{x}}_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 15 \end{bmatrix}$$

Solução básica *não*-factível.




Propriedade básica I

- Considere região factível
- $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$.



Um ponto $x \in S$ é um vértice de S se e somente se x for uma solução básica factível.

Propriedade básica II



Se um problema de otimização linear tem uma solução ótima, então existe um vértice ótimo

Vértices (Pontos Extremos)


O Número de pontos extremos de S é finito.

O número de pontos extremos é limitado pelo número máximo de maneiras
De escolher m colunas das n colunas da matriz A , ou seja:

$$\frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Vértices

- Vimos que sempre que existe uma solução ótima, existe um vértice ótimo.
- Também intuímos que uma maneira de achar a solução ótima seria visitar os vértices factíveis sucessivamente
- Como determinar vértices sem o auxílio do gráfico?



Método possível

- Enumerar todas as soluções básicas (vértices)

x_1, x_2, \dots, x_K

- Escolher aquela com melhor função objetivo.

- Problema:

K pode ser muito grande!

Simplex

Idéia:

- Partir de uma solução básica factível
- Visitar apenas as soluções básicas factíveis melhores que ela.

Método Simplex


Exercício

Dado o problema de Programação Linear abaixo, transforme as restrições em um sistema de equações lineares, calcule todas as soluções básicas, informe quais soluções são viáveis (ou factíveis) e indique qual é a solução ótima.

$$\begin{aligned} \text{a) maximizar } z &= x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a: } x_1 + 5x_2 &\leq 5 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 4 \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \end{aligned}$$


Região factível e vértices

- Teorema 1: A região factível $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ é convexa.



Noções de Convexidade





- Conjuntos Convexos



Um conjunto é dito convexo se o segmento ligando quaisquer dois de seus pontos, pertence ao conjunto.

Noções de Convexidade

- Conjuntos não Convexos



Combinação convexa

- Dados x_1, x_2, \dots, x_k vetores

$$x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k = \sum_{j=1}^k \alpha_j x_j \quad \text{Combinação linear dos vetores}$$

$$x = \sum_{j=1}^k \alpha_j x_j, \quad \alpha_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^k \alpha_j = 1 \quad \text{Combinação convexa}$$

Noções de Convexidade

S é convexo se e somente se

$$\forall x^1, x^2 \in S \Rightarrow [x^1 x^2] \subseteq S \Rightarrow \alpha x^1 + (1-\alpha)x^2 \in S, 0 \leq \alpha \leq 1$$

Exercício: Mostre que S definido a seguir é convexo.

$$S = \{x \in R^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

$$A_{m \times n}$$

Região factível e vértices

- Teorema 1: A região factível $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ é convexa.

