
A
Age distribution of confirmed cases (n above bars)
Age at onset
<2 mo
2–11 mo
1–4 y
5–14 y
15+ y
Share of confirmed cases
100%
75%
50%
25%
0%
201
313
423
400
3,571
3,956
2,988
733
998
611
360
416
399
73
75
111
54
84
1,207
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
B
Age-specific risk relative to children aged 1–4 years
NB model with year fixed effects;
each epidemic vs 2015–2019 baseline
2011–2013 epidemic (pre-maternal Tdap)
2025 epidemic (post-maternal Tdap)
<6 weeks
6–8 weeks
2–3 months
4–5 months
6–11 months
5–9 years
10–14 years
15–19 years
20–39 years
40–59 years
60+ years
0.1
0.25
0.5
1
2
5
10
Ratio of IRRs vs children 1–4 years (log scale, 95% CI)
C
Additional relative protection of young infants in 2025
Counterfactual (2011–2013 age pattern): 262 (95% UI 29–854)
additional cases <2 months; 133 (9–459) among <6 weeks
<6 weeks
0.33 (0.12–0.88)
6–8 weeks
0.30 (0.11–0.80)
2–3 months
0.58 (0.22–1.54)
4–5 months
0.79 (0.30–2.09)
6–11 months
0.94 (0.35–2.48)
0.1
0.25
0.5
1
2
Ratio of ratios, 2025 vs 2011–2013 (log scale, 95% CI)