1.3 空间向量及其运算的坐标表示

FIG · E1-1-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

向量坐标定义：$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)=$ 终点 $-$ 起点

数量积坐标公式：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$ （垂直充要条件为该式 $=0$）

空间两点距离公式：$d=|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$

$A(x_1,y_1,z_1)$，$B(x_2,y_2,z_2)$：

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1)$$

终点减起点。


$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$$

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}=\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}$$

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$


02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态




坐标 x 2.0 · 坐标 y 2.5 · 坐标 z 2.0

姿态 B · 下界/初始端



坐标 x -3.0 · 坐标 y 2.5 · 坐标 z 2.0

姿态 C · 上界/满量程端



坐标 x 3.0 · 坐标 y 3.0 · 坐标 z 2.0

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知空间向量 $\boldsymbol{a}=(1,2,-2)$，$\boldsymbol{b}=(-2,0,1)$，则向量 $2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 的模长等于：

☐ A5　☐ B$\sqrt{13}$　☐ C7　☐ D25

2. 已知空间两点 $A(1,2,3)$、$B(3,-2,1)$，点 M 是线段 AB 的中点，则中点 M 的坐标以及线段 AB 的长度 $|AB|$ 分别为：

☐ A$M(2,0,2)$，$|AB|=2\sqrt{6}$　☐ B$M(2,0,2)$，$|AB|=6$

☐ C$M(1,-2,-1)$，$|AB|=2\sqrt{6}$　☐ D$M(4,0,4)$，$|AB|=24$

3. 【边界 5：含 0 分量共线判定】已知空间向量 $\boldsymbol{a}=(2,0,-4)$，$\boldsymbol{b}=(-1,y,z)$。若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则实数对 (y,z) 的值为：

☐ A$(0,2)$　☐ B无法确定，因为分母含 0 不能成比例　☐ C$(0,-2)$

☐ D$(1,2)$

4. 【边界 1：直角坐标轴必须正交】在空间几何体中建立空间直角坐标系，下列选轴做法中合规且正确的是：

☐ A在任意底面为平行四边形、侧棱倾斜的四棱柱中，直接以共顶点的三条侧棱所在直线分别为 x,y,z 轴

☐ B在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，直接以棱 AB,AC,AA_1 所在直线分别为 x,y,z 轴

☐ C在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，以顶点 D 为原点，射线 DA,DC,DD_1 所在直线分别为 x,y,z 轴

☐ D在正四面体 $ABCD$ 中，直接以共顶点的三条侧棱 AB,AC,AD 所在直线分别为 x,y,z 轴

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。先算坐标线性组合：2a=(2,4,−4)，2a+b=(2+(−2),4+0,−4+1)=(0,4,−3)。再利用模长公式：|2a+b|=02+42… ｜ (2) [A] A。中点坐标为各对应坐标算术平均数：M(21+3,22+(−2),23+1)=(2,0,2)。两点间距离为两点式向量模长：|AB|=(3−1)2… ｜ (3) [A] A。根据空间向量平行的充要条件：存在实数 λ 使得 b=λa。 即 (−1,y,z)=λ(2,0,−4)⇒−1=2λ⇒λ=−21。 代入其余分量：y… ｜ (4) [C] C。空间直角坐标系必须依赖「单位正交基底」（三条坐标轴必须两两垂直）。 长方体从同一顶点出发的三条棱两两互相垂直，符合建系条件；而正三棱柱底面是正三角…