
8.3 简单几何体的表面积与体积

拉 · 剪 · 展 · 算

3D · B2–8–3

一、看模型（6 个实验）

1 正棱柱



正棱柱

侧面展开是一个矩形：长是底面周长 na，宽是高 h。


$$S_{侧} = nah$$
$$S_{表} = S_{侧} + 2S_{底}$$
$$V = S_{底}\,h$$

正 n 边形面积 $S_{底} = \dfrac{na^2}{4\tan\frac{\pi}{n}}$（$n=4$ 时就是 a^2）。

算一算

底面积	2.10
侧面积 nah	$6 \times 0.9 \times 1.8 = 9.72$
表面积	13.93
体积 $S_{底}h$	3.79

2 正棱锥



正棱锥


每个侧面都是底边为 a、高为斜高 h' 的等腰三角形。

> $h' = \sqrt{h^2 + r_{内}^2}$（$r_{内}$ 是底面中心到边的距离）
> $S_{侧} = \frac{1}{2} n a h'$
> $V = \frac{1}{3} S_{底} h$

算一算

斜高 h'	1.79
底面积	2.56
侧面积 $\frac{1}{2}nah'$	5.72
表面积	8.28
体积 $\frac{1}{3}S_{底}h$	1.37

3 圆柱



圆柱

侧面沿母线剪开铺平，是长为 $2\pi r$、宽为 h 的矩形。

$S_{侧} = 2\pi rh$


$S_{表} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r+h)$

$V = \pi r^2 h$

算一算

展开矩形	$2.4\pi \times 2$
侧面积 $2\pi rh$	$4.8\pi \approx 15.08$
表面积	$7.68\pi \approx 24.13$
体积 $\pi r^2 h$	$2.88\pi \approx 9.05$

4 圆锥



圆锥

侧面展开是扇形：半径是母线长 l，弧长是底面周长 $2\pi r$。

$l = \sqrt{r^2 + h^2}$

圆心角 $\theta = \dfrac{2\pi r}{l} = \dfrac{r}{l} \cdot 360^\circ$


$S_{侧} = \frac{1}{2} \cdot 2\pi r \cdot l = \pi rl$

$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

算一算

母线长 l	2.16
扇形圆心角	199.7°
侧面积 πrl	$2.6\pi \approx 8.16$
表面积	$4.04\pi \approx 12.68$
体积 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$0.86\pi \approx 2.71$

5 圆台



圆台

侧面展开是扇环：两条弧长分别是 $2\pi r$ 和 $2\pi R$，宽是母线长 l。


$$l = \sqrt{(R-r)^2 + h^2}$$
$$S_{侧} = \pi(r+R)\,l$$
$$V = \tfrac{1}{3}\pi h\,(r^2 + rR + R^2)$$

$r = R$ 时变成圆柱，$r = 0$ 时变成圆锥，三个公式都能对上。

算一算

母线长 l	1.57
侧面积 $\pi(r+R)l$	$3.29\pi \approx 10.33$
表面积	$5.74\pi \approx 18.02$
体积	$1.6\pi \approx 5.03$

6 球



球

球面是弯的，**不能**像圆柱、圆锥那样剪开铺平，所以它的面积公式要用别的办法推（课本用的是"分割—求近似和"）。

> $S = 4\pi R^2$
> $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

把新半径代入公式，与原来的表面积、体积作比；观察半径的倍数在公式中分别乘了几次。

算一算

表面积 $4\pi R^2$　$5.76\pi \approx 18.10$

体积 $\frac{4}{3}\pi R^3$　$2.3\pi \approx 7.24$

二、练一练（先独立作答）

1. 圆锥的底面半径是 3，母线长是 5，它的侧面展开图扇形的圆心角是多少度?

A. 270°　**B.** 108°

C. 216°

2. 圆柱的底面半径为 1，高为 2，它的表面积是?

A. 6π　**B.** 5π

C. 4π

3. 圆台上、下底面半径分别是 1 和 2，高为 $\sqrt{3}$，它的侧面积是?

A. $3\sqrt{3}\,\pi$　**B.** 6π

C. 3π

4. 球的半径扩大为原来的 2 倍，体积变为原来的几倍?

A. 8 倍　**B.** 2 倍

C. 4 倍

答案与解析

1. C　弧长 = 底面周长，所以 $\theta = \frac{r}{l}\cdot 360^\circ = \frac{3}{5}\cdot 360^\circ = 216^\circ$。模型里取 $r=1.5$，$h=2$，母线也是 2.5，比例一样。

2. A　$S_{表} = 2\pi r(r+h) = 2\pi\cdot 1\cdot 3 = 6\pi$。只算 $2\pi rh = 4\pi$ 是忘了两个底面。

3. B　先求母线 $l = \sqrt{(2-1)^2+3} = 2$，再用 $S_{侧} = \pi(r+R)l = \pi\cdot 3\cdot 2 = 6\pi$。用高代替母线就会错成 $3\sqrt{3}\pi$。

4. A　$V = \frac{4}{3}\pi R^3$，半径乘 2，体积乘 $2^3 = 8$。表面积只乘 $2^2 = 4$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-3.html