

# Sledenje konstantni skalarni količini

Označimo z  $\hat{x}$  oceno k  $x$ . Zanima nas kako dotok novih informacij preko meritev  $z_i = x + r_i$  sinhronizira modelski sistem z realnim. Lastnosti našega merilnega šuma so:

$$r_i = \mathcal{N}(0, \sigma)$$

$$\langle r_i \rangle = 0$$

$$\langle r_i^2 \rangle = \sigma^2 \langle r_i r_j \rangle = \delta_{ij} \sigma^2$$

Tu je pomembna zadnja lastnost; to da je merilni šum nekoreliran. Torej šum v vsakem trenutku je popolnoma nepovezan s šumom v prejšnjih trenutkih.

## Shema za sledenje

Predstavili bomo shemo, s katero lahko iteracijsko sledimo skalarni količini.

### Korak $n$

Recimo, da imamo že  $n$ -to meritev oz. smo v  $n$ -tem koraku iteracije oz. je minilo  $(n \cdot T)$  časa, kjer je  $T$  naša perioda merjenja. Takrat je:

$$\hat{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N z_i \quad \hat{\sigma}_n^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

### Korak $n + 1$

Dobili smo še dodatno meritev  $n + 1$ :

$$\begin{aligned} \hat{x}_{n+1} &= \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} z_i = \frac{1}{n+1} \left( \sum_{i=1}^N z_i + z_{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \hat{x}_n + \frac{1}{n+1} z_{n+1} \\ \Rightarrow \quad \hat{x}_{n+1} + \frac{1}{n+1} (z_{n+1} - \hat{x}) &= \hat{x}_{n+1} + \frac{\hat{\sigma}_{n+1}^2}{\sigma^2} (z_{n+1} - \hat{x}_n) \\ \sigma_{n+1}^{-2} &= \sigma_n^{-2} + \sigma^{-2} \end{aligned}$$

Tu razlika v zadnjem členu imenuje **inovacija**, ki je pravzaprav primer povratne zanke. Faktor z variancami pa se imenuje **utež**.

## Ocena konvergence za $\hat{x} \rightarrow x$

Vzemimo čas vzorčenja  $T \rightarrow 0$ . V tej limiti postanejo naše diskretne spremenljivke zvezne.

$$\hat{x}_n \rightarrow \hat{x}(t) \quad \hat{\sigma}_n^2 \rightarrow \hat{\sigma}_x^2(t) \quad z_n \rightarrow z(t)$$

Poglejmo si potem slednjo limito:

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow 0} \frac{\hat{x}_{n+1} - \hat{x}_n}{T} &= \dot{\hat{x}}(t) = \frac{\hat{\sigma}_{n+1}^2}{\sigma^2 T} (z_n - \hat{x}_n) \\ \Rightarrow \quad \dot{\hat{x}}(t) &= \frac{\hat{\sigma}_x^2}{\sigma^2 T} (z(t) - \hat{x}(t)) \end{aligned}$$

Sedaj pa zahtevajmo, da naj velja:

$$\lim_{\sigma^2 T} = R(t) > 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\hat{x}}(t) = \frac{\hat{\sigma}_x^2}{R(t)} (z - \hat{x})$$

Tu je zdaj koristno, da si bralec pregleda skice na [str. 17](#). Zanima nas kako je s koreliranostjo. Naj bo  $\tau$  čas **minimalnih fluktuacij**. Če velja  $T \gg \tau$  so mo meritve nekorelirane, če pa velja  $T \ll \tau$  so pa korelirane.

Da zagotavljamo zgornjo limito, ko gre  $T \rightarrow 0$  se mora  $\sigma^2$  večati, tako, da je njun produkt konstanten. Če večkrat vzorčimo znotraj ene fluktuacije se nam  $\sigma$  poveča.

## Konvergenca disperzije združene meritve (v kontinuumskih slikah)

Poglejmo si:

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \hat{\sigma}_{n+1}^2 - \hat{\sigma}_n^2 &= \frac{1}{T} \left( \frac{\sigma_n^2 \sigma^2}{\hat{\sigma}_n^2 - \sigma^2} - \hat{\sigma}_n^2 \right) = \\ &= \frac{-(\hat{\sigma}_n^2)^2}{(\hat{\sigma}_n^2 T + \sigma^2 T)} = \dot{\hat{\sigma}}_x^2 \end{aligned}$$

in tu sedaj limitiramo  $T \rightarrow 0$ :

$$\dot{\hat{\sigma}}_x^2 = -\frac{(\hat{\sigma}_x^2)}{R}$$

$$\hat{\sigma}_x^2 \rightarrow 0 = \langle (\hat{x} - x)^2 \rangle$$

Ocena konvergira k pravi vrednosti, ko dotakamo informacije. Na koncu dobimo točno sinhronizacijo med realnim in modelskim sistemom.

## Merjenje skalarne spremenljivke

Če ne poznamo dinamike za  $x(t)$  v realnem sistemu  $S$

V vsakem trenutku je meritev edina ocena, ki jo imamo. To je tako, kot da bi na starejše/prehodne meritve pozabili.

$$\hat{x} = Z(t) \quad \hat{\sigma}^2 = R(t)$$

### Manjši časovni intervali

Na dovolj majhnih opazovalnih oknih lahko rečemo, da je dinamika približno linearna. Tu manj pozabljamo na prejšnje meritve.

### Kako opišemo dinamiko v $S$

Dinamiko opišemo z **linearno diferencialno enačbo 1. reda**:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + C(t)$$

Diskretno jo lahko zapišemo tudi kot:

$$\dot{x} = \frac{x_{n+1} - x_n}{T}$$

oz. kot:

$$x_{n+1} = (1 + A(t_n)T)x_n + C(t_n)T$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = \phi_n x_n + C_n \quad \phi_n = 1 + A(t_n)T \quad C_n = C(t_n)T$$

## Postopek optimalne sinhronizacije

Imejmo v nekem trenutku  $\hat{x}_n, \hat{\sigma}_n^2$ . Za  $(n+1)$  korak bo **napovedna ocena**:

$$\bar{x}_{n+1} = \phi_n \hat{x}_n + C_n$$

in **napoved disperzije**:

$$\bar{\sigma}_{n+1}^2 = \phi_n^2 \hat{\sigma}_n^2$$

kjer je  $\bar{\sigma}_n^2$  definirana kot:

$$\begin{aligned}\bar{\sigma}_n^2 &= \langle (\bar{x}_{n+1} - x_{n+1})^2 \rangle = \langle (\phi_n \hat{x} + C_n - \phi_n x_n - C_n)^2 \rangle = \\ &= \phi_n^2 \langle (\hat{x}_n - x_n)^2 \rangle = \phi_n^2 \hat{\sigma}_n^2\end{aligned}$$

No sedaj pa dobimo nov izmerek v času  $n + 1$ :  $z_{n+1}$ ,  $\sigma$ . Naredimo izostreno oceno po znanem postopku:

$$\hat{x}_{n+1} = \bar{x}_{n+1} + \frac{\hat{\sigma}_{n+1}^2}{\sigma^2} (z_{n+1} - \bar{x}_{n+1})$$

$$\hat{\sigma}_{n+1}^2 = \bar{\sigma}_{n+1}^2 + \sigma^2$$

Uvedimo nove oznake! Naj gre  $\hat{\sigma}_{n+1}^2 \rightarrow P_{n+1}$ , ki jo imenujemo **kovariančna matrika izostrene ocene**. Recimo

$\bar{\sigma}_{n+1}^2 \rightarrow M_{n+1}$ , ki predstavlja **kovariančno matriko napovedi** in proglasimo  $K_{n+1} = \frac{\hat{\sigma}_{n+1}^2}{\sigma^2} = \frac{P_{n+1}}{\sigma^2}$  za **ojačevalni faktor inovacije**. Definicije so slednje:

$$M_{n+1} = \sigma_n^2 P_n$$

$$P_{n+1} = \frac{M_{n+1} \sigma^2}{M_{n+1} + \sigma^2} = M_{n+1} - \frac{M_{n+1}^2}{M_{n+1} + \sigma^2}$$

$$\bar{x}_{n+1} = \psi_n \hat{x}_n + C_n$$

## Dinamični šum

$\phi_n$  in  $C_n$  sta v diferenčni sliki nepopolna. Dodati moramo še nekaj..

$$x_{n+1} = \phi_n x_n + C_n + \Gamma_n w_n$$

kjer je  $w_n$  **dinamični šum**,  $\Gamma_n$  pa je nek multiplikativni faktor. Tisto kar ne poznamo o dinamiki skrijemo v dinamični šum, ki je isto kot merilni šum **Gaussovske porzdeljen (bel) šum**.

$$\langle w_n w_n' \rangle = \delta_{nn'} Q_n$$

Če je  $Q = 0$  potem natančno poznamo dinamiko. To kar smo sedaj napisali ne vpliva na našo oceno za  $\hat{x}_{n+1}$ , vpliva pa na kovariance. Poglejmo:

$$\begin{aligned}M_{n+1} &= \langle (\bar{x}_{n+1} - x_{n+1})^2 \rangle = \langle (\phi_n \hat{x}_n + C_n - \phi_n x_n - C_n - \Gamma_n w_n)^2 \rangle = \\ &= \langle (\phi_n (\hat{x}_n - x_n) - \Gamma_n w_n)^2 \rangle = \\ &= \phi_n^2 \langle (\hat{x}_n - x_n)^2 \rangle + \Gamma_n^2 \langle w_n^2 \rangle - 2\Gamma_n \phi_n \langle (\hat{x}_n - x_n) w_n \rangle = \phi_n^2 P_n + \Gamma_n^2 Q_n \\ \Rightarrow M_{n+1} &= \phi_n^2 P_n + \Gamma_n^2 Q_n\end{aligned}$$

**Pomembno:** Zaradi nepoznane dinamike se nam kovarianca lahko le povečuje.

## Prehod v kontinuumsko sliko

V sistemu  $M$  smo rekli, da naj bo izostrena ocena:

$$\hat{x}_{n+1} = \bar{x}_{n+1} + K_{n+1} (z_{n+1} - \bar{x}_{n+1})$$

Poglejmo sedaj limito, ko čas vzorčenja pošljemo proti nič. Označimo:

$$A(t) = \frac{\phi_n - 1}{T} \quad C(t) = \frac{C_n}{T}$$

in sedaj limita:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{\hat{x}_{n+1} - \hat{x}_n}{T} = \dot{\hat{x}}(t) = A(t) \hat{x}(t) + C(t) + \frac{P(t)}{R} (Z(t) - \hat{x}(t))$$

Poglejmo prehod še za kovarianco. Kako dobimo izostreno iz napovedi:

$$\begin{aligned}
P_{n+1} &= M_{n+1} - \frac{M_{n+1}^2}{M_{n+1} + \sigma^2} \\
&= \phi_n^2 P_n + \Gamma_n^2 Q_n - \frac{(\phi_n^2 P_n + \Gamma_n^2 Q_n)^2}{M_{n+1} + \sigma^2}
\end{aligned}$$

Spet si pogledimo limito časa vzorčenja:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{P_{n+1} - P_n}{T} = \frac{(\phi_n^2 - 1)P_n}{T} + \frac{\Gamma_n^2 Q_n}{T} - \frac{\phi_n^4 P_n^2 + \Gamma_n^4 Q_n^2 + 2\Gamma_n^2 Q_n \phi_n^2 P_n}{M_{n+1}T + \sigma^2 T} =$$

V zadnjem členu vidimo, da imamo neko zmešnjavo, tam v ulomku 2. in 3. člen odpadeta. Pa še ko limitiramo  $\frac{\Gamma^2(Q_n \cdot T)}{T^2}$ :

$$\lim(Q_n \cdot T) \rightarrow Q(t)$$

$$\left(\frac{\Gamma}{T}\right)^2 \rightarrow \Gamma^2(t)$$

to naredimo tako, da so te stvari končne. **TODO: Razlage za te limite.** Skupaj je njun produkt  $\Gamma^2 Q$  končen. Končen rezultat pa je:

$$\Rightarrow \dot{P}(t) = 2AP + \Gamma^2 Q - \frac{P^2}{R}$$

Tu prvi člen predstavlja sprememba kovariance zaradi znane dinamike, drugi predstavlja povečanje zaradi dinamičnega šuma in zadnji ostrenje zaradi dotoka novih meritev.