

# Trabajo y energía e impulso y cantidad de movimiento de la partícula

Tercer Examen Parcial  
Equipo 12

Aguilar Enriquez Paul Sebastian  
Benitez Barroso Brandon Raul      Castillo Herrera Gabriela  
Martinez Vidal Joceline Yadira  
Milán Hernández Maria Fernanda

10 de octubre del 2016

Repositorio del documento en GitHub  
<https://github.com/penserbjorne/clase-cinematicaydinamica-2017-1>

**Ejercicio 28** En clase vimos que el potencial gravitacional está dado por

$$V(r) = -G \frac{M_T m}{r}$$

donde  $M_T$  es la masa de la Tierra,  $m$  es la masa de la partícula bajo estudio, y  $r$  es la distancia entre el centro de la Tierra y la partícula. Calcula, usando sólo la conservación de energía, la *velocidad de escape* que debe imprimirse a la partícula para que ésta no caiga de nuevo a la tierra. Evalúa tu resultado si  $G \simeq 6,67 \times 10^{-11} [\frac{m^3}{kg*s^2}]$ ,  $M_T \simeq 6 \times 10^{24} kg$  y el radio de la Tierra es  $R \simeq 6,371 km$ .

**Solución:**

$$E_{mc} = V + E_c = 0$$

$$-G \frac{M_T m}{r} + \frac{1}{2} m v^2 =$$

$$6371 km = 6371000 m$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = G \frac{M_T m}{r}$$

$$\frac{1}{2} v^2 = G \frac{M_T}{r}$$

$$\text{Velocidad de escape : } V = \sqrt{\frac{2GM_T}{r}}$$

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,67 \times 10^{-11} \left[ \frac{m^3}{kg \cdot s^2} \right]}{6371000[m]}} 6 \times 10^{24} [kg]$$

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,67 \times 10^{-11}}{6371000}} 6 \times 10^{24} [kg] \frac{m^2}{s^2}$$

$$\left\{ V = 11208,5578 \frac{m}{s} = 11,2086 \frac{km}{s} \right. \quad (1)$$

**Ejercicio 33** Una de las condiciones para que una pelota de tenis sea utilizada en una competencia oficial es que, al dejarla caer desde una altura de 1[m], ésta rebota entre 50 y 60[cm]. Determina el rango de coeficientes de restitución que puede tener la pelota para que esto suceda.

**Solución:**




Figura 1: Energías potenciales.

Con el movimiento uniformemente acelerado, tenemos que:

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$v' = \sqrt{2gh'} \quad (2)$$

Por coeficiente de restitución:

$$e = \frac{v'}{v}$$

$$v' = \sqrt{\frac{h'}{h}} \quad (3)$$

Sabiendo que la altura de la caída es de 1[m].  
Y el rango de la altura de rebote es de:  $0,5 \leq h' \leq 0,6$   
Entonces, tenemos:

$$\sqrt{\frac{0,5}{1}} \leq e \leq \sqrt{\frac{0,6}{1}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \leq e \leq \frac{\sqrt{15}}{5}$$

$$0,70710 \leq e \leq 0,7745$$

Por lo tanto el rango de coeficiente de restitución es:

$$\left\{ 0,70710 \leq e \leq 0,7745 \right.$$

**Ejercicio 35** Dos objetos se deslizan sobre una superficie horizontal sin fricción. El primer objeto, con masa  $m_1 = 5[kg]$  se mueve con una velocidad  $v_1 = 4,5[\frac{m}{s}]$  hacia el segundo objeto, con masa  $m_2 = 2,5[kg]$ , el cual está inicialmente en reposo. Después de la colisión, ambos objetos se mueven con velocidades que hacen un ángulo de  $30^\circ$  en cada lado de la línea de movimiento original del primer objeto. (a) ¿Cuáles son las velocidades de ambos objetos después de la colisión? (b) ¿la colisión es elástica o inelástica?

**Solución:**

a)




Figura 2: Diagrama de cuerpo libre.

Cantidad de movimiento de un objeto  $\vec{p} = m\vec{v}$

Sistema de ecuaciones:

$$m_1 v_1 = m_1 v_1' \cos(\theta) + m_2 v_2' \cos(\theta) \quad (4)$$

$$m_1 v_1' \sin(\theta) = m_2 v_2' \sin(\theta) \Rightarrow m_1 v_1' = m_2 v_2' \quad (5)$$

De (5)

$$v_1' = \frac{m_2 v_2'}{m_1} \quad (6)$$

Sustituyendo (6) en (4)

$$m_1 v_1 = m_1 \left( \frac{m_2 v_2'}{m_1} \cos(\theta) \right) + m_2 v_2' \cos(\theta)$$

$$m_1 v_1 = 2 m_2 v_2' \cos(\theta)$$

$$2 m_2 v_2' = \frac{m_1 v_1}{\cos(\theta)}$$

$$v_2' = \frac{m_1 v_1}{2 m_2 \cos(\theta)} \quad (7)$$

Sustituyendo valores en (7)

$$\left\{ v_2' = \frac{5 * 4,5}{2 * 2,5 * \cos(30^\circ)} \frac{kg * \frac{m}{s}}{kg} = 3\sqrt{3} \left[ \frac{m}{s} \right] = 5,196 \left[ \frac{m}{s} \right] \right.$$

Sustituyendo valores en (3)

$$\left\{ v_1' = \frac{2,5 * 3\sqrt{3}}{5} \frac{kg * \frac{m}{s}}{kg} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \left[ \frac{m}{s} \right] = 2,598 \left[ \frac{m}{s} \right] \right.$$

b) Para determinar si la colision es elastica, se debe verificar que la energia se conserve.

$$\text{Energia total antes de la colision: } \frac{1}{2} m_1 \bar{v}_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$$

$$\text{Energia total antes de la colision: } \frac{1}{2} m_1 \bar{v}_1'^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2$$

Igualamos para verificar

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 = \frac{1}{2}(m_1v_1'^2 + m_2v_2'^2)$$

$$m_1v_1^2 = m_1v_1'^2 + m_2v_2'^2$$

$$5 * 4,5^2 = 5\frac{3\sqrt{3}}{2}^2 + 2,53\sqrt{3}^2$$

$$101,25 = 33,75 + 76,5$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 101,25 = 101,25 \end{array} \right.$$

**Ejercicio Extra** A la bola de la figura 3, de masa de  $m = 1[\text{kg}]$  que cuelga en el punto **A** por una cuerda inextensible de longitud  $l$  se le imprime una velocidad  $v_0 = 5[\text{m/s}]$ . Si  $l = 1[\text{m}]$   $x_B = 10[\text{cm}]$ , determina  $y_B$  de tal manera que la bola entre en la canasta.




Figura 3: Sistema mostrado para el problema extra.

**Solución:**

Posicionandonos en A, tenemos que:

$$v_1 = v_0$$

Poniendo en una posición 2 sea el punto descrito por el ángulo en que la trayectoria de la pelota cambia de circular a parabólico. En la posición 2, la tensión  $Q$  en el cable es cero.

Relacionando  $v_2$  y  $\theta$  basado en  $Q=0$ , tenemos el diagrama de cuerpo libre, que es:




Figura 4: Diagramas de cuerpo libre.

$$\sum F = 0 : Q + mg \sin(\theta) = ma_n = \frac{mv_2^2}{l}$$

Con:

$$Q = 0, mv_2^2 = gl \sin(\theta) \text{ o } v_2 = \sqrt{gl \sin(\theta)} \quad (8)$$

Relacionando  $v_0$  entre  $v_2$  y  $\theta$  basado en la conservación de la energía.

$$T_1 + V_1 = T_2 + V_2$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - mgl = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgl \sin(\theta)$$

$$v_0^2 - v_2^2 = 2gl(1 + \sin(\theta)) \quad (9)$$

Eliminando  $v_2$  de la ecuación (1) y (2), tenemos:

$$v_0^2 - gl \sin(\theta) = 2gl(1 + \sin(\theta))$$

$$\sin(\theta) = \frac{1}{3} \left[ \frac{v_0^2}{gl} - 2 \right] = \frac{1}{3} \left[ \frac{5^2}{(9,81)(1)} - 2 \right] = 0,849473$$

$$\theta = 58,154^\circ$$

De la ecuación (1), tenemos que:

$$v_2^2 = (9,81)(1) \sin(58,154^\circ) = 8,33329 m^2/s^2$$

$$v_2 = 2,88674 m/s$$

Teniendo como "x" y "y" las coordenadas en la posición 2:

$$x_2 = l \cos(\theta) = (1) \cos(58,154^\circ) = 0,52763m$$

$$y_2 = l \sin(\theta) = (1) \sin(58,154^\circ) = 0,849469$$

$t_2$  es el tiempo cuando la pelota esta en la posición 2.

Teniendo el movimiento en la trayectoria parabólica. El movimiento horizontal es:

$$\dot{x}_2 = -v_2 \sin(\theta) = -2,88674 \sin(58,154^\circ) = -2,45219^\circ$$

$$x = x_2 - 2,45219(t - t_2)$$

En el punto B, tenemos:

$$x_B = 0,1m$$

$$0.1 = 0,52763 - 2,45219(t_B - t_2)$$

Por lo que:

$$t_B - t_2 = 0,174386$$

El movimiento vertical en el punto B es:

$$y_B = y_2 + v_2 \cos(\theta)(t_B - t_2) - \frac{1}{2}g(t_B - t_2)^2$$

$$y_B = 0,849469 + (2,88674 \cos(58,154^\circ))(0,174386) - \frac{1}{2}(9,81)(0,174386)^2 = 0,9659222$$

Por lo tanto  $y_B$  es:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_B = 0,9659222 \end{array} \right.$$