

AFMCP 챕터 3 파트 1 — 핵심 요약

생활방식 인자 → 동화·방어와 복구·소통·수송 노드

Dr. Boash | 요약본

동화 (Assimilation) 노드

- 수면 부족 → 장내 미생물 불균형(dysbiosis), 변비 위험 32% 증가, IBS-GERD 악화
- 고강도 운동 과다 → 스트레스 호르몬 ↑ → 장 운동성 변화; 운동 부족 → 통과 시간 지연
- 스트레스 → 교감신경 활성화 → '싸우거나 도망치기' 모드 → 소화 저해, 위산 감소
- 명상 → 부교감신경 활성화 → 소화 개선, 장내 미생물 건강
- 건강한 관계 → 마이크로바이옴 다양성 증가 (배우자 > 형제자매)

방어와 복구 (Defense & Repair) 노드

- 수면 4시간 × 12일 → IL-6 유의한 상승 (정상 수면 8시간 대비)
- 저항 훈련 + 중등도 운동 → IL-6, TNF-알파, CRP 감소
- 고당분 식이 → 염증성 사이토카인 ↑, 장 투과성(leaky gut) ↑, 면역 과활성
- 외로움 → IL-6 ↑, 내독소에 대한 TNF-알파 반응 강화, IgA·IgG·IgM ↓

소통 (Communication) 노드

- 수면 1시간 증가 → 에스트라디올 3.9% ↑, 프로게스테론 9.4% ↑ (여성)
- 교대 근무(야간) → 테스토스테론 ↓ (남성·여성 모두)
- 수면 무호흡증 → 총·유리 테스토스테론 ↓, 정자 수 ↓
- 스탠딩/트레드밀 책상 → 오후 코티솔 유의하게 감소
- 업무 스트레스 → TSH ↑, LH ↑, 유리 T4 ↓ (갑상선 기능 저하)
- ACE 4개 이상 → PMDD/PMS 2.5배, 반복 유산 3배 이상 위험
- ACE 1건 증가마다 임신 어려움 9% ↑, 가임력 32% ↓

수송 (Transport) 노드

- 수면 부족 → 고혈압, 이상지질혈증 (LDL ↑, 중성지방 ↑, HDL ↓), 인슐린 저항성
- 유산소 운동 → 수축기 BP 8% ↓, 이완기 BP 5% ↓ (혈압약 한 알 효과와 동등!)
- 유산소 + 저항 운동 → 유산소만 하는 것보다 HbA1c 더 효과적으로 조절
- 지각 스트레스: 낮음 30% vs 높음 38.2% 고혈압 발생률 (마음 상태만으로 10% 차이)
- 외로움 → 기저 혈압 ↑, 급성 스트레스에 과장된 혈압 반응

임상 핵심 메시지

운동 처방 시 반드시 저항 운동 포함 | ACE 이력 반드시 확인 (생식 건강에 큰 영향) | "신체 활동은 혈압약 한 알과 동일한 효과"를 환자 교육에 활용 | 외로움을 공중 보건 문제로 다루고 사회적 연결 지원