

수술 결과를 개선하는 생활방식 개입

Dr. Rebecca Knackstedt | 성형외과·미세수술 전문의 (유방 재건) · IFM 기능의학 인증

서론

의대에서 우리는 영양에 대해 거의 교육받지 못하고, 생활방식 개입에 대해서는 사실상 전혀 교육받지 못합니다. 이것이 제가 기능의학 훈련을 받고 싶었던 이유 중 하나예요—환자와 이야기할 수 있는 지식 기반을 갖추기 위해서요. 오늘 다룰 주제는 통증·수면·스트레스와 불안·사회적 지지입니다.

1. 통증 (Pain)

수술 전 환자들이 가장 걱정하는 것 중 하나는 수술 후 통증입니다. 우리는 수술이 통증을 유발한다는 것을 알지만, 새로운 근거들은 통증 경험이 심리사회적 요인에 의해 크게 영향받는다라는 것을 보여줍니다.

통증에 영향을 미치는 요인들:

- 통증에 대한 기대(얼마나 아플 것 같은지)
- 스트레스와 불안
- 수면 상태

좋은 소식은 이것들이 모두 개입 가능하다는 겁니다. 수술 전 상담과 인지행동치료(CBT), 환자가 예상해야 할 것에 대한 설명으로 스트레스와 불안을 줄이면 통증을 실제로 줄일 수 있습니다. 환자들에게 거의 이야기되지 않는 매우 고무적인 사실이에요.

2. 수면 (Sleep)

많은 환자들이 수술 전에 수면에 어려움을 겪고, 수술 후에는 더 심해집니다. 수술에 대한 불안, 암 진단에 대한 불안, 수술 후 드레싱 불편감·통증, 입원 시 조명·소음·잦은 간호 확인이 모두 수면을 방해합니다.

수면이 왜 중요한가:

- 수면 중에 신체가 치유된다
- 통증 반응에 영향: 단 하루의 수면 부족도 통증을 크게 악화시킬 수 있다
- 통증 증가 → 마약성 진통제 필요량 증가 → 역설적으로 수면 질 더 악화 (악순환)

임상 개입법:

- 수술 전: 규칙적인 취침 시간·시원하고 어두운 방 등 수면 위생 루틴을 수술 전부터 구축
- 수술 후 입원 중 지참하도록 지시: 소음 차단 헤드폰, 소음 기계, 안대, 아로마테라피 기기
- 수술 전후 수면 개선 = 결과 개선 + 경험 개선

3. 불안과 스트레스 (Anxiety & Stress)

유방 재건을 하는 많은 환자들은 암 진단·항암치료·신체 변형에 대한 걱정으로 스트레스와 불안이 높습니다. 연구에 따르면 수술 전 스트레스 수준이 실제 수술 결과에 영향을 미치고 합병증 위험을 높입니다. 또한 통증 인식도 높입니다.

임상 개입법:

- 인지행동치료(CBT)
- 일지 쓰기(Journaling)
- 상담사 또는 치료사와의 상담 연계 — 매우 도움이 됨
- 가장 중요한 것: 이 감정들을 평가하는 것 자체 — "스트레스나 불안이 있으신가요?"라고 먼저 물어보기
- 대부분의 환자들은 직접 묻지 않으면 외과의사에게 이런 감정을 말하지 않는다

4. 사회적 지지 (Social Support)

유방암 환자에서 사회적 지지의 양은 의료 치료 완료 여부, 수술 결과, 심지어 사망률에도 영향을 미칩니다. 단순히 사회적 지지가 없으면 진료 예약을 못 지킨다는 차원이 아닙니다. 새로운 근거는 사회적 지지가 감소한 환자들이 코티솔(cortisol)이 증가한다는 것을 보여줍니다. 이것이 수술 결과, 의료 결과, 심지어 항암 치료 반응에도 부정적인 영향을 미칩니다.

임상 개입법:

- 온라인 환자 지지 그룹 연계 권장 — 소셜 미디어가 유용한 드문 경우
- 유방암 환자들을 위한 많은 지지 그룹 존재: 유사한 치료를 받은 사람들과의 연결
- 주의: 불필요한 강의·프로그램·보충제를 판매하는 소셜 미디어 사기꾼들을 경계하도록 교육
- 실제 의학적 우려는 항상 의료팀으로 방향 제시

생활방식 개입이 수술 전후 결과에 미치는 영향, 그리고 기능의학 임상가가 잠재적 수술 환자와 이 주제들을 논의하는 데 얼마나 중요한 역할을 할 수 있는지에 대한 이해가 깊어지길 바랍니다.