

수술 결과를 개선하는 생활방식 개입

Dr. Rebecca Knackstedt | 성형외과·기능의학 인증

▶ 핵심 메시지

- 수술 결과는 칼만큼이나 생활방식 인자에 의해 결정된다
- 통증·수면·스트레스·사회적 지지 모두 수술 결과에 직접 영향
- 의대에서 생활방식 교육 거의 없음 → 기능의학 훈련의 필요성

▶ 통증 관리

- 통증 경험은 심리사회적 요인에 의해 크게 영향 받음
- 개입 가능한 요인: 통증 기대치, 스트레스/불안, 수면
- 수술 전 CBT + 기대치 관리 → 통증 감소
- 환자들에게 거의 이야기되지 않는 중요한 사실

▶ 수면 관리

- 수면 부족 → 통증 ↑ → 마약성 진통제 ↑ → 수면 ↓ (악순환)
- 단 1일 수면 부족도 통증 반응 크게 악화
- 수술 전: 수면 위생 루틴 미리 구축 (규칙적 취침·서늘하고 어두운 방)
- 입원 시 지참 지시: 소음 차단 헤드폰, 안대, 소음 기계, 아로마테라피

▶ 스트레스·불안 관리

- 수술 전 스트레스 수준 → 합병증 위험 ↑ + 통증 ↑
- 개입: CBT / 일지 쓰기 / 상담 연계
- 핵심: 먼저 물어보기 — "스트레스나 불안이 있으신가요?"
- 대부분 환자들은 묻지 않으면 외과의사에게 말하지 않는다

▶ 사회적 지지

- 사회적 지지 ↓ → 코티솔 ↑ → 수술 결과 ↓ / 항암 반응 ↓ / 사망률 ↑
- 단순 진료 접근성 문제가 아닌 생리학적 기전 (코티솔 경로)
- 온라인 환자 지지 그룹 연계 권장
- 소셜 미디어 주의: 사기꾼 경계, 의학적 우려는 의료팀으로

▶ 기능의학 임상가의 역할

- 수술 전 생활방식 최적화 = 수술 결과 최적화
- 외과의사가 묻지 않는 것들을 기능의학 임상가가 물어볼 수 있다

- 잠재적 수술 환자와 통증·수면·스트레스·사회적 지지를 미리 논의하라