

AFMCP Chapter 6: 운반 과정과 대사심혈관 기능이상 Part 3

핵심 요약 — 기초 생활습관 치료적 중재

핵심 메시지

기능의학 실천가의 경험에 따르면 환자의 건강 문제 80%는 수정 가능한 생활습관 요인으로 해결 가능하며, 특히 대사심혈관 질환에 매우 효과적입니다. 건강 회복은 팀 스포츠입니다 — 필요시 전문가 팀을 미리 구성해 두세요.

3대 기초 치료 영역

① 생활습관 | ② 음식 우선 프로그램(핵심 식품 계획 + 파이토뉴트리언트 스펙트럼) | ③ 장 건강

수면

수면 교란 → 포도당·인슐린·TG 상승, 베타 세포 기능 감소

처방: 낮 햇빛 노출 | 낮 동안 식사 | 생물학적 밤에 수면

IFM 툴킷 '더 나은 수면을 위한 제안' 활용

신체 활동 (FITT 처방)

유산소: 주 150~300분, 주 5회 이상 분산 (10분 운동도 허용)

저항성: 각 근육군 주 2~3회 (연속 이틀 금지)

유연성: 각 10~30초 스트레칭, 주 수 회

균형: 노인 필수 — 균형·민첩성·협응·보행

운동 효과: 혈압 5~7 mmHg 감소, 인슐린 감수성·베타 세포 기능·GLP-1 감수성 개선, 내장 지방 감소

운동 스낵: 스쿼트·점프잭·계단 2분 × 3회/일도 대사 건강에 효과

스트레스

스트레스 → HPA 축 → 코르티솔 ↑ → 유리지방산 ↑ → 내장 지방 ↑ → 인슐린 저항성/T2DM

관리: 마음챙김 호흡 | 마음챙김 걷기 | 자연 노출 | 안내 심상

인간관계 & 고독감

고독감 → 혈압 상승, 염증 증가, 심박출량 감소, 스트레스 인지 증폭

처방: 자원봉사 | 수업 수강 | 반려동물 | IFM 툴킷 활용

생활습관 처방 요약

휴식 (신체+감정+정신) | 규칙적 식사 | 충분한 수면 환경 | 스트레스 상황 회피
심부 호흡·요가·명상·태극권 등 스트레스 감소 기법
환자 맞춤 운동 처방 (능력·목표 존중)

임상 실무 포인트

항상 IFM 툴킷을 먼저 확인하세요. 수면, 운동, 스트레스, 사회적 연결 모두 실용적인 핸드아웃과 처방 도구가 준비되어 있습니다. 스트레스 감소 기법은 직접 경험해보면 환자 상담에 더 효과적입니다.