

AFMCP Chap 2 — 무의식적 편견 완화 패널 [요약]

Gather 단계의 편견 완화 핵심 정리

편견 완화 3단계 루틴

진료 전:

- 문 앞에서 멈추기 → 심호흡 2-3번
- 만남을 시각화 / "나는 지금 열릴 것이다" 의도 설정

진료 중:

- 자동 반응 발생 시 멈추고 리셋
- 환자를 가족처럼 리프레이밍 ("이분이 내 형제라면...")
- 비임상적 연결부터 시작 (티셔츠 로고, 동행자 등)

진료 후:

- 정화 호흡 — 이전 환자 에너지 내보내기
- 다음 환자를 위한 새 슬라이트 준비

핵심 개념

동료 인간: 환자를 "환자"가 아닌 "fellow human"으로 바라보기

보이지 않는 망토: 완전히 현존하되 타인의 에너지를 흡수하지 않는 보호막

능동적 과정: 진료 전·중·후 지속적이고 의도적인 리셋

비임상 연결: 임상 시작 전 개인적 연결로 부정적 반응 방지

학습 자원

- Harvard Implicit Association Test — 자신의 편견 파악
- "Thinking, Fast and Slow" — Daniel Kahneman
- 편견 작동 사례 3가지 써보기 (일상 포함)
- 다양한 유형의 의료인과 정기 모임

핵심 명언: "우리는 인간 행위자(human doings)가 아닌 인간 존재(human beings)입니다. Gather 단계는 그 사실을 상기시켜 줍니다."