

GOTOIT 임상 방법 2단계: Organize(조직화)

AFMCP Chap2 | IFM 기능의학 매트릭스 활용

1. Organize 단계 개요

GOTOIT 임상 방법의 두 번째 단계인 Organize는 기능의학 매트릭스(IFM Matrix)를 핵심 도구로 사용합니다. 이 단계는 단순히 진단을 내리는 것과는 다릅니다. 기능 장애의 근본 원인을 파악하고, 시스템 생물학적 관점에서 사고하며, 이를 IFM 매트릭스에 배치하는 것이 목표입니다.

매트릭스는 데이터를 종이에 정리하는 것을 넘어, 환자의 삶의 맥락과 상황 속에서 데이터를 조직화하는 도구입니다. 이를 통해 임상 불확실성을 줄이고 환자에 대한 정밀하고 개인화된 접근을 가능하게 합니다.

2. IFM 매트릭스의 구성

왼쪽 패널: 선행요인(Antecedents), 유발인자(Triggers), 매개인자(Mediators)

타임라인에서 수집한 ATM 데이터를 매트릭스 왼쪽 패널에 배치합니다. 유전적/후천적 선행요인, 다양한 유발인자, 질환을 지속시키는 매개인자가 포함됩니다. 정신적·감정적·영적 요인도 선행요인, 유발인자, 매개인자가 될 수 있습니다.

하단 패널: 수정 가능한 생활습관 인자

수면, 신체활동과 움직임, 영양, 스트레스 요인과 인간관계, 인간적 연결이 포함됩니다. 단순히 행동을 기록하는 것을 넘어, 환자가 건강한 생활습관을 실천하지 못하게 하는 장애물과 삶의 맥락을 파악해야 합니다.

매트릭스의 7개 노드 (핵심)

노드	주요 생리 기능
동화(Assimilation)	소화, 흡수, 장내 미생물, 장 투과성, 호흡, 피부, 점막
방어 및 수복(Defense & Repair)	면역계, 감염(만성/급성), 미생물군
에너지(Energy)	미토콘드리아 기능, 에너지 조절
독소 완화/제거(Biotransformation)	독소 해독 및 배출, 1상/2상 해독 효소
운반(Transport)	심혈관계, 림프계, 세포 내 수송
소통(Communication)	내분비계(호르몬), 신경전달물질, 면역 신호(인슐린 등)
구조적 무결성(Structural Integrity)	세포막, 뼈, 상피, 근육, 인대

중심(Center): 정신적·감정적·영적 요인 - 인지/기억, 기분, 의미와 목적. 이는 생리 기능을 조절하므로 절대 빠뜨려서는 안 됩니다.

3. 노드 간 상호연결성 예시

기능의학 매트릭스는 시스템 사고를 가능하게 합니다. 노드 간 연결의 예시:

- 동화 → 방어: 장내 이상균총 → 장 투과성 증가 → 면역계 과활성화 → 만성 염증
- 방어 → 에너지: 만성 염증 → 과도한 산화 스트레스 → 미토콘드리아 기능 저하
- 에너지 → 독소 완화: 미토콘드리아 기능 저하 → 독소 해독 능력 감소
- 독소 → 운반: 특정 독소 → 심혈관 질환 유발

- 운반 → 소통: 인슐린: 호르몬이자 포도당 수송 신호 분자
- 소통 → 구조: 호르몬 → 뼈 구조, 지방 조직 영향

4. 타임라인에서 매트릭스로 데이터 이식

타임라인 항목	매트릭스 위치
임상 소견, 진단, 검사 결과, 증상	7개 노드에 배치
선행요인, 유발인자, 매개인자 (섹션 2,3,4)	왼쪽 패널 (ATM)
정신적·감정적·영적 요인	ATM 패널 + 매트릭스 중심
생활습관 인자 (수면, 운동, 영양 등)	하단 패널 (주로 매개인자)

"잉크가 어디 있나?" 원칙: 매트릭스를 펜으로 채운다면 잉크가 가장 많이 집중된 곳이 치료 우선순위입니다. 이를 통해 복잡성을 줄이고 임상 불확실성을 낮출 수 있습니다.

5. 세 가지 환자 유형별 매트릭스 활용

환자 A: 건강한 환자 (웰니스 유지 희망)

아직 표현형적 발현은 없지만 잠재된 ATM, 생활습관, 정신·감정·영적 요인을 파악하여 개인화된 예방 의료 제공이 가능합니다. 호르몬 건강 등에 초점을 맞춘 정밀 예방 의료를 제공합니다.

환자 B: 모호한 증상/미진단 환자

진단은 불명확하지만 매트릭스에서 증상 분포와 비진단적 임상 소견의 패턴을 파악하여 근본 원인 설명을 도출할 수 있습니다. 예: 드라이클리너 직업, 담배 의존, 약물 부작용 환자 -> 독소 완화/제거 노드에 잉크 집중.

환자 C: 다발성 만성질환 환자

알려진 진단들을 7개 노드에 배치하면 패턴이 드러납니다. 예: 소화불량, 설사, PPI 복용, GERD, 자가면역 2개 진단 -> 동화 노드 + 방어 및 수복 노드에 잉크 집중 -> 장과 만성 염증이 치료 우선순위.

6. 임상 흐름 및 결론

Organize 단계는 GOTOIT 방법 중 가장 복잡한 단계입니다. 그러나 이 단계를 잘 수행하면 다음 단계(Tell - 환자에게 이야기 들려주기)를 위한 완벽한 준비가 됩니다.

임상 흐름 요약:

- 타임라인의 ATM 데이터를 매트릭스 왼쪽 패널로 이식
- 임상 소견, 진단을 7개 노드에 배치
- 수정 가능한 생활습관 인자를 하단 패널에 추가
- 정신·감정·영적 요인을 중심에 배치
- "잉크가 어디 있나?"로 근본 원인 설명 생성
- 이 설명을 바탕으로 Tell 단계 준비