

GOTOIT 3단계 Tell 핵심 요약

환자에게 이야기 다시 들려주기 - 치료적 파트너십

핵심 철학

의사 자신이 가장 강력한 치료 도구입니다. Tell 단계 = 환자가 받는 첫 번째 치료. 부작용 없음. 약물보다, 보충제보다, 플라시보보다 더 강력합니다.

6단계 이야기 전달 방법

단계	내용
1	감사 + 목표 인정
2	이야기 재구성 의도 설명
3	타임라인 보여주며 ATM-현재 상황 연결
4	식이·생활습관의 영향 설명
5	이야기 검토 및 수정 요청
6	희망의 메시지 전달

ATM 환자 언어 변환

임상 용어	환자 언어
선행요인	"취약성 요인" - 발병 소인
유발인자	"시작점" - 증상/질환 촉발
매개인자	"지속 요인" - 현재도 문제 유지

Sofia 사례 요약

39세, 복통/설사/피로/하시모토/염증성 장질환

- 선행요인: 가족력, C-section, 산전 항생제, 어린 시절 항생제, 한부모 스트레스
- 유발인자: 첫 출산 후 갑상선 문제, 이혼 후 건강 악화
- 매개인자: 스트레스, PPI, 초가공식품, 탄산음료
- 희망 메시지: 간단한 식이/생활습관 변화로 빠른 회복 가능

임상 핵심 포인트

- Tell 단계는 기능의학의 가장 차별화된 특징
- 환자들이 이전에 경험하지 못한 수준의 경청과 공감 제공
- 모든 환자에게 동일하게 적용되는 유일한 비개인화 치료
- Tell을 잘 수행하면 Order(중재 우선순위) 단계 준비 완료
- 이 단계는 환자의 근본 원인 이해와 변화 동기를 높임