

패널: 뇌 건강 임상 진주 — 핵심 요약

Dr. Bryan Stepanenko, Dr. David Haase

핵심 요약

- ① MoCA 검사 10분 미만으로 브레인 포그·초기 치매·경도인지장애 스크리닝 가능 — 기능의학 입문 시 핵심 도구
- ② 미토 식이 플랜(케톤 생성·저알레르기 식이)이 브레인 포그에 신뢰할 수 있는 개입으로 검증됨
- ③ 치매는 다인자 원인을 가진 "unbraining 과정" — 기능의학 접근으로 역전 가능한 질환
- ④ TBI는 기억 소실이 1번 증상이어서 병력 청취가 어려우며 군인·접촉 스포츠 경력자는 특히 의심
- ⑤ TBI의 2차 효과: 미주신경 기능장애·뇌-장 소통 장애·수면 무호흡·호르몬 기능장애
- ⑥ 고용량 오메가-3는 TBI를 포함한 신경 기능에 다중 기전으로 작용하는 단독 강력 개입
- ⑦ 손상 후 24~48시간 내 유산소 운동 복귀가 뇌진탕 회복 기간을 단축한다는 새로운 근거 있음

임상 적용

- 모든 인지 증상 환자에게 MoCA + 자가 뇌 성능 1~5점 평가 루틴화
- TBI 병력 적극 스크리닝 — 군인·운동선수·사고 이력자는 반드시 확인
- 뇌 건강 개입: 미토 식이 플랜 + 고용량 오메가-3 + 수면 최적화 + 호르몬/독소 평가