

AFMCP 챗터4 | 저자원 환경에서의 기능의학 영양 개입

Dr. Daniel Miller – 교도소 기능의학 실천기

배경: 교도소에서의 기능의학

Dr. Miller는 수년간 미국 교도소의 저자원 시설에서 기능의학을 실천해 왔습니다. 처음에는 "고급 검사들이 훌륭하지만 교도소에서는 접근이 불가능하다. 정말 할 수 있을까?"라고 생각했습니다. 답은 "그렇다"였습니다.

교도소는 극단적인 식품 사막입니다. 구내 매점(commisary)에는 고도 가공식품, 초가공식품, 사탕류 – 먹지 말아야 할 것들이 대부분입니다.

핵심 임상 케이스: 식초 + PPI 중단

항목	내용
문제	많은 수감자가 장기간 양성자펌프억제제(PPI) 복용 중 (수감 전 잘못된 식습관 + 교도소 식사 → 위산 부족)
가용 자원	매점의 피클과 할라피뇨 = 식초 염수(vinegar brine)
중재	PPI 중단 + 식사 전 몇 입 먹은 후 피클즙 또는 할라피뇨즙 1~2 스푼 복용
결과	수년간 PPI 복용했던 환자들이 약을 끊을 수 있었음 → 장내 산성 환경 회복 → 장 점막 장벽 기능 향상 → 장내 세균 불균형(dysbiosis) 개선
부가 효과	수감자에게 자기 건강 관리 역량 부여 (empowerment) "약을 받으러 오는 것"이 아니라 "스스로 건강을 돌보는 것" → 자기 효능감·책임감 향상

핵심 교훈

- 기능의학은 자원이 풍부한 환경에서만 가능한 것이 아닙니다
- 단순한 영양 변화만으로도 놀라운 효과를 낼 수 있습니다
- 식초(산성 환경 회복) → PPI 필요성 감소 → 장 건강 개선의 연쇄 반응
- 환자 역량 강화(empowerment)는 의약품 이상의 치유 효과를 가집니다
- "어떤 자원을 이용할 수 있는가?"라는 질문에서 시작하십시오

참고: PPI(proton pump inhibitor, 양성자펌프억제제) – 위산을 억제하는 약물. 장기 사용 시 실제로 위산 부족을 유발하여 오히려 역류 증상을 악화시킬 수 있음.