

# Chap5-16. 패널: 5R 치료 임상 진주

Panel: 5R Treatment Clinical Pearls | AFMCP Chap5

---

## 1. 임상 진주: 제거(Remove)

- 제거 식이는 "해봐도 효과 없었어요"가 아니라 "제대로 했나?"를 먼저 확인
- 숨어있는 글루텐 주의: 간장, 소스, 의약품 코팅, 화장품
- 유제품 제거 시 칼슘 섭취 대안 확인: 케일, 브로콜리, 멸치, 두유
- 알코올은 가장 빠르고 강력한 장 투과성 증가 물질 - 완전 제거 권고
- 스트레스는 음식 트리거만큼 중요한 Remove 대상

## 2. 임상 진주: 대체(Replace)

- HCl 시작 전 위산 저하 확인: 베타인 HCl 테스트 또는 증상 패턴
- 소화효소는 "식사와 함께"가 아니라 "첫 한 입 전에" 복용이 효과적
- 담낭 절제 환자는 거의 모두 ox bile이 필요 - 이를 놓치면 지방 소화 계속 불량
- 노인 환자는 대부분 위산 저하 - 시작부터 HCl 고려
- PPI 중단은 단계적으로: 갑작스런 중단 시 반동 과산증 발생

## 3. 임상 진주: 재접종(Reinoculate)

- 프로바이오틱스는 "만능약"이 아님 - 균주 선택이 중요
- SIBO 환자에게 선불리 프로바이오틱 처방 시 증상 악화 가능
- 발효식품이 보충제보다 다양한 균주를 제공하므로 식품 우선
- 항생제 치료 후 최소 3-6개월 프로바이오틱 복용으로 미생물총 회복
- 프리바이오틱 도입 시 천천히 증량 - 급격한 도입은 팽만감 유발

## 4. 임상 진주: 재생(Regenerate)

- 글루타민 효과를 보려면 최소 4-8주 이상 복용 필요
- 아연 카르노신은 H. pylori 환자에서 항생제와 병용 시 상승 효과
- 비타민 D는 장 장벽 회복에 핵심 - 혈청 수준 50-80 ng/mL 목표
- 쿠르쿠민은 흡수가 관건 - 피페린 복합제 또는 리포솜 제형 선택
- DGL은 식전에 씹어서 복용할 때 가장 효과적

## 5. 임상 진주: 재균형(Rebalance)

- 수면 문제를 "별것 아닌 것"으로 넘기지 말 것 - 수면 부족은 모든 치료를 방해
- 운동을 처음 시작하는 환자: 10-15분 걷기부터 시작

- 명상을 거부하는 환자: "심호흡 3번"부터 시작 - 접근성이 중요
- 마음챙김 식사: 천천히 먹기만 해도 소화 50% 이상 개선되는 경우 있음
- 사회적 연결: 고립과 외로움은 장 건강의 숨겨진 적

## 6. 환자 교육의 핵심 메시지

"장 건강은 하루아침에 만들어지지 않았고, 하루아침에 회복되지도 않습니다. 하지만 올바른 방향으로 꾸준히 나아가면 반드시 좋아집니다." 환자가 기대하는 "즉각적인 효과"보다 "3-6개월의 장기 프로세스"임을 처음부터 설명합니다.