

Chap5-17. 패널: 대변 검사 없이 경험적 치료

Panel: Empiric Treatment without Stool Testing | AFMCP Chap5

1. 경험적 치료(Empiric Treatment)란?

경험적 치료는 검사 결과 없이 임상 증상과 병력만으로 치료를 시작하는 접근법입니다. 비용, 접근성, 환자 선호도 등의 이유로 검사를 받기 어려운 상황에서 유용합니다. 증상 패턴을 기반으로 가장 가능성 높은 원인을 추정하고 치료를 시도합니다.

2. 언제 경험적 치료를 고려하는가?

- 검사 비용 부담: 종합 대변 검사, SIBO 호기 검사 등은 비쌀 수 있음
- 검사 접근성 제한: 농촌 지역, 특수 검사 미제공 지역
- 진단적 치료로서 반응 확인: 치료 반응이 진단 정보 제공
- 증상이 명확한 경우: 전형적인 SIBO 증상, 명백한 음식 트리거

3. 증상별 경험적 치료 접근

증상 패턴	가장 가능한 원인	경험적 치료
식후 팽만/가스 설사 우세	SIBO (수소형) 또는 이상균총	저FODMAP 식이 + 허브 항균 (베르베린, 알리신 4주)
변비 우세 팽만	IMO (메탄형) 또는 갑상선 저하	저FODMAP + L. reuteri + 마그네슘 + 갑상선 평가
식후 즉시 불편 트림, 포만감	위산 부족 또는 위 마비	베타인 HCl 시험 치료 + 소화효소
지방변 체중 감소	담즙 기능 이상 또는 췌장 기능 저하	Ox bile + 소화효소 (리파아제 위주)
만성 설사 복통	음식 민감성 또는 기생충	제거 식이 6주 + 증상 지속 시 검사 의뢰
식후 역류 신물	위산 역류 (원인 평가 필요)	베타인 HCl 테스트 (위산 저하 vs 과다 구별)

4. 저FODMAP 식이: 경험적 첫 단계

저FODMAP 식이는 검사 없이 시작할 수 있는 가장 근거 있는 경험적 치료입니다. FODMAP(발효성 올리고당, 이당류, 단당류, 폴리올)은 소장에서 흡수가 어렵고 발효되어 SIBO 및 이상균총 증상을 악화시킵니다.

- 고FODMAP 회피: 양파, 마늘, 밀, 사과, 배, 우유, 꿀, 콩류
- 저FODMAP 허용: 당근, 오이, 상추, 닭고기, 연어, 쌀, 감자
- 기간: 2-6주 엄격 저FODMAP -> 반응 평가 -> 단계적 재도입

주의: 저FODMAP은 장기 식이 전략이 아닙니다. 증상 관리를 위한 단기 도구이며, 장기 사용은 미생물 다양성을 감소시킬 수 있습니다. 반드시 원인 치료와 병행해야 합니다.

5. 허브 항균 복합제

검사 없이 경험적으로 사용할 수 있는 허브 항균 요법:

- 베르베린(Berberine): 500-1500mg/일 - 광범위 항균, 항진균, SIBO
- 알리신(Allicin, 마늘 추출물): 항균, 특히 메탄 SIBO
- 오레가노 오일(Oil of Oregano): 카바크롤 성분, 항균/항진균
- 님(Neem) 추출물: 항기생충, 항균
- 자몽 종자 추출물(GSE): 광범위 항균, 항진균
- 복합제 제품: Candibactin-AR/BR, FC-Cidal, Dysbiocide 등