

Benzodiazepiner og Z-hypnotika

Analytt	Kode	Hovedkommentar	Tilleggskommentar	Bemerkning om fortolkningen
Alprazolam	APR	160 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av alprazolam hos voksne ved døgndose 3 mg.		
Diazepam	DIAZ	3500 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av diazepam og omdannelsesproduktet desmetyldiazepam (summert) hos voksne ved døgndose 15 mg diazepam. Akkumulerer ved langtidsbruk.	Se kommentar for diazepam i serum.	Diazepam og desmetyldiazepam vurderes samlet. Når begge er påvist legges kommentaren under diazepam. Når kun desmetyldiazepam er påvist legges kommentaren under desmetyldiazepam.
Desmetyldiazepam	DMI	3500 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av diazepam og omdannelsesproduktet desmetyldiazepam (summert) hos voksne ved døgndose 15 mg diazepam. Akkumulerer ved langtidsbruk.	Se kommentar for diazepam i serum.	Diazepam og desmetyldiazepam vurderes samlet. Når begge er påvist legges kommentaren under diazepam. Når kun desmetyldiazepam er påvist legges kommentaren under desmetyldiazepam.
Klonazepam	CZP	50 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av klonazepam hos voksne ved døgndose 1,5 mg. For epilepsibehandling er referanseområdet 40-120 nmol/L.		
Nitrazepam	NIT	300 nmol/L er øvre forventet		

		konsentrasjon av nitrazepam hos voksne ved døgndose 5 mg og prøvetaking minst 12 timer etter inntak. Akkumulerer ved langtidsbruk.		
<u>Oksazepam</u>	OXA	2500 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av oksazepam hos voksne ved døgndose 45 mg.		
<u>Zolpidem</u>	ZOLP	100 nmol/L er øvre forventet konsentrasjon av zolpidem hos voksne ved døgndose 10 mg (hos eldre 5 mg) og prøvetaking minst 12 timer etter inntak.		
<u>Zopiklon</u>	ZOPI	50 nmol/L er øvre forventet konsentrasjon av zopiklon hos voksne ved døgndose 7,5 mg (hos eldre 5 mg) og prøvetaking minst 12 timer etter inntak.		
KOMBINASJON <u>Diazepam, N-desmetyldiazepam og oksazepam</u>	DIAZ DMI OXA	3500 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av diazepam og hovedmetabolitten desmetyldiazepam (summert) hos voksne ved døgndose 15 mg diazepam. Akkumulerer ved langtidsbruk. Oksazepam er også en metabolitt av diazepam som kan påvises i mindre mengder etter diazepaminntak.	Se kommentar for diazepam i serum.	Brukes når SOXA < 10 % av summen SDIA + SDDI. Dersom SOXA > 10% brukes standardkommentarene for hhv. oksazepam og diazepam/N-desmetyldiazepam.

THC

Analytt	Kode	Kommentar
<u>THC</u>	THC	THC er det viktigste psykoaktive stoffet i cannabis.

Opioider

Analytt	Kode	Hovedkommentar	Bemerkning om fortolkningen, tilleggskommentarer
<u>Buprenorfin</u>	BUP	2,5 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av buprenorfin hos voksne ved døgndose 2 mg sublinguallt. For substitusjonsbehandling er referanseområdet 2-10 nmol/L.	
<u>Fentanyl</u>	FYL	10 nmol/L er øvre forventet konsentrasjon av fentanyl hos voksne ved bruk av 1,2 mg (50 µg/t) depotplaster.	
<u>Kodein</u>	KOD	850 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av kodein hos voksne ved døgndose 240 mg. Kodein omdannes til morfin i kroppen.	Dersom det er kodein til stede skyldes dette i de fleste tilfeller inntak av kodein, hvis ikke morfinkonsentrasjonen er svært høy eller det er påvist MAM i tillegg, som tegn på heroin-inntak. (SMAM er ikke med i ny samlemetode).

Kodein ved KOMBINASJON <u>Morfin og kodein</u>	KOD	850 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av kodein hos voksne ved døgndose 240 mg. Kodein omdannes til morfin i kroppen. Kodein kan påvises i serum etter inntak av kodein (bl.a. i Paralgin forte) og/eller heroin, som kan være forurenset med kodein.	Dersom både morfin og kodein er påvist, og krav til kombinasjonskommentaren høy kodein/lav morfin nedenfor ikke passer, benyttes denne kommentaren på kodein. Det legges også til morfinkommentar på SMOR.
<u>Morfin</u>	MOR	120 nmol/L er øvre forventet konsentrasjon av morfin ved peroralt inntak av 100 mg morfin og prøvetaking 4-6 timer etter inntak av vanlig tablett eller 8-12 timer etter inntak av depottablett. Morfin kan påvises etter inntak av morfin (bl.a. i Dolcontin) og/eller stoffer som omdannes til morfin i kroppen, som kodein og heroin.	
Metadon	MDO	600-1200 nmol/L er forventet medikamentfastende konsentrasjonsområde for racemisk metadon i LAR-behandling. Ved bruk av L-metadon er antatt konsentrasjonsområde 300-600 nmol/L.	
Oksykodon	OKSY	200 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av	

		oksykodon ved døgndose 60 mg.	
Tapentadol	TAP	600 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av tapentadol ved døgndose 400 mg. Det er sparsom dokumentasjon for serumkonsentrasjoner av tapentadol.	
Tramadol	TRAM	3000 nmol/L og 400 nmol/L er øvre forventede medikamentfastende konsentrasjoner av henholdsvis tramadol og omdannelsesproduktet O-desmetyltramadol hos voksne ved døgndose 400 mg tramadol.	
O-desmetyltramadol	OTRAM	3000 nmol/L og 400 nmol/L er øvre forventede medikamentfastende konsentrasjoner av henholdsvis tramadol og omdannelsesproduktet O-desmetyltramadol hos voksne ved døgndose 400 mg tramadol.	Tramadol og O-desmetyltramadol vurderes samlet. Når begge er påvist legges kommentaren under tramadol. Når kun O-desmetyltramadol er påvist legges kommentaren under O-desmetyltramadol. Se kommentar for tramadol i serum.
KOMBINASJON Høy kodein, lav morfin	KOD MOR	Kodein og morfin er påvist i serum. 850 nmol/L er øvre forventet medikamentfastende konsentrasjon av kodein	Høy kodein, lav morfin. Se kommentar for kodein i serum. <i>Se tekst øverst for vurdering av hva som er høy kodein,</i>

		hos voksne ved døgndose 240 mg. Kodein omdannes til morfin i kroppen.	<i>lav morfin og hvordan kommentere</i>
--	--	--	--