

ALIMENTACIÓN POR Sonda AL DEDO

La técnica de alimentación por sonda al dedo se utiliza en recién nacidos o lactantes que no logran un adecuado incremento de peso o cuando la madre presenta dolor en los pechos y pezones agrietados, para evitar el uso de mamadera. Ésta altera el patrón normal de succión, generando problemas de acople al pecho materno.



Materiales

- Sonda de alimentación de 5 fr, de 40 cm.
- Jeringa de 20 ml.
- Frasco tapa roja de 60 ml o mamadera.
- Tela adhesiva.



Pasos para la alimentación por sonda al dedo

1. Lavado de manos.
2. Extraer leche materna con extractor manual o eléctrico.
3. Fijar el extremo proximal de la sonda en el dedo índice (o el que le acomode a la persona que va a alimentar al lactante) con tela adhesiva, sin que sobresalga hacia adelante. Mantener las uñas cortas y sin esmalte.
4. Introducir el extremo distal de la sonda (extremo gris) dentro del frasco con la leche materna y/o fórmula.
5. Introducir el dedo en la boca del recién nacido entre la lengua y el paladar con la sonda hacia el paladar. El recién nacido comenzará a succionar el dedo (y por medio de éste la leche).



6. Una vez finalizado, se retira la sonda y por medio de la jeringa se lava con 10 cc de agua tibia. Luego se lava la jeringa.
7. Guardar en un lugar hermético y limpio.