

ALIMENTACIÓN POR SONDA AL PECHO

La técnica de alimentación por sonda al pecho se utiliza en aquellos casos en donde se evidencia una insuficiente producción de leche, por lo que se necesita estimular la glándula mamaria, o para hacer una transición entre el uso de mamadera y el acople directo al pecho.



Materiales

- Sonda de alimentación de 5 fr, de 40 cm.
- Jeringa de 20 ml.
- Frasco tapa roja de 60 ml o mamadera.
- Tela adhesiva.



Pasos para la alimentación por sonda al pecho

1. Lavado de manos.
2. Preparar el relleno o calentar leche extraída anteriormente.
3. Fijar el extremo proximal de la sonda en el pezón con tela adhesiva, sin que sobresalga hacia adelante.
4. Introducir el extremo distal de la sonda (extremo gris) dentro del frasco o mamadera con la leche.
5. El recién nacido comenzará a succionar el pecho (y por medio de éste el relleno), estimulando así la glándula mamaria para lograr una producción de leche materna adecuada para el niño(a).
6. Debe dividir la cantidad de leche preparada entre ambos pechos para lograr una mejor estimulación de la glándula.



7. Una vez finalizado, se retira la sonda y por medio de la jeringa se lava con 10 cc de agua tibia. Luego se lava la jeringa.
8. Guardar en un lugar hermético y limpio.