


ICTERICIA EN EL RECIÉN NACIDO



ESTIMADA MAMÁ:

Se denomina ictericia al tinte amarillo de la piel y el responsable de esta coloración es un pigmento que se encuentra en la sangre y se denomina bilirrubina. Más del 50% de los recién nacidos presentan ictericia después del primer día de vida. En general la ictericia es un fenómeno normal, sin consecuencias para la salud del recién nacido y no requiere tratamiento. La bilirrubina presenta un alza hasta el quinto día aproximadamente para disminuir y desaparecer a la semana. El alza de la bilirrubina por sobre los rangos de normalidad se denomina hiperbilirrubinemia y requiere tratamiento (fototerapia). El objetivo del tratamiento oportuno es evitar una complicación neurológica grave.

Existen factores que hacen presumir que los valores de bilirrubina pudieran ser más altos que los normales, por ejemplo: incompatibilidad entre el grupo sanguíneo de la madre y el de su recién nacido; prematurez, hermanos con hiperbilirrubinemia que requirieron tratamiento con fototerapia, baja de peso superior al 10%, entre otros. Frente a la presencia de estos factores y según el examen físico que realice el pediatra, se realizará un examen que mide el nivel de bilirrubina en la sangre, tomando una pequeña muestra de sangre del recién nacido.

TRATAMIENTO

La fototerapia es un tratamiento no invasivo que consiste en el uso de luces sobre la piel del bebé, las cuales descomponen la bilirrubina, favoreciendo su eliminación por las deposiciones y orina. El resultado es la disminución de los niveles de bilirrubina en la sangre.

El recién nacido se coloca desnudo bajo luces blancas (tubos fluorescentes) con la intensidad y distancia necesarias para que el tratamiento sea efectivo. En todo momento el equipo de enfermería cuidará el bienestar y seguridad de su bebé.

También se facilitará continuidad de la lactancia materna y el contacto permanente para mantener la relación de vínculo con su hijo(a); esto le brindará la confianza y seguridad de una madre presente, sensible a sus necesidades.

Al alta el pediatra determinará los controles a seguir. En la Red de Salud UC CHRISTUS usted cuenta con servicios ambulatorios que permiten controlar precozmente peso, lactancia, ictericia y además realizar los exámenes de sangre necesarios para continuar el seguimiento y control del recién nacido.

RECOMENDACIONES:

Para favorecer la disminución de la bilirrubina, alimente a su recién nacido mínimo cada 3 horas (8 a 12 tomas diarias) y cada vez que él o ella le pida. Consulte a su pediatra o al Servicio de Urgencia en caso de que su recién nacido no se alimente, esté somnoliento y/o que la ictericia progrese hasta bajo las rodillas. La evaluación de la coloración de la piel del bebé debe ser hecha con luz natural. Es muy importante que asista al control y tome los exámenes que le han indicado al alta. No se recomienda exponer al recién nacido a la luz solar directa ni indirecta. Tampoco ofrecer agua a beber como tratamiento alternativo.