Guía de Recuperación del Suelo Pélvico

Protocolo progresivo para fortalecer, controlar y recuperar la confianza después del parto

5 minutos por día · 4 niveles · Complemento del Desafío 21 Días



¿Por qué el suelo pélvico?

> El suelo pélvico es un grupo de músculos que sostiene la vejiga, el útero y el recto. Durante el embarazo y el parto, estos músculos se estiran y debilitan. El resultado: pérdidas de orina, sensación de pesadez, dolor en la relación y menor control del core.

Esta guía te da un protocolo de **5 minutos diarios**, progresivo, para recuperar ese control. Complementa el Desafío 21 Días porque el transverso y el suelo pélvico trabajan juntos: uno sin el otro da resultados incompletos.

Los 3 niveles del suelo pélvico

Superficial: controla la apertura de la uretra y el ano.
Medio: sostiene la vejiga y el útero.
Profundo: se conecta con el transverso abdominal y el diafragma.

Cuando activás el transverso (como en el Desafío 21 Días), el suelo pélvico profundo responde. Esta guía trabaja los 3 niveles.

Antes de empezar: autotest

Respondé estas preguntas para saber en qué nivel arrancar:

- ☐ ¿Tenés pérdidas al toser, estornudar o reír?
- ☐ ¿Sentís pesadez o presión en la zona pélvica?
- ☐ ¿Podés frenar el chorro de orina conscientemente? (solo como test, no como ejercicio)
- ☐ ¿Podés mantener una contracción pélvica 5 segundos?
- ☐ ¿Sentís diferencia entre contraer adelante y atrás?

0-1 "sí": arrancá en Nivel 3. **2-3:** Nivel 2. **4-5:** Nivel 1.

Nivel 1 — Reconexión (Semanas 1-2)

El objetivo es que vuelvas a sentir el suelo pélvico. Muchas mamás perdieron la conexión neuromuscular después del parto.

RUTINA DIARIA — 5 MINUTOS

1. Contracción lenta

Sentada o acostada, contraé el suelo pélvico como si quisieras frenar el pis. Subí la contracción despacio durante 5 segundos, mantené 2, bajá despacio en 5.

8 repeticiones · Pausa 10 segundos entre cada una

2. Contracción rápida

Contraé y soltá rápido, como un parpadeo. Sin empujar hacia abajo.

10 repeticiones × 3 series · Pausa 15 segundos entre series

3. Respiración coordinada

Inhalá relajando el suelo pélvico. Exhalá contrayendo suelo pélvico + transverso al mismo tiempo. Sentí cómo trabajan juntos.

10 respiraciones lentas

Cómo saber si lo hacés bien: tenés que sentir un movimiento sutil de "cierre y subida" en la zona del periné. Si sentís que empujás hacia abajo, o que apretás glúteos y muslos, estás compensando. Relajá todo lo demás y concentrate solo en el suelo pélvico.

Nivel 2 — Resistencia (Semanas 3-4)

RUTINA DIARIA — 5 MINUTOS

1. Contracción sostenida

Contraé y mantené 10 segundos. Soltá lento en 5. Si no llegás a 10, andá de a poco.

6 repeticiones · Pausa 10 segundos

2. Ráfagas rápidas

Contraé-soltá rápido sin perder la calidad.

15 repeticiones × 3 series

3. Ascensor pélvico

Imaginá que tu suelo pélvico es un ascensor. Subí al "piso 1" (contracción suave), luego al "piso 2" (más), "piso 3" (máxima). Bajá piso por piso.

5 repeticiones completas

4. Puente con contracción pélvica

Puente de glúteos + contracción pélvica simultánea en la subida. Soltá arriba.

10 repeticiones × 2 series

Nivel 3 — Funcional (Semanas 5-6)

RUTINA DIARIA — 5 MINUTOS

1. Contracción en posiciones funcionales

Hacé contracciones sostenidas (10s) parada, en sentadilla y caminando. Cada posición desafía el suelo pélvico diferente.

4 repeticiones por posición

2. Pre-activación ante esfuerzo ("The Knack")

Antes de toser, estornudar, levantar peso o reír: contraé el suelo pélvico una fracción de segundo antes. Esto se llama "The Knack" y previene pérdidas.

Practicá 5 veces con tos voluntaria

3. Dead bug con contracción pélvica

En posición de dead bug, activá suelo pélvico + transverso al extender pierna.

8 por lado × 2 series

4. Sentadilla con pre-activación

Bajá en sentadilla, activá suelo pélvico antes de subir. Así entrenás la respuesta automática.

10 repeticiones × 2 series

Nivel 4 — Integración (Semanas 7-8)

RUTINA DIARIA — 5 MINUTOS

Circuito integrado

Combiná ejercicios del Desafío 21 Días con contracción pélvica consciente:
Puente con contracción × 12 → Dead bug con contracción × 8/lado → Sentadilla con pre-activación × 10 → Plancha 20s con contracción sostenida.
2 rondas sin pausa entre ejercicios, 30s entre rondas.

Cuándo consultar: si después de 4 semanas las pérdidas no mejoran nada, si sentís dolor durante los ejercicios, si tenés sensación de bulto en la vagina, o si las pérdidas empeoran al hacer ejercicio, consultá con un profesional de suelo pélvico. Estos ejercicios ayudan en la mayoría de los casos, pero algunas situaciones necesitan evaluación personalizada.

Registro de progreso

- ☐ Puedo mantener contracción 10 segundos sin compensar
- ☐ Puedo hacer 15 ráfagas sin perder calidad
- ☐ No tengo pérdidas al toser o estornudar
- ☐ Puedo hacer "The Knack" automáticamente
- ☐ Me siento segura al hacer ejercicio intenso
- ☐ No siento pesadez pélvica al final del día

Material exclusivo. Prohibida su distribución.